

ALESSANDRO MICHELI* e MAURIZIO Busetto*

RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 1990

RIASSUNTO - Iniziata lo scorso anno, prosegue nel 1990 la raccolta delle segnalazioni ornitologiche più interessanti per la provincia di Brescia.

Sono escluse da tale resoconto le notizie già pubblicate su riviste specialistiche e quelle riguardanti le nidificazioni. Le specie segnalate sono 38.

SUMMARY - *1990 ornithological report for the province of Brescia (Northern Italy)*. This paper deals with the more interesting bird species observed (38) in the province of Brescia. The article does not include the wintering and breeding species already reported from other journals.

PREMESSA

Dopo l'avvio dato l'anno scorso al resoconto ornitologico riferito agli anni dal 1986 al 1989 compreso, continuiamo qui con i dati relativi all'anno 1990. I criteri adottati per vagliare le osservazioni fornite dai collaboratori sono gli stessi del precedente resoconto, ossia si sono considerate:

- le specie accidentali, rare o comunque poco osservate nel nostro territorio, anche solo in relazione a determinati periodi dell'anno;
- le specie comuni ma presenti in un dato momento in quantità non consueta;
- i soggetti che presentavano comportamenti poco noti o anomalie del piumaggio;
- i soggetti inanellati.

Anche quest'anno non sono state prese in considerazione le notizie già pubblicate su riviste specialistiche e quelle relative alle nidificazioni, riunite in un lavoro di aggiornamento (BRICHETTI, 1992) dell'Atlante provinciale.

Ricordiamo ai collaboratori che, anche ai fini della pubblicazione, è utile fornire una eventuale documentazione fotografica delle osservazioni più interessanti.

A tutti quelli che hanno contribuito, in qualsiasi maniera, e soprattutto ai 18 collaboratori che hanno comunicato le proprie osservazioni, va il nostro ringraziamento.

* G.R.A. Gruppo Ricerche Avifauna, Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.

ELENCO DEI COLLABORATORI

Hanno contribuito a questo resoconto, comunicando le loro osservazioni: Mauro Bailo (Bagnolo Mella, Brescia), Guido Ballerio (Brescia), Roberto Bertoli (Torbole Casaglia, Brescia), Pierandrea Brichetti (Verolanuova, Brescia), Maurizio Busetto (Concesio, Brescia), Mario Caffi (Borgo S. Giacomo, Brescia), Pieralberto Cucchi (Barghe, Brescia), Arturo Gargioni (Gottolengo, Brescia), Rocco Leo (Bovezzo, Brescia), Ferruccio Maestri (Sarezzo, Brescia), Franco Mazzotti (Cologne, Brescia), Sergio Mazzotti (Coccaglio, Brescia), Alessandro Micheli (Treviso Bresciano, Brescia), Agostino Pedrali (Coccaglio, Brescia), Gabriele Piotti (Salò, Brescia), Mario Rizzardini (Agnosine, Brescia), Alessandro Rossi (Desenzano, Brescia), Laura Voltolini (Sarezzo, Brescia).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SEGNALAZIONI

PHALACROCORACIDAE

Cormorano *Phalacrocorax carbo*: la presenza della specie nella Riserva Naturale Torbiere d'Iseo, iniziata nel 1986-87 con la estivazione di alcuni individui, è ora diventata regolare. Solo per un periodo relativamente breve, quando gli specchi d'acqua interni sono inagibili perché ghiacciati, gli uccelli si spostano sul lago; diversi osservatori (Bertoli R., Busetto M., Leo R., Mazzotti S., Pedrali A.) hanno constatato la regolarità e il progressivo incremento del fenomeno. Alle regolari osservazioni di Mazzotti S. si deve il diagramma di fig. 1, che rappresenta comparativamente i conteggi effettuati negli ultimi due anni.




Fig. 1 - Il diagramma rappresenta i conteggi della presenza di Cormorano *Phalacrocorax carbo* per il periodo 1989-90 nella R.N. Torbiere di Iseo. In ascissa: mesi dell'anno; in ordinata: numero degli individui.

ARDEIDAE

Nitticora *Nycticorax nycticorax*: dopo qualche anno di assenza (ultima osservazione risalente al giugno 1982, BRICHETTI, 1982), alcuni individui sono stati visti il 19 maggio e il 6, 7 e 11 luglio, nella R.N. Torbiere di Iseo (minimo 1 ad., massimo 2 ad. e 5 juv.) (Bertoli R., Leo R.).

Airone bianco maggiore *Egretta alba*: 1 ind. di questa specie assai rara nella nostra provincia ha sostato almeno due giorni (29 e 30 luglio) nella R.N. Torbiere di Iseo, confermando ancora una volta l'importanza naturalistica di questa zona umida protetta (Mazzotti S.).

Airone cenerino *Ardea cinerea*: si è ripetuto lo svernamento, ma con un notevole aumento degli effettivi rispetto all'inverno 1989-90, infatti sono stati censiti 125 ind. il 3 dicembre e 115 ind. il 17 dicembre, nei campi di stoppie di mais e soia presso l'allevamento ittico di Calvisano (Gargioni A.).

Airone rosso *Ardea purpurea*: l'osservazione di 2 ind., il 6 e l'11 luglio, nella R.N. Torbiere di Iseo, rappresenta un caso di probabile estivazione e fa sperare in una prossima nidificazione nel Bresciano (Bertoli R., Leo R.).

CICONIIDAE

Cicogna nera *Ciconia nigra*: osservato 1 ind. in volo alto sopra la campagna di Rudiano il 9 maggio (Mazzotti S.); precedentemente la specie era stata segnalata circa dieci volte, per lo più durante la migrazione postnuziale (BRICHETTI, 1982).

ANATIDAE

Casarca *Tadorna ferruginea*: il 15 settembre è stato visto 1 ind. di questa specie, accidentale nel Bresciano, nella R.N. Torbiere di Iseo; il controllo effettuato il giorno successivo risultava vano, e incerta rimane anche la provenienza del soggetto (fuggito dalla cattività?) (Bailo M.).

Volpoca *Tadorna tadorna*: i 4 ind., di questa specie di comparsa rara e poco regolare nel Bresciano, presenti a Punta Gro (Sirmione) il 19 gennaio; a causa dell'attività venatoria dopo due giorni erano scomparsi (Rossi A.).

Fistione turco *Netta rufina*: decisamente insolito il 26 maggio, in avanzata stagione riproduttiva, l'avvistamento di 1 ♂ intento ad alimentarsi in un canneto lacustre a Sirmione (Rossi A.). In Lombardia la specie è presente solo come migratrice.

Moretta codona *Clangula hyemalis*: segnalata ancora sul lago di Garda; 1 juv. in riposo a pochi metri dalla riva a Salò, 18 dicembre (Piotti G.).

ACCIPITRIDAE

Nibbio bruno *Milvus migrans*: decisamente interessante l'osservazione di 1 ind. in volteggio sopra Sabbio Chiese il 26 febbraio (Busetto M.). I primi migratori sono segnalati dalla metà di marzo (data più precoce precedente: 13 marzo (BRICHETTI e CAMBI, 1980)).

Nel tardo pomeriggio del 17 giugno contati 42 ind. volteggiare insieme sopra la sponda orientale del lago d'Idro; questo specchio lacustre è ormai interessato da alcuni anni da tali grossi assembramenti (BRICHETTI e FASOLA, 1990; MICHELI e Busetto, 1991) che di solito però si manifestano con regolarità dalla fine di giugno in avanti, quando i giovani si sono già involati (Micheli A.).

Albanella reale *Circus cyaneus*: 1 ♀ posata su un albero nella campagna di Treviso Bresciano (circa 750 metri s.l.m.) subito dopo una nevicata (10 cm di neve); erano compresenti una dozzina di Sordoni *Prunella collaris* (Micheli A.).

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga*: il 3 dicembre 1 imm. con pochissime macchie bianche sul dorso era posato sullo «Scoglio dell'Altare», a fianco dell'Isola del Garda (San Felice del Benaco), a poca distanza da un numeroso gruppo di Cormorani e Gabbiani reali. Infastidito da un nugolo di Cornacchie grigie l'uccello si è poi involato verso l'entroterra di Manerba (Rossi A.). Per la nostra provincia erano note tre segnalazioni: Gardone Riviera, novembre 1929; Villagana, novembre 1947 e Manerbio, ottobre 1970 (BRICHETTI, 1982).

PANDIONIDAE

Falco pescatore *Pandion haliaetus*: precoce l'avvistamento di 1 ind. presso Calvisano, il 16 agosto (Gargioni A.); un altro individuo ha sostato nella R.N. Torbiere di Iseo dall'1 settembre al 5 ottobre (Mazzotti S.).

FALCONIDAE

Falco cuculo *Falco vespertinus*: è decisamente precoce l'avvistamento di 3 ♂♂ e 2 ♀♀ posati sui fili del telefono lungo la strada statale tra Lograto e Soncino il 25 marzo (Pedrali A.).

Coincide con la fine della migrazione prenuziale l'osservazione di 1 ♂ in caccia di insetti il 9 giugno, nella R.N. Torbiere di Iseo (Mazzotti S.).

Lodolaio *Falco subbuteo*: solamente due osservazioni primaverili di questa specie, decisamente rara nel Bresciano. Il 19 maggio, verso sera, osservato 1 ind. posato nelle vicinanze di un appostamento di caccia, sul versante meridionale del M. Orfano a Cologne (Mazzotti F.); un altro in volo, sempre all'imbrunire, l'1 giugno sopra i prati falciabili intercalati da lunghi filari di *Alnus glutinosa* e *Populus nigra*, presso Agnosine (Rizzardini M.).

HAEMATOPODIDAE

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*: di questa specie accidentale per la nostra provincia vi sono due interessanti segnalazioni: la prima riguarda 1 ind. in perfetto abito nuziale posato sugli scogli detti «I Conigli» poco a N dell'isola di San Biagio (Manerba del Garda), il 15 maggio, mentre la seconda si riferisce ad un altro individuo avvistato il 22 agosto a Punta Gro (Sirmione) (Rossi A.).

CHARADRIIDAE

Corriere grosso *Charadrius hiaticula*: data la scarsità di notizie riguardanti la specie nella nostra provincia riteniamo utile riportare due osservazioni effettuate sul lago di Garda: 1 ind. associato a 2 Voltapietre *Arenaria interpres* il 21 maggio, sugli scogli «I Conigli» (Manerba del Garda); un gruppo di 10 ind., spiaggia della «Brema» (Sirmione) il 15 settembre. La presenza di soggetti isolati è stata comunque costante dal 23 agosto al 23 ottobre (Rossi A.).

Pivieressa *Pluvialis squatarola*: 1 ind. ancora in abito nuziale osservato il 22 agosto, altri 4 ind. notati il 12 settembre sempre a Punta Gro (Sirmione) (Rossi A.).
La specie nella nostra provincia è considerata di comparsa rara ed irregolare.

SCOLOPACIDAE

Voltapietre *Arenaria interpres*: il 21 maggio una coppia in perfetto abito nuziale è stata osservata sugli scogli «I Conigli» presso l'isola di San Biagio (Manerba del Garda) insieme a un Corriere grosso *Charadrius hiaticula*; durante la migrazione postnuziale 1 ind. ha sostato per tre giorni (il 22, 23 e 24 settembre) sugli affioramenti ciottolosi poco distanti dalla spiaggia della «Brema», a Sirmione (Rossi A.).

Va ricordato che nel periodo tardo-estivo e autunnale il livello del lago era sceso ad uno dei suoi minimi storici, lasciando così scoperte ampie porzioni riparie fangose e ciottolose; ciò ha favorito la sosta prolungata e l'osservazione di un cospicuo quantitativo di limicoli, come non accadeva da anni; riportiamo, tra le altre, le segnalazioni registrate da Rossi A. in un tratto della sponda meridionale interposta tra le località «Brema» e «Punta Gro» presso Sirmione: 22 agosto: 2 Totani mori, 1 Pivieressa ancora in abito nuziale, 1 Corriere grosso, 1 Piovanello pancianera, 2 Piro piro boscherecci, 3 Piro piro piccoli, 1 Garzetta; 11 settembre: 2 Pantane; 12 settembre: 10 Piovanelli tridattili, 10 Corrieri grossi, 40 Piovanelli pancianera, 10 Gambecchi, 6 Piovanelli, 1 Combattente, 4 Pivieresse; 28 settembre: 1 Totano moro, 6 Piovanelli, 15 Piovanelli pancianera, 15 Gambecchi, 3 Corrieri grossi; 27 novembre: il lago aveva ormai recuperato il livello normale ed erano presenti solo 3 Piovanelli pancianera.

STERNIDAE

Beccapesci *Sterna sandvicensis*: il 2 giugno vengono osservati 5 ind. posati su pali emergenti al largo della «Brema» (Sirmione) (Rossi A.).



Fig. 2 - Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*, sugli scogli «I Conigli», presso l'Isola di S. Biagio (Manerba del Garda) (foto A. Rossi).



Fig. 3 - Corriere grosso *Charadrius hiaticula*, sugli scogli «I Conigli» (Manerba del Garda) (foto A. Rossi).

Mignattino *Chlidonias niger*: 3 ind. in abito nuziale hanno sostato dal 14 al 16 giugno nella R.N. Torbiere di Iseo; presumibilmente trattavasi di soggetti in transito (Pedrali A.).

COLUMBIDAE

Colombaccio *Columba palumbus*: a fine dicembre, in un dormitorio sito in un pioppeto adiacente il F. Oglio, tra Acqualunga (BS) e Azzanello (CR) vengono contati circa 6500 ind. (Caffi M.).

Tortora dal collare orientale *Streptopelia decaocto*: il 20 dicembre è stato notato un assembramento di almeno 50 ind. presso un cascinale a Monticelli d'Oglio (Verolavecchia); nell'area si riproducono regolarmente solo 2-4 coppie (Brichetti P.).

MEROPIDAE

Gruccione *Merops apiaster*: nel tardo pomeriggio del 14 giugno vengono visti 2 ind. cacciare insetti in volo nei prati di Agnosine; il giorno seguente erano scomparsi. (Cucchi P., Micheli A., Rizzardini M.). È la prima volta che la specie viene notata, in piena stagione riproduttiva, in una valle prealpina della provincia.

PICIDAE

Torcicollo *Jynx torquilla*: udito 1 ind. in canto precoce il 5 marzo in località «Balosse» (colline moreniche della Valtenesi) a Moniga del Garda (Rossi A.).

ALAUDIDAE

Allodola golagialla *Eremophila alpestris*: 1 ind. di questa specie di comparsa accidentale (l'ultima segnalazione è stata effettuata nel 1964) è stato raccolto da un cacciatore a «Badia» di Pozzolengo nella prima metà di novembre (Rossi A.).

BOMBYCILLIDAE

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*: un gruppo di 25-30 ind. ha sostato da febbraio a fine marzo a Ponte di Legno in zone ricche di alberi di *Sorbus aucuparia* (Brichetti P.).

TURDIDAE

Pettazzurro *Luscinia svecica*: 1 ♂ della sottospecie occidentale *cyaneacula* rilevato il 24 marzo in un tifeto intermorenico presso Moniga del Garda; nello stesso sito la specie fu notata a fine agosto 1989 (Rossi A.).



Fig. 4 - Pivieressa *Pluvialis squatarola*, in abito nuziale, il 22 agosto, a Punta Gro (Sirmione) (foto A. Rossi).



Fig. 5 - Voltapietre *Arenaria interpres*, sugli scogli «I Conigli» (Manerba del Garda) (foto A. Rossi).

SYLVIIDAE

Forapaglie *Acrocephalus schoenobaenus*: inconsueto il ritrovamento di un ind. morto, a Travagliato nel mese di dicembre, data molto tardiva (Ballerio G.).

Cannaiola *Acrocephalus scirpaceus*: rilevato 1 ♂ in canto territoriale nella zona centrale della R.N. Torbiere di Iseo il 25 febbraio; la data decisamente atipica fa pensare ad un possibile svernamento della specie (Busetto M.).

Canapino maggiore *Hippolais icterina*: il 12 maggio 1 ♂ in canto sommesso viene visto catturare un Tipulide in volo a Treviso Bresciano (Micheli A.). La specie è di transito regolare, tuttavia sporadiche restano le sue segnalazioni.

Occhiocotto *Sylvia melanocephala*: il soggetto rinvenuto morto il 12 dicembre, in un residuo boschetto planiziale a Padernello (Borgo S. Giacomo), verosimilmente era un ind. erratico proveniente dai luoghi di riproduzione siti nelle oasi xerothermiche prealpine della provincia (Caffi M.).

LANIIDAE

Averla maggiore *Lanius excubitor*: il 18 gennaio osservato 1 ind. in una zona pianeggiante presso «Le Moie» a Rodengo Saiano (Maestri F., Voltolini L.). La specie nella nostra provincia transita regolarmente ma in numero limitato e principalmente nei mesi autunnali.

CORVIDAE

Cornacchia grigia *Corvus corone cornix*: a metà dicembre è stato trovato un dormitorio composto da circa 2000 ind. in un boschetto di pioppi lungo il F. Oglio presso Acqualunga; lo stesso sito era frequentato anche da 150 Corvi *Corvus frugilegus* e 3 Taccole *Corvus monedula* (Caffi M.).

FRINGILLIDAE

Peppola *Fringilla montifringilla*: 1 ♂ imbrancato con 4 Fringuelli *Fringilla coelebs*, nella zona sommitale del M. Stino l'8 aprile, data tardiva (Micheli A.).

EMBERIZIDAE

Zigolo di Lapponia *Calcarius lapponicus*: l'avvistamento di 1 ind. a Clusane, il 18 ottobre, fa supporre la quasi regolarità della presenza autunnale della specie anche per il settore occidentale della provincia (Ballerio G.).

Zigolo minore *Emberiza pusilla*: 1 ind. imbrancato con Cardellini *Carduelis carduelis* e Lucarini *Carduelis spinus*, è stato raccolto in un cortile dell'abitato di Zone, il 15 ottobre (Pedrali A.). L'ultima segnalazione risale al novembre 1974 a Pozzolengo.

B I B L I O G R A F I A

- BRICHETTI P., 1982 - *Uccelli del Bresciano*. Amm. Prov. di Brescia.
BRICHETTI P., 1992 - *Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia). Aggiunte 1985-1991*. Natura Bresciana, 27.
BRICHETTI P. e CAMBI D., 1980 - *L'Avifauna della Lombardia*. Natura Bresciana, 17: 211-234
BRICHETTI P. e FASOLA M. (red.), 1990 - *Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia*. Ed. Ramperto, Brescia.
MICHELI A. e Busetto M., 1991 - *Resoconto ornitologico bresciano 1986-1988 e 1989*. Natura Bresciana, 26: 239-249.

Indirizzo degli Autori:

ALESSANDRO MICHELI, via Roma 8 - 25070 TREVISO BRESCIANO (Brescia)
MAURIZIO Busetto, via Alighieri 30 - 25062 CONCESIO (Brescia)