

**PRIMA NIDIFICAZIONE ACCERTATA DI  
AIRONE ROSSO *Ardea purpurea*  
NELLA RISERVA NATURALE TORBIERE DEL SEBINO  
(Brescia)**

L'Airone rosso è specie distribuita in modo frammentario nell'Europa centro-meridionale. In Italia è migratore regolare e localizzato come nidificante, con una popolazione stimata in circa 650 copie.

In Lombardia, secondo i recenti risultati dell'Atlante (BRICHETTI e FASOLA 1990) è risultato presente in 13 garzaie, con una popolazione annualmente fluttuante: 171 coppie nel 1981; 68 nel 1985 e 136 nel 1986. La riproduzione avviene generalmente in colonie monospecifiche, a volta a coppie isolate ed in alcuni casi in associazione ad altri Ardeidi (Nitticora, Garzetta e talvolta Sgarza ciuffetto).

Per la provincia di Brescia non viene citato come nidificante (nemmeno probabile o possibile) dal recente Atlante per il periodo 1980-1984 (BRICHETTI e CAMBI, 1985). Per le Torbiere del Sebino la specie era data genericamente nidificante da SALVI (1966) per l'inizio degli anni '60, senza però apporto di prove documentate o circostanziate. Negli anni '70 non si erano raccolte prove di nidificazione od estivazione al riguardo (BRICHETTI, 1976).

Dal 1988 al 1990 abbiamo notato i primi casi di estivazione, con un numero di individui variabile tra 1 e 3. Nel 1991 abbiamo verificato tre casi di nidificazione coronati da successo. Allo stato delle attuali conoscenze, riteniamo che le osservazioni del 1991 riguardino realmente i primi casi accertati per la zona.

Più in dettaglio, verso la metà di aprile abbiamo notato i primi individui, divenuti successivamente territoriali nel mese di maggio in una zona interna delle «lame». Il 25 maggio è stato trovato il primo nido, collocato al centro di un fitto fragmiteto, con la femmina in cova ed il maschio nelle vicinanze. La schiusa delle uova è avvenuta il 21 giugno e l'involo dei 3 pulli nati l'11 agosto. Il secondo nido è stato notato il 9 giugno a circa 20 metri di distanza; la schiusa è avvenuta probabilmente il 30 giugno e l'involo, sempre dei tre pulli nati, il 17 agosto. Il terzo nido, costruito praticamente a ridosso del primo, nella stessa piazzola, conteneva 3 uova il 21 giugno, successivamente schiuse il 18 luglio; l'involo dei tre pulli è avvenuto dal 5 al 10 settembre.

Riteniamo che l'elevato successo riproduttivo (100%, con 9 giovani involatisi) sia da mettere in relazione all'istituzione della Riserva Naturale e della successiva approvazione del Piano di Gestione, che hanno determinato una sensibile attenuazione delle varie fonti di disturbo antropico, cui questo Ardeide risulta particolarmente sensibile.

## BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P., 1976 - *L'avifauna nidificante nella Torbiera di Iseo*. Natura Bresciana, 12: 55-80.  
BRICHETTI P. e CAMBI D., 1985 - *Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia) 1980-1984*.  
Monografie di Natura Bresciana, 8: 1-142.  
BRICHETTI P. e FASOLA M., 1990 - *Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia 1983-1987*. Editoriale  
Ramperto, Brescia.  
SALVINI G.P., 1966 - *L'avifauna nidificante nel Bresciano*. Natura Bresciana, 2: 63-67.

SERGIO MAZZOTTI  
via Monauni, 25  
25030 COCCAGLIO (BS)

FRANCO MAZZOTTI  
via Umberto I, 18  
25033 COLOGNE (BS)