

GIORGIO TRUFFI*

BIBLIOGRAFIA ORNITOLOGICA LIGURE Aggiornata al 1992

RIASSUNTO - Vengono acriticamente elencati tutti i lavori ornitologici reperiti contenenti notizie riguardanti il territorio ligure, indicando per ogni singola specie i testi in cui la stessa è menzionata. Sono inoltre preciseate le specie che, se pure citate, sono escludibili dall'avifauna regionale per mancanza o inadeguatezza di riscontri.

SUMMARY - *Ligurian ornithological bibliography until 1992.* Six hundred and five ornithological studies about the Ligurian regional territory published up to 1992 were collected and examined. The author has taken into consideration only the studies with strictly scientific features and he has left out hunting and protectionist publications and the periodical press, except for very few cases in which the data were accepted in literature. The list of bibliographic references is written in alphabetical order. Every study is marked by a progressive number.

The systematic index was written acritically; for every species the progressive numbers mark the studies in which the same species is quoted. Sometimes these numbers are followed by one or more small letters enclosed in brackets which highlight the specific interest of the quotation according to the following abbreviations: (a) = anomalies, (c) = captures or presences in collections, (i) = ringings, (r) = recaptures of ringed birds, (n) = nesting. The absence of notes doesn't necessarily involve the lack of a specific interest; it's generally due to the fact that in many cases the reference is simply a faunistic record.

On the whole 10.083 references per 409 taxa are listed.

Sono stati raccolti e indicizzati 605 lavori ornitologici in cui è fatto espresso riferimento al territorio ligure, apparsi fra il 1792 e il 1992, tenendo conto soltanto delle pubblicazioni scientifiche e tralasciando, a scapito forse di qualche informazione ma a vantaggio dell'attendibilità della determinazione specifica, la stampa venatoria e/o protezionistica e d'informazione, fatta astrazione da limitatissimi casi riferiti a dati la cui accettazione è consolidata in letteratura.

L'elenco bibliografico è stato redatto come d'uso per autori ed ordinato alfabeticamente, contrassegnando ogni lavoro con un numero progressivo.

L'elenco dei 409 taxa menzionati (in realtà 408 specie, essendosi mantenute separate le due sottospecie di *Corvus corone*), compilato acriticamente seguendo la successione e la nomenclatura adottate da BRICCHETTI & MASSA (1984, 1991) riporta per ognuna di queste i numeri che contrassegnano in sequenza i lavori in cui le stesse sono citate, seguiti a volte da una o più lettere minuscole poste fra parentesi che specificano l'argomento del riferimento: (a) = anomalie e/o taratologie, (c) = catture e/o presenze in collezioni, (i) = inanellamenti, (r) = ricatture di uccelli inanellati, (n) = nidificazione. L'assenza di annotazioni non è impli-

* Museo Civico di Storia Naturale di Stazzano (AL).

citamente dovuta alla mancanza di un preciso interesse ma è per lo più motivata dal fatto che in molti casi la menzione è di tipo genericamente faunistico. Complessivamente sono riportati 10.083 riferimenti.

L'elenco delle pubblicazioni, come facilmente accade in lavori di questo genere, non è sicuramente completo. Per certo non è stato possibile reperire, nonostante mirate indagini, l'opuscolo di RICCARDI (1836) e la lettera di GIGLIOLI (1863) già citati in bibliografia da SALVADORI (1872). L'autore sarà grato a quanti vorranno far pervenire segnalazioni ad integrazione.

Per non concorrere a perpetuare imprecisioni a riguardo degli uccelli della Liguria, va comunque sottolineato che le specie la cui presenza è stata sino ad ora accertata sono 393. Infatti, a quelle elencate va aggiunta *Pterocles alchata* (TRUFFI & BORGO, 1993) mentre sono da escludere per assenza di riscontri *Anser erythropus*, *Marmaronetta angustirostris*, *Larus atricilla*, *Pterocles orientalis*, *Glaucidium passerinum*, *Picooides tridactylus*, *Philoscopus inornatus* e *Loxia leucoptera*; dubbie, e tali da non consentire l'accoglimento nell'avifauna regionale, le provenienze di singoli individui di *Fulmarus glacialis*, *Caprimulgus asiaticus*, *Melanocorypha leucoptera*, *Melanocorypha yeltoniensis*, *Prunella montanella*, *Catharus guttatus*, *Locustella fluviatilis* e *Hippolais olivetorum* (per la discussione cfr. la letteratura specifica).

Auspicabile la pubblicazione di altre bibliografie ornitologiche regionali, agevoli strumenti per un esame di dettaglio delle modifiche e dello status del popolamento ornitico. Sino ad ora l'unico lavoro è quello di BOANO (1983), riferito al Piemonte e alla Valle d'Aosta.

RINGRAZIAMENTI

Hanno fornito materiali o agevolato la realizzazione del lavoro Giovanni Boano, Pierandrea Brichetti, Roberto Lardelli, Lisa Levi, Giovanni Maffei, Bruno Massa, Toni Mingozzi, Silvio Spanò e Carlo Tognoni.

B I B L I O G R A F I A

- BOANO G., 1983 - *Bibliografia Ornitológica Piemontese*. Mus. civ. St. nat., Carmagnola.
BRICHETTI P. & MASSA B., 1984 - *Check-list degli uccelli italiani*. Riv. ital. Orn. 54: 3-37.
BRICHETTI P. & MASSA B., 1991 - *Aggiunte e rettifiche alla check-list degli uccelli italiani*. 2. Riv. ital. Orn. 61: 3-9.
GIGLIOLI E. H., 1863 - *Letter on Cotyle rupestris*. Ibis: 474.
RICCARDI G., 1836 - *Sugli uccelli di passaggio. Memorie di un vecchio osservatore*. Genova.
SALVADORI T., 1872 - *Fauna d'Italia. Uccelli*. Vallardi, Milano.
TRUFFI G. & BORGO E., 1993 - *Prima segnalazione ligure di Grandule, Pterocles alchata*. Riv. ital. Orn. 63: 110-111.

ELENCO BIBLIOGRAFICO

- 1 - AA.Vv., 1980 - *Quindici parchi per la Liguria*. Stud. Cartogr. Italiano, Genova.
- 2 - AA.Vv., 1984 - *Museo Civico di Storia Naturale di Genova "Giacomo Doria". Guida alla visita*. Cassa Risp. Genova e Imperia, Genova.
- 3 - AA.Vv., 1989 - *Atlante degli uccelli nidificanti in Liguria*. Reg. Liguria, Genova.
- 4 - ACCINELLI G. & TRUFFI G., 1988 - *Presenza primaverile di Airone guardabuoi, Bubulcus ibis, in Liguria*. Riv. ital. Orn. 58: 196.
- 5 - AJOLA G., 1948 - *La quinta cattura dell'Aquila imperiale in Italia (Aquila heliaca, Sav.)*. Riv. ital. Orn. 18: 135-137.
- 6 - ALIERI R. & FASOLA M., 1992 - *Garzetta Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)*. In: Brichetti P. et al. (eds). Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I, Calderini, Bologna: 174-184.
- 7 - ALIPPI N., 1919 - *Gli Uccelli di comparsa accidentale in Italia e il loro valore per lo studio delle migrazioni*. Riv. ital. Orn. 5: 31-65.
- 8 - ALLAVENA S., 1976 - *Una Cicogna nera (Ciconia nigra) al Lago di Barrea nel Parco Nazionale d'Abruzzo*. Riv. ital. Orn. 46: 102-110.
- 9 - ALTINI G., 1942 - *Repertorio degli inanellamenti e delle riprese dell'Osservatorio Ornitologico Ligure negli anni dal 1936 al 1940*. Ric. Zool. appl. Caccia (17): 1-44.
- 10 - ALTINI G., 1942 - *L'attività dell'Osservatorio Ornitologico della Mesola nel quadriennio 1936-1940*. Ric. Zool. appl. Caccia (18): 1-116.
- 11 - ANDREOTTI A., BORG A., BORG E., FIOR T., SPANÒ S. & TRUFFI G., 1986 - *Seasonal fluctuations of gulls in Liguria*. In: Medmaravis & Moubailliu (eds.), Mediterranean Marine Avifauna. N.A.T.O. A.S.I. Series Vol. G 12, Springer, Berlin-Haideberg: 477-489.
- 12 - ANDREOTTI A., BORG E. & TRUFFI G., 1991 - *Presenze di Strolaghe (Gavia spp.) in Liguria*. In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XVII: 449-451.
- 13 - ANDREOTTI A. & ROSSI G.L., 1991 - *Dati preliminari sull'avifauna nidificante delle isole liguri. Analisi e proposte gestionali*. In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XVII: 281-285.
- 14 - ANGELICI F.M. & MARINI L., 1992 - *Avvistamento di Mugnaiaccio Larus marinus in Liguria*. Picus 18: 73-74.
- 15 - ANGELINI G., 1907 - *Un altro esemplare di Larus leucopterus, Faber*. Boll. Soc. Zool. Ital. 7: 271-273.
- 16 - ANONIMO (ma G. Riccardi), 1838 - *Discorso sulla selvaggina stazionaria in Liguria*. Rossi, Savona.
- 17 - ANSELMO G., 1979 - *Cattura di un Cuculo dal ciuffo, Clamator glandarius, in quel di Finale Ligure*. Riv. ital. Orn. 49: 109.
- 18 - ARCAMONE E. & MESCHINI E., 1981 - *Catalogo ragionato della collezione ornitologica del Museo Provinciale di Storia Naturale di Livorno*. Quaderni Mus. St. Nat. Livorno 2: 65-94.
- 19 - ARDITO E. & SPANÒ S., 1979 - *Osservazioni ornitologiche sul mare di Genova*. Uccelli d'Italia 4: 233-235.
- 20 - ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1899 - *Elenco degli uccelli rari o più difficili ad avversi conservati nella sua Collezione Ornitologica Italiana*. Ornis 9: 199-249.
- 21 - ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1902 - *Atlante ornitologico. Uccelli europei con notizie d'ordine generale e particolare*. Hoepli, Milano.
- 22 - ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1904 - *Manuale di ornitologia italiana*. Hoepli, Milano.
- 23 - ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1913 - *Elenco degli uccelli italiani per conoscere a prima vista lo stato esatto di ogni specie*. Boll. uff. Minist. Agric., Ind. e Comm. 12, serie C.
- 24 - ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1914 - *Notizie sulle recenti comparse del Beccofrusone (Ampelis garrulus)*. Riv. ital. Orn. 3: 64-70.
- 25 - ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1914 - *Sul passaggio degli uccelli nell'autunno 1913*. Riv. ital. Orn. 3: 71-79.
- 26 - ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1929 - *Ornitologia italiana*. Hoepli, Milano.
- 27 - ARRIGONI DEGLI ODDI E., 1931 - *Notizie ed Elenco delle catture di uccelli rari o interessanti avvenute in Italia dopo la pubblicazione della mia "Ornitologia italiana" (1929) o non registrate nella stessa*. Riv. ital. Orn. 1: 66-73.
- 28 - BACCETTI N. (cur.), 1988 - *Lo svernamento del Cormorano in Italia. 6. Liguria*. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XV: 39-43.
- 29 - BACCETTI N., 1992 - *Orco marino Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I, Calderini, Bologna: 416-422.
- 30 - BACCETTI N. & BRICHETTI P., 1992 - *Cormorano Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I, Calderini, Bologna: 99-112.
- 31 - BACCETTI N. & MASSI A., 1992 - *Airone bianco maggiore Egretta alba (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I, Calderini, Bologna: 184-192.
- 32 - BAGHINO L. & LEUGIO C., 1989 - *La migration printanière des Rapaces à Arenzano (Gênes, Italie)*. Nos Oiseaux 40: 65-80.

- 33 - BAGHINO L. & LEUGIO C., 1990 - *La migrazione prenuziale degli Accipitridae e Falconiformes in un sito della Liguria Occidentale nel 1988 e 1989*. Avocetta 14: 47-57.
- 34 - BAGHINO L., PIERETTI W., SILVERI N., 1987 - *Risultato del primo anno di osservazioni sulla migrazione primaverile dei rapaci nel comprensorio della Gava, nella provincia di Genova (1984)*. In: Rapaci mediterranei. III. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XII: 21-28.
- 35 - BAJNOTTI S., 1958 - *Catture rare o interessanti*. Riv. Ital. Orn. 28: 243-244.
- 36 - BAJNOTTI S., 1961 - *Notizie di catture rare o interessanti (maggio 1960 - aprile 1961)*. Riv. Ital. Orn. 31: 182-183.
- 37 - BALDACCINI E. & MONGINI E., 1985 - *Censimento dei colombi Columba livia forma domestica della città di La Spezia e loro tentativo di controllo*. In: Fasola M. (red.), Atti III Conv. Ital. Orn., Salice Terme: 223-224.
- 38 - BALIANI A., 1910-14 - *Atlante degli Uccelli italiani*. Scuola civ. Arti e Mestieri, Genova.
- 39 - BALLETTO E., 1977 - *Analisi faunistico-venatoria ed ecologica della regione Liguria*. Grafica db, Genova.
- 40 - BALLETTO E. & SPANÒ S., 1982 - *Ripetuta nidificazione di Gabbiano reale (Larus argentatus michaellis) nel porto di Sanremo (Imperia)*. Riv. Ital. Orn. 52: 191-194.
- 41 - BARLETTA A., 1985 - *Osservazione di Capovaccaio, Neophron percnopterus, in provincia di Alessandria*. Riv. Ital. Orn. 55: 189-192.
- 42 - BASSO R., 1983 - *Interessanti osservazioni sulle Berte minori nella Riviera ligure di Ponente*. Avifauna 6: 64.
- 43 - BENDINI L., 1981 - *Attività degli osservatori ornitologici e delle stazioni di inanellamento nell'anno 1978*. Boll. attiv. inanell. I.N.B.S. (1): 4-20.
- 44 - BENDINI L., 1983 - *Specie ornitiche inanellate in Italia e riprese in Italia nel 1978*. Boll. attiv. inanell. I.N.B.S. (2): 18-76.
- 45 - BENDINI L., 1983 - *Specie ornitiche inanellate in altri Paesi e riprese in Italia nel 1978*. Boll. attiv. inanell. I.N.B.S. (2): 77-112.
- 46 - BENDINI L., 1983 - *Specie ornitiche inanellate in Italia e riprese in altri Paesi nel 1979*. Boll. attiv. inanell. I.N.B.S. (2): 113-121.
- 47 - BENDINI L., 1983 - *Specie ornitiche inanellate in Italia e riprese in Italia nel 1979*. Boll. attiv. inanell. I.N.B.S. (2): 122-163.
- 48 - BENDINI L., 1983 - *Specie ornitiche inanellate in altri Paesi e riprese in Italia al 1977 compreso*. Boll. attiv. inanell. I.N.B.S. (2): 164-182.
- 49 - BENDINI L. & SPINA F. (cur.), 1990 - *Ricatture*. Boll. attiv. inanell. I.N.B.S. (3): 39-514.
- 50 - BENUSSI E., 1991 - *La nidificazione di Rondine rossiccia nel Carso triestino ed ulteriori dati sulla distribuzione in Italia e Corsica*. Fauna 2: 59-61.
- 51 - BERNARD-LAURENT A., 1984 - *Hybridation naturelle entre Perdrix bartavelle (Alectoris graeca saxatilis) et Perdrix rouge (Alectoris rufa rufa) dans les Alpes-Maritimes*. Gibier Faune Sauvage (2): 79-96.
- 52 - BERNARD-LAURENT A., 1990 - *Biologie de reproduction d'une population de Perdrix rochassière Alectoris graeca saxatilis x Alectoris rufa rufa dans les Alpes meridionales*. Rev. Ecol. (Terre Vie) 45: 321-344.
- 53 - BETTONI E., 1865-68 - *Storia naturale degli uccelli che nidificano in Lombardia*. Pio Istituto Patronato, Milano.
- 54 - BIAGIONI M., 1992 - *Sulla via dei migratori. Un ritratto ornitologico ed ecologico del fiume Magra*. Amm. Prov., La Spezia.
- 55 - BOANO G., 1980 - *Contributo degli inanellamenti allo studio degli ardeidi gregari del Piemonte*. Riv. Piem. St. Nat. 1: 161-169.
- 56 - BOANO G., 1992 - *Cicogna bianca Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 216-225.
- 57 - BOANO G., 1992 - *Marzaiola Anas querquedula Linnaeus, 1758*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 346-351.
- 58 - BOANO G. & CORNERO D., 1978 - *Osservatorio ornitologico Piemontese: I° resoconto delle attività (Maggio 1976 - Luglio 1978)*. Museo Craveri, Bra.
- 59 - BOANO G. & MINGOZZI T., 1985 - *Gli uccelli di comparsa accidentale nella regione piemontese*. Riv. Piem. St. Nat. 6: 3-67.
- 60 - BOCCA M. & MAFFEI G., 1984 - *Gli uccelli della Valle d'Aosta. Indagine bibliografica e dati inediti*. Tip. La Vallée, Aosta.
- 61 - BONAPARTE C.L., 1832-41 - *Iconografia della Fauna italica per le quattro classi degli animali vertebrati. Tomo I. Mammiferi e uccelli*. Salviucci, Roma.
- 62 - BONELLI G. (red.), 1933 - *La caccia in Italia*. R. Ist. Sup. Medicina Veterinaria. Comitato Ornitologico Venatorio, Milano.
- 63 - BONVICINI P., 1992 - *Catalogo della Collezione Ornitologica del Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno (Sondrio, Italia Settentrionale)*. Naturalista Valtellinese 3: 97-156.
- 64 - BORDIGNON L., 1984 - *Limite settentrionale della distribuzione del Gruccione (Merops apiaster) in Italia. Risultati di una inchiesta*. Riv. Ital. Orn. 54: 215-220.
- 65 - BORDIGNON L., 1985 - *Dati recenti sulla presenza e movimenti migratori della Cicogna nera Ciconia nigra e Cicogna bianca Ciconia ciconia in Piemonte*. In: Fasola M. (red.), Atti III Conv. Ital. Orn., Salice Terme: 239-241.

- 66 - BORGO A., 1975 - *Osservazioni ornitologiche sulla spiaggia di Varazze (Savona)*. Riv. ital. Orn. 45: 342-348.
- 67 - BORGO E., 1975 - *Osservazioni sulla Magnanina (Sylvia undata Bodd.) in Liguria*. Riv. ital. Orn. 45: 368-370.
- 68 - BORGO E., 1987 - *Osservazioni ornitologiche nel Mar Ligure*. Riv. ital. Orn. 57: 238-242.
- 69 - BORGO E., 1989 - *Nuova osservazione di Re degli edredoni, Somateria spectabilis, in Liguria*. Riv. ital. Orn. 59: 124-126.
- 70 - BORGO E., 1989 - *Nidificazione non usuale di Passero solitario, Monticola solitarius*. Riv. ital. Orn. 59: 126.
- 71 - BORGO E., CECCARINI G., SPANÒ S., 1989 - *Il Gabbiano reale Larus cachinnans Pallas sull'isola di Bergeggi (Liguria occidentale)*. Boll. Mus. Ist. biol. Univ. Genova 54-55: 91-116.
- 72 - BORGO E. & SPANÒ S., 1987 - *Analisi dei carnieri rilevabili dai tesserini di caccia della provincia di Imperia (1982-83)*. Boll. Mus. Ist. biol. Univ. Genova 53: 35-56.
- 73 - BORGO E., SPANÒ S. & TRUFFI G., 1991 - *Eccezionale presenza di edredoni in Liguria: dati quantitativi*. In: Fasola M. (red.), Atti II Semin. ital. Censim. Faunistici dei Vertebrati, Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XVI: 297-300.
- 74 - BORGO E., SPANÒ S. & TRUFFI G., 1991 - *Estivazione di edredoni (Somateria mollissima) a Genova*. In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XVII: 219-222.
- 75 - BORGO E., SPANÒ S., TRUFFI G., RELINI G., 1992 - *Edredoni Somateria mollissima (Aves): un problema nuovo per la mittilicoltura italiana*. Oebalia 17 (2 suppl.): 77-83.
- 76 - BORGO E., TRUFFI G. & VERNER A., 1992 - *Primo accertamento in Liguria di Labbo codalunga, Stercorarius longicaudus*. Riv. ital. Orn. 62: 181-182.
- 77 - BOSCHETTI G.A., 1894 - *La cincia col ciuffo*. Boll. natur. 14: 37-38.
- 78 - BOSCHETTI G.A., 1904 - *La "Nocciolaia" in Liguria*. Avicula 8: 161.
- 79 - BOSCHETTI G.A., 1904-06 - *Appunti per lo studio della avifauna ligure*. Avicula 8: 151-154; 9: 96-101, 128-129; 10: 24-28, 44-53.
- 80 - BOSCHETTI G.A., 1905 - *L'Aquila reale in riviera*. Avicula 9: 25.
- 81 - BOSCHETTI G.A., 1906 - *Cacce e passaggi degli uccelli*. Avicula 10: 103.
- 82 - BRICHETTI P., 1974 - *Segnalazioni inedite di specie attualmente conservate nella mia collezione con brevi considerazioni sulle stesse*. Riv. ital. Orn. 44: 74-78.
- 83 - BRICHETTI P., 1976 - *Atlante ornitologico italiano*. Scalvi, Brescia.
- 84 - BRICHETTI P., 1976 - *Nidificano o non nidificano? Uccelli d'Italia* 1: 19-21.
- 85 - BRICHETTI P., 1976 - *Il Falaropo beccosottile - Phalaropus lobatus (L.) - in Italia*. Uccelli d'Italia 1: 129-131.
- 86 - BRICHETTI P., 1978 - *Sulla nidificazione in Italia di: Gabbiano corallino Larus melanocephalus Temminck, Gabbiano roseo Larus genei Brême, Rondine di mare maggiore Hydroprogne tschegraya (Lepechin)*. Riv. ital. Orn. 48: 215-233.
- 87 - BRICHETTI P., 1979 - *Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. 1. Parte introduttiva: Famiglie Podicipedidae, Procellariidae, Hydrobatidae*. Natura Bresciana 16: 82-158.
- 88 - BRICHETTI P., 1980 - *In margine all'inchiesta ornitologica "Gli uccelli in Italia"*. Diana 75 (15): 68-69.
- 89 - BRICHETTI P., 1982 - *Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. 2. Famiglie Phalacrocoracidae, Ciconiidae, Treskiornitidae*. Natura Bresciana 19: 97-157.
- 90 - BRICHETTI P. (red.), 1982 - *Atlante degli uccelli nidificanti sulle Alpi italiane. 1*. Riv. ital. Orn. 52: 3-50.
- 91 - BRICHETTI P., 1983 - *Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. 3. Famiglie Phoenicopteridae, Ardeidae (generi Botaurus, Ixobrychus)*. Natura Bresciana 20: 197-234.
- 92 - BRICHETTI P. (red.), 1983 - *Atlante degli uccelli nidificanti sulle Alpi italiane. 2*. Riv. ital. Orn. 53: 101-144.
- 93 - BRICHETTI P., 1985 - *Distribuzione attuale dei Galliformi (Galliformes) in Italia*. In: Dessì Fulgheri F. e Mingozzi T. (cur.), *Biologia dei Galliformi*, Arcavacata: 15-27.
- 94 - BRICHETTI P. (red.), 1986 - *Atlante degli uccelli nidificanti sulle Alpi italiane. 3*. Riv. ital. Orn. 56: 3-39.
- 95 - BRICHETTI P., 1987 - *Atlante degli uccelli delle Alpi italiane*. Ramperio, Brescia.
- 96 - BRICHETTI P., 1988 - *Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. 5. Aggiornamenti e rettifiche (Parti 1-4)*. Natura Bresciana 24: 147-174.
- 97 - BRICHETTI P., 1992 - *Svasso cornuto Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), *Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I*. Calderini, Bologna: 45-48.
- 98 - BRICHETTI P., 1992 - *Berta minore Puffinus puffinus (Brünnich, 1764)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), *Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I*. Calderini, Bologna: 73-84.
- 99 - BRICHETTI P., 1992 - *Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), *Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I*. Calderini, Bologna: 112-124.
- 100 - BRICHETTI P., 1992 - *Tarabusino Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), *Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I*. Calderini, Bologna: 137-143.
- 101 - BRICHETTI P., 1992 - *Fenicottero Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758*. In: Brichetti P. et al. (eds.), *Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I*. Calderini, Bologna: 238-245.
- 102 - BRICHETTI P. & BENUSSI E., 1992 - *Aquila anatraia minore Aquila pomarina C.L. Brehm, 1831*. In: Brichetti P. et al. (eds.), *Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I*. Calderini, Bologna: 589-593.
- 103 - BRICHETTI P., CAGNOLARO L. & SPINA F., 1986 - *Uccelli d'Italia*. Giunti, Firenze.

- 104 - BRICHETTI P. & CAMBI D., 1979 - *L'Occhiocotto Sylvia melanocephala (Gmelin) nell'Italia settentrionale.* Uccelli d'Italia 4: 68-78.
- 105 - BRICHETTI P. & CAMBI D., 1981-82 - *Uccelli. Enciclopedia sistematica dell'avifauna italiana.* Rizzoli - Corriere della sera, Milano.
- 106 - BRICHETTI P., CANOVA L. & SAINO N., 1984 - *Distribuzione e status degli Anatidi nidificanti in Italia.* Avocetta 8: 19-42.
- 107 - BRICHETTI P. & FASOLA M., 1985 - *Distribuzione geografica degli uccelli nidificanti in Italia, Corsica e Isole Maltesi. 4. Famiglia Ardeidae (generi Nycticorax, Ardeola, Egretta, Ardea).* Natura Bresciana 22: 41-102.
- 108 - BRICHETTI P. & GELLINI S., 1992 - *Oca colombaccio Branta bernicla (Linnaeus, 1758).* In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 299-301.
- 109 - BRICHETTI P. & GROSSU M., 1992 - *Aironе guardabuoi Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758).* In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 165-171.
- 110 - BRICHETTI P. & LO VALVO F., 1992 - *Fulmaro Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761).* In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 59-60.
- 111 - BRICHETTI P. & LO VALVO F., 1992 - *Oca facciabianca Branta leucopsis (Bechstein, 1803).* In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 297-299.
- 112 - BRICHETTI P. & LO VALVO F., 1992 - *Anatra mandarina Aix galericulata (Linnaeus, 1758).* In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 310-311.
- 113 - BRICHETTI P. & LO VALVO F., 1992 - *Re degli edredoni Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758).* In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 406-408.
- 114 - BRICHETTI P. & LO VALVO F., 1992 - *Aquila imperiale Aquila heliaca Savigny, 1809.* In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 599-601.
- 115 - BRICHETTI P. & MASSA B., 1984 - *Check-list degli uccelli italiani.* Riv. ital. Orn. 54: 3-37.
- 116 - BRICHETTI P. & MASSA B., 1987 - *Aggiunte e rettifiche alla check-list degli uccelli italiani. 1.* Riv. ital. Orn. 57: 157-160.
- 117 - BRICHETTI P. & MASSA B., 1991 - *Aggiunte e rettifiche alla check-list degli uccelli italiani. 2.* Riv. ital. Orn. 61: 3-9.
- 118 - BRICHETTI P. & MICHELI A., 1992 - *Aquila rapace Aquila rapax (Temminck, 1828).* In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 597-599.
- 119 - BRICHETTI P. & MICHELI A., 1992 - *Falcone di Barberia Falco peregrinoides Temminck, 1829.* In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 694-696.
- 120 - BRICHETTI P., SAINO N. & CANOVA L., 1986 - *Immigrazione ed espansione della Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto in Italia.* Avocetta 10: 45-49.
- 121 - BRICHETTI P. & VIOLANI C., 1992 - *Gabbo rugginoso Oxiura leucocephala (Scopoli, 1769)* - In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 440-446.
- 122 - BROGI A., 1887 - *Cyanecula leucocyanea (C.L. Brehm).* Boll. natur. 7: 61-62.
- 123 - BROGI A., 1887 - *Ornitologia.* Boll. natur. 7: 76.
- 124 - BRUNO S. & PERCO F., 1980 - *Considerazioni ecologiche ed etologiche sul Biancone (Circaetus gallicus).* Natura Bresciana 17: 124-210.
- 125 - CALVI G., 1828 - *Catalogo d'ornitologia di Genova.* Pagano, Genova.
- 126 - CALVI G., 1831 - *Lettera al redattore.* Nuovo Giornale Ligustico di Scienza, Lettere ed Arti. 3 (1): 33-36.
- 127 - CAMUSSO N., 1887 - *Gli uccelli del basso Piemonte.* Dumolard, Milano.
- 128 - CAPOCACCIA ORSINI L., CORTESOGNO L., MARTINI E., MONTANO G., 1986 - *Alla scoperta della natura nell'alta val Varenna.* Sagep, Genova.
- 129 - CAPRA F., 1955 - *Melanitta fusca fusca (L.) - Orco marino.* Riv. ital. Orn. 25: 141-142.
- 130 - CAPRA F., 1955 - *Aix galericulata (L.) - Anatra mandarina.* Riv. ital. Orn. 25: 142-143.
- 131 - CARAZZI D., 1887 - *Avifauna del Golfo di Spezia e della Val di Magra.* Tip. Artistica, Spezia.
- 132 - CARAZZI D., 1887 - *Appendice ai materiali per una Avifauna del Golfo di Spezia e della Val di Magra.* Tip. Artistica, Spezia.
- 133 - CARAZZI D., 1889 - *2^a Appendice ai materiali per una Avifauna del Golfo di Spezia e della Val di Magra.* Tip. Artistica, Spezia.
- 134 - CARAZZI D. (cur.), 1898 - *Guida-catalogo del Museo Civico della Spezia.* Museo Civico, La Spezia.
- 135 - CARAZZI D., 1912 - *La collezione ornitologica Magni-Griffi del R. Museo di Zoologia di Roma.* Riv. ital. Orn. 1: 277-279.
- 136 - CASATI A., 1937 - *Sull'eccezionale passo di Cesene e Tordele avvenuto in Italia nel 1936-37.* Riv. ital. Orn. 7: 225-236, 285-291.
- 137 - CASTELLANI E., 1972 - *Osservazioni ornitologiche sul promontorio di Portofino.* Riv. ital. Orn. 42: 167-174.
- 138 - CATERINI F., 1935 - *Catture interessanti.* Riv. ital. Orn. 5: 51-52.
- 139 - CATERINI F., 1938 - *Catture rare e interessanti.* Riv. ital. Orn. 8: 86-94, 138-145.
- 140 - CATERINI F., 1955 - *Inchiesta sul Corvo comune (Corvus frugilegus L.) in Italia.* Riv. ital. Orn. 25: 85-104.
- 141 - CATERINI F., 1967 - *Attività dell'Osservatorio Ornitológico Toscano negli anni 1941-1965.* Ric. Zool. appl. Caccia (44): 1-45.
- 142 - CATERINI F. & UGOLINI L., 1953 - *Il libro degli uccelli italiani.* Olimpia, Firenze.

- 143 - CATTANEO G. & PETRETTI F., 1992 - *Biancone Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788). In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 520-526.
- 144 - CHABROL DE VOLVIC G.J.C., 1826 - *Statistique des provinces de Savone, d'Oneille et d'Acqui, et de la partie de la province de Mondovì formant l'ancienne Département de Montenotte*. Didot Ainé, Paris.
- 145 - CHIAVETTA M., 1981 - *I rapaci d'Italia e d'Europa*. Rizzoli, Milano.
- 146 - CHIAVETTA M., 1992 - *Gheppio Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758). In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 638-644.
- 147 - CHIOZZA G., 1955 - *Catture interessanti*. Diana 50: 453-454.
- 148 - CONCI C., 1941 - *Due nuovi generi e tre nuove specie di Mallofagi dei Meropes*. Boll. Soc. Ent. it. 73: 99-107.
- 149 - CORNARA L. & BURLANDO B., 1990 - *Segnalazione di Airone bianco maggiore, Egretta alba, in Liguria*. Riv. Ital. Orn. 60: 89-90.
- 150 - COVA C., 1969 - *Atlante degli uccelli italiani*. Hoepli, Milano.
- 151 - CRAVERI M., 1927 - *Atlante ornitologico (uccelli italiani)*. Treves, Milano.
- 152 - CRAVERI M., 1942 - *Avifauna piemontese e ligure in alcuni Musei regionali*. Diana 37: 335-336, 395.
- 153 - CREMASCOLI L., 1982 - *Indagine sull'avifauna del fiume Magra, Bozzi di Saudino e del Golfo di La Spezia*. A.R.C.I. Caccia, La Spezia.
- 154 - DAMIANI G., 1899 - *A proposito della frequenza in Italia della Rissa tridactyla L.* Avicula 3: 169-171.
- 155 - DAMIANI G., 1901 - *Note ornitologiche dall'Isola d'Elba*. Boll. Soc. Zool. Ital. 10: 45-57.
- 156 - DE BEAUX O., 1939 - *Il primo fringillide nordamericano (Passerella iliaca iliaca Merraem) catturato in Italia*. Riv. Ital. Orn. 9: 103-107.
- 157 - DE BEAUX O., 1945 - *Esame di un Cardellino (Carduelis c. carduelis (L.)), di colorazione anomala*. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 62: 276-291.
- 158 - DE BEAUX O., 1948 - *Appunti su 4 specie accidentali catturate in provincia di Genova*. Riv. Ital. Orn. 18: 71-73.
- 159 - DE BEAUX O., 1949 - *A propos des "Oiseaux de Rome"*. Nos Oiseaux 20: 7-11.
- 160 - DE BERNARDI P., DOMINICI O. & PERRONE A., 1983 - *Presenza in ambiente urbano della Magnanina "Sylvia undata" Boddaert* (Aves, Silviidae). Riv. Piem. St. Nat. 4: 239-240.
- 161 - DE FRANCESCHI P., 1992 - *Fagiano di monte Tétrao tetrix Linnaeus, 1758*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 721-739.
- 162 - DEGLAND C.D. et GERBE Z., 1867 - *Ornithologie européenne ou catalogue descriptif, analytique et raisonné des oiseaux observés en Europe*. Baillière, Paris.
- 163 - DEI A., 1886 - *Tre specie di uccelli da aggiungere alla Fauna ornitologica Senese-Grossetana*. Boll. natur. 6: 19-20.
- 164 - DELBECCHI L., 1939 - *Passo e catture dei crocieri nella provincia di Imperia*. Riv. Ital. Orn. 9: 239-241.
- 165 - DE LEONE N., 1906 - *Sopra la cattura di tre individui di Merops persicus, Pallas, nell'Abruzzo ultra primo*. Boll. Soc. Zool. Ital. 15: 180-183.
- 166 - DESPOTT G., 1923 - *Cattura di due Gruccioni egiziani (Merops persicus Pall.) a Malta*. Riv. Ital. Orn. 6: 37-38.
- 167 - DESPOTT G., 1933 - *Cattura di un Gabbiano glauco a Malta*. Riv. Ital. Orn. 3: 48-52.
- 168 - DI CARLO E.A., 1969 - *Ulteriori notizie sul Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius)*. Riv. Ital. Orn. 39: 227-231.
- 169 - DI CARLO E.A., 1971 - *Appunti sulla biologia del Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius)*. Riv. Ital. Orn. 41: 86-107.
- 170 - DI CARLO E.A., 1973 - *Aspetti della migrazione degli uccelli attraverso il ponte delle isole circumsiciliane*. Lavori Soc. It. Biogeografia 3: 815-852.
- 171 - DI CARLO E.A., 1976 - *Gli uccelli americani comparsi sinora in Europa e in Italia*. Uccelli d'Italia 1: 53-78.
- 172 - DI CARLO E.A., 1978 - *Note ed appunti sul Picchio dalmatino o di Lilford (Dendrocopos leucotos lilfordi)*. Uccelli d'Italia 3: 233-244.
- 173 - DI CARLO E.A., 1981 - *Ricerche ornitologiche sul litorale tirrenico del Lazio e Toscana*. Acc. Naz. Lincei Quad. 254: 77-236.
- 174 - DI CARLO E.A. & HEINZE J., 1979 - *Il Piviere tortolino Eudromias morinellus (L.) come uccello di passo e nidificante in Italia. (I parte)*. Uccelli d'Italia 4: 47-67.
- 175 - DINETTI M., 1992 - *Nidificazione di Rondone pallido, Apus pallidus, nell'abitato di Deiva Marina (La Spezia)*. Riv. Ital. Orn. 62: 56.
- 176 - DI PALMA G., CATALISANO A., LO VALVO F., LO VERDE G., 1989 - *Catalogo della collezione ornitologica "Antonio Trischitta"*. Acc. Naz. Sc. Lett. Arti, Palermo.
- 177 - D.P. (ma D. Parodi), 1888 - *Albinismo di un passero nostrale*. Boll. natur. 8: 156.
- 178 - DURAZZO C., 1840 - *Degli uccelli liguri*. Ponthenier, Genova.
- 179 - DURAZZO C., 1846 - *Uccelli*. In: Aa. Vv., *Descrizione di Genova e del Genovesato*. Vol. I. Ferrando, Genova: 151-178.
- 180 - DUSE A., 1941 - *Risultato degli inanellamenti dell'Osservatorio Ornitologico del Garda negli anni 1936, 1937, 1938, 1939, 1940*. Ric. Zool. appl. Caccia (16): 1-60.

- 181 - DUSE A., CHIGI F., AGOSTINI A., ROTONDI M., PAOLUCCI C. & TOSCHI A., 1935 - *Ricerche sulla migrazione della Quaglia (Coturnix coturnix coturnix L.) in Italia*. Ric. Zool. appl. Caccia (9): 1-125.
- 182 - ELTER O., 1986 - *La Collezione Ornitologica del Museo di Zoologia dell'Università di Torino*. Mus. Reg. Sc. Nat., Torino.
- 183 - FANTIN G., 1972 - *Gli edredoni in Italia*. Riv. ital. Orn. 42: 185-194, 451-454.
- 184 - FANTIN G., 1974 - *L'Aquila minore (Hieräetus pennatus)*. Riv. ital. Orn. 44: 241-249.
- 185 - FANTIN G., 1975 - *L'Usignolo d'Africa (Agrobates galactotes)*. Riv. ital. Orn. 45: 55-60.
- 186 - FANTIN G., 1975 - *Il Fanello nordico (Carduelis flavirostris)*. Riv. ital. Orn. 45: 241-251.
- 187 - FANTIN G., 1976 - *Il Piropiro codalunga (Bartramia longicauda, Bechstein)*. Uccelli d'Italia 1: 22-25.
- 188 - FANTIN G., 1977 - *La Strolaga maggiore Gavia immer (Brünnich)*. Uccelli d'Italia 2: 252-267.
- 189 - FARINA A., 1981 - *Contributo alla conoscenza dell'avifauna nidificante nella Lunigiana*. Boll. Mus. S. Nat. Lunig. 1: 21-70.
- 190 - FARNETI A., PRATESI F. & TASSI F., 1977 - *Guida alla natura d'Italia*. Mondadori, Milano.
- 191 - FASCE P., 1981 - *Recensemement et succes de reproduction de l'Aigle royal (L.) dans les Alpes septentrional*. In: Aa. Vv., Rapaces mediterranées. C.R.O.P., Aix en Provence: 92-94.
- 192 - FASCE P. & L., 1984 - *L'Aquila reale in Italia. Ecologia e conservazione*. L.I.P.U., Parma.
- 193 - FASCE P. & FASCE L., 1992 - *Gipeto Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 480-488.
- 194 - FASCE P. & FASCE L., 1992 - *Pellegrino Falco peregrinus Tunstall, 1771*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 682-693
- 195 - FASCE P. & MINGOZZI T., 1983 - *Il Falco pellegrino (Falco peregrinus) sulle Alpi occidentali*. Riv. ital. Orn. 53: 161-173.
- 196 - FAVERO L., 1954 - *Notizie ornitologiche anni 1953-54*. Riv. ital. Orn. 24: 213-215.
- 197 - FAVERO L., 1955 - *Notizie ornitologiche anno 1955*. Riv. ital. Orn. 25: 189-191.
- 198 - FAVERO L., 1967 - *Notizie sulla Sula bassana (L.)*. Riv. ital. Orn. 37: 258-259.
- 199 - FERRAGNI O., 1885 - *Avifauna Cremonese*. Ronzi e Signori, Cremona.
- 200 - FERRAGNI O., 1924 - *Un Larus glaucus Brünn. colto nel Cremonese*. Natura 15: 83.
- 201 - FIGUIER L., 1881 - *Gli uccelli*. Treves, Milano.
- 202 - FIOR T., SPANÒ S. & BAINO R., 1986 - *Wintering gulls (Larus ridibundus and Larus argentatus) in Genoa area*. In: First Conference on birds wintering in the Mediterranean region. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina X: 380.
- 203 - FOCARDI S. & SPINA F. (cur.), 1986 - *Rapporto sui censimenti invernali degli Anatidi e della Folaga in Italia (1982-1985)*. I.N.B.S., Ozzano Emilia.
- 204 - FOSCHI F., 1976 - *I nostri maestri. Ettore Arrigoni degli Oddi (1867-1942)*. Uccelli d'Italia 1: 97-103.
- 205 - FOSCHI F., 1986 - *Uccelli di Romagna*. Maggioli, Rimini.
- 206 - FOSCHI U.F., 1984 - *Catalogo delle collezioni del Museo Ornitologico Ferrante Foschi*. Amm. Com., Forlì.
- 207 - FOSCHI U.F., 1992 - *Pellicano Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 125-127.
- 208 - FOSCHI U.F. & GELLINI S. (cur.), 1987 - *Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Forlì*. Maggioli, Rimini.
- 209 - FRACASSO G., NIEDERFRINGER O. & PIACENTINI A., 1984 - *Nuovo status per l'Usignolo maggiore, Luscinia luscinia, in Italia?* Riv. ital. Orn. 54: 230-234.
- 210 - FRUGIS S., 1951 - *Il Lodolaio Falco subbuteo (Linnaeus) in Italia*. Riv. ital. Orn. 21: 94-98.
- 211 - FRUGIS S. & COLL., 1980-81 - *Gli Uccelli. Dizionario illustrato dell'avifauna italiana*. Olimpia, Firenze.
- 212 - FUMAGALLI C., 1964 - *Nota sugli uccelli inanellati a Pozzolo Martesana (Milano) dal sig. Cesare Fumagalli*. Riv. ital. Orn. 34: 268-270.
- 213 - GALUPPO C., 1985 - *Tentativo di nidificazione di Pappagallo monaco Myiopsitta monachus sulle alture di Quezzi (Genova)*. Avifauna 8: 66-67.
- 214 - GALUPPO C., 1985 - *Osservazioni nell'area del torrente Bisagno dalla foce a ponte Serra (Genova) durante il periodo gennaio-giugno 1984*. Avifauna 8: 82-84.
- 215 - GENERO F., 1992 - *Moretta grigia Aythya marila (Linnaeus, 1761)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 397-401.
- 216 - GENERO F., 1992 - *Orchetto marino Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 413-416.
- 217 - GENERO F., 1992 - *Aquila di mare Haliaetus albicilla (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 471-479.
- 218 - GENERO F., 1992 - *Grifone Gyps fulvus (Hablitz, 1783)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 494-514.
- 219 - GENERO F., 1992 - *Avvoltoio monaco Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 515-520.
- 220 - GENERO F., 1992 - *Aquila anatraia maggiore Aquila clanga Pallas, 1811*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 593-597.
- 221 - GENERO F., 1992 - *Aquila minore Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 611-615.

- 222 - GEROUDET P., 1991 - *Les mouvement transcontinentaux de jeunes Eider à duvet (Somateria mollissima) en 1988 et leurs suites*. Nos Oiseaux 41: 1-38.
- 223 - GESTRO R., 1924 - *Naturalisti liguri del secolo scorso*. Boll. Munic. "Il Comune di Genova" (3): estratto.
- 224 - GESTRO R., 1928 - *Le origini e lo sviluppo del Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria"*. Boll. Soc. Amici Mus. Civ. St. Nat. "Giacomo Doria" 1: estratto.
- 225 - GIGLIOLI E.H., 1879-94 - *Iconografia della Avifauna italiana*. Prato-Firenze.
- 226 - GIGLIOLI E.H., 1881 - *Elenco delle specie di uccelli che trovansi in Italia stazionarie o di passaggio, colla indicazione della nidificazione e della migrazione*. Annali di Agricoltura 36 : 1-133.
- 227 - GIGLIOLI E.H., 1886 - *Avifauna italica*. Succ. Le Monnier, Firenze.
- 228 - GIGLIOLI E.H., 1889 - *Primo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. Parte prima. Avifauna italica*. Succ. Le Monnier, Firenze.
- 229 - GIGLIOLI E.H., 1890 - *Primo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. Parte seconda. Avifaune locali*. Succ. Le Monnier, Firenze.
- 230 - GIGLIOLI E.H., 1891 - *Primo resoconto dei risultati della inchiesta ornitologica in Italia. Parte terza ed ultima. Notizie d'indole generale*. Succ. Le Monnier, Firenze.
- 231 - GIGLIOLI E.H., 1907 - *Secondo resoconto dei risultati dell'inchiesta ornitologica in Italia. Avifauna italica*. Stab. Tip. S. Giuseppe, Firenze.
- 232 - GIGLIO Tos E., 1923 - *Gli uccelli d'Italia*. Musso, Torino.
- 233 - GIORGINI M. & RIDONDELLI S., 1992 - *Osservazione di un Piro-piro terek, Xenus cinereus, nella periferia di Genova*. Avocetta 16: 53.
- 234 - GIORGINI M. & TRUFFI G., 1990 - *Primo accertamento di presenza di Lanario, Falco biarmicus, in Liguria*. Riv. ital. Orn. 60: 204-205.
- 235 - GIRIBALDI G., 1932 - *Il passo primaverile nella provincia di Imperia (Liguria)*. Riv. ital. Orn. 2: 251.
- 236 - GIRIBALDI G., 1939 - *Circa il passo autunnale degli uccelli in provincia di Imperia*. Riv. ital. Orn. 9: 117-118.
- 237 - GIRIBALDI G., 1941 - *Il Cuculo dal ciuffo in Liguria*. Riv. ital. Orn. 11: 126-127.
- 238 - GIRIBALDI G., 1944 - *Il passo autunnale in quel di Bordighera (Imperia)*. Riv. ital. Orn. 14: 31.
- 239 - GIRIBALDI G., 1952 - *I danni prodotti nella provincia di Imperia all'agricoltura, agli uccelli e mammiferi dalla Iridomyrmex humilis (Mayr)* - *Formica argentina*. Riv. ital. Orn. 22: 35.
- 240 - GHECCHI RUSCONE G. & MOLTOMI E., 1954 - *Prima cattura in Italia di Berta grigia (Puffinus griseus, Gmelin)*. Riv. ital. Orn. 24: 125-127.
- 241 - GORLIER G., 1975 - *Osservazioni ornitologiche del litorale e della zona di mare comprese tra Vado Ligure (SV) e Finale Ligure (SV)*. Riv. ital. Orn. 45: 61-67.
- 242 - GORLIER G., 1977 - *Osservazioni di uccelli marini nel comprensorio Savona - Noli-Finale*. Riv. ital. Orn. 47: 134-137.
- 243 - GROSSO G., 1981 - *Gabbiani d'inverno*. Avifauna 4: 129-130.
- 244 - GRUSSU M. & SECCI A., 1986 - *Prima nidificazione in Italia dell'Airone guardabuoi Bubulcus ibis*. Avocetta 10: 131-136.
- 245 - ISENMAN P. & CZAJKOWSKI M.A., 1978 - *Notes sur un recensement de Laridés entre Nice et Naples en décembre 1977*. Riv. ital. Orn. 48: 143-148.
- 246 - ISOLA F., 1889 - *Notizie di caccia e note zoologiche*. Boll. natur. 9: 202.
- 247 - ISOLA F., 1890 - *Notizie di caccia e note zoologiche*. Boll. natur. 10: 74.
- 248 - ISOLA C.A., 1892 - *Notizie di caccia e note zoologiche*. Boll. natur. 12: 25.
- 249 - JACQUAT B., 1978 - *Schweizerische Ringfunkmeldung für 1976 und 1977*. Orn. Beob. 75: 133-169.
- 250 - JACQUAT B., 1982 - *Schweizerische Ringfunde von Bergfinken Fringilla montifringilla: Ein Beitrag zum Problem der Masseneinflüge*. Orn. Beob. 79: 265-272.
- 251 - KANITZ S., CASTELLO G., SPANO S., BOVERO M., BATTAGLIA M., LA ROCCA M.C., 1980 - *Determinazione dei residui antiparassitari clorurati in campioni di avifauna selvatica raccolti in Italia*. Giornale di Igiene e Medicina Preventiva 21 (1-2): estratto.
- 252 - KEVE A., 1966 - *Studi sulle variazioni nella Ghiandaia (Garrulus glandarius L.) d'Italia*. Riv. ital. Orn. 36: 315-323.
- 253 - KOLLER M., 1983 - *I Rondoni e i loro voli*. Avifauna 6: 32-33.
- 254 - KOLLER M., 1984 - *Osservazioni sulle Capinere svernanti a Chiavari (prov. di Genova)*. Avifauna 7: 181-184.
- 255 - LAPINI L. & TELLINI G., 1989 - *Segnalazione della Cincia dal ciuffo, Parus cristatus, in Toscana*. Riv. ital. Orn. 59: 287-288.
- 256 - LEPORATI L., 1951 - *Cattura di Gallina prataiola*. Riv. ital. Orn. 21: 37-38.
- 257 - LEPROTATI L., 1970 - *La Pernice rossa*. Edagricole, Bologna.
- 258 - LEPRI G., 1896 - *Nuove aggiunte all'avifauna romana*. Boll. Soc. Romana Studi Zoologici 5: 49-54.
- 259 - LÉVÉQUE R., 1968 - *Über Verbraitung, Bestandesvernehrung und Zug des Häherkuckucks Clamator glandarius (L.) in Westeuropa*. Orn. Beob. 65: 43-71.
- 260 - LEVI D. & TRUFFI G., 1987 - *Nuova segnalazione di Gabbiano glauco, Larus hyperboreus, in Liguria*. Riv. ital. Orn. 57: 155-156.
- 261 - LONDEI T., 1980 - *Avvistamento di Zigolo delle nevi (Plectrophaenax nivalis) in provincia di Piacenza e situazione di questa specie in Italia*. Riv. ital. Orn. 50: 231-232.

- 262 - MAGNI-GRIFFI F., 1865 - *Di una specie di Hypolais nuova per l'Italia*. Mem. Soc. Ital. Sc. Nat. (1): 1-6.
- 263 - MARANINI M., 1983 - *Visita ai gabbiani del torrente Polcevera*. Avifauna 6: 166-167.
- 264 - MARANINI N., 1979 - *Un nidiaceo di rondone raccolto, allevato e successivamente liberato*. Avifauna 2: 239-242.
- 265 - MARANINI N., 1979 - *Note su alcune specie ornitiche differenziate, in prevalenza passeriformi, che si incontrano in natura e la fissazione delle mutazioni fattoriali in cattività*. Avifauna 2: 268-290.
- 266 - MARANINI N., 1980 - *Appunti sulla curiosa ubicazione di un nido di Pettirosson Erithacus rubecula*. Avifauna 3: 221-223.
- 267 - MARANINI N., 1981 - *Appunti su un nido di Pigliamosche Muscicapa striata*. Avifauna 4: 181-182.
- 268 - MARANINI N., 1981 - *Accertata nidificazione di Turdus philomelos e di Parus cristatus in una zona dell'entroterra savonese*. Atti I Conv. ital. Orn., Aulla: 111-114.
- 269 - MARANINI N., 1982 - *Ancora sul Pigliamosche. Singolare caso di un secondo nido collocato sulla stessa pianta e nella identica posizione del primo*. Avifauna 5: 107-109.
- 270 - MARANINI N., 1982 - *Qualche notizia sulle incursioni predatorie della Ghiandaia Garrulus glandarius (L.) in una zona dell'entroterra savonese e la sua utilità nell'ambiente con breve cenno alle sue varianti subspecifiche*. Avifauna 5: 163-174.
- 271 - MARANINI N., 1982 - *Interessante nido di Merlo Turdus merula (L.) con due pulli albini ottenuto in condizioni di cattività*. Avifauna 5: 199-202.
- 272 - MARANINI N., 1983 - *Un caso di associazione interspecifica in difesa della prole alla vista del predatore*. Avifauna 6: 274-276.
- 273 - MARANINI N., 1984 - *Insediamento stabile di piccole colonie di Germano reale Anas platyrhynchos a Campo Ligure (GE) e Ovada (AL)*. Avifauna 7: 111-112.
- 274 - MARANINI N., 1985 - *Un nido di Cincia mora Parus ater ubicato nello sfiatatoio della cucina di casa*. Avifauna 8: 80-81.
- 275 - MARANINI N., 1985 - *Situazione dell'Averla cenerina, Lanius minor, in Liguria. Dati attuali e storici*. Riv. ital. Orn. 55: 79-82.
- 276 - MARANINI N., 1988 - *Nidi di Rondine (Hirundo rustica) nelle vie cittadine di due delegazioni di Genova*. Picus 14: 17-24.
- 277 - MARANINI N., 1988 - *Avvistamento di Oca facciabianca, Branta leucopsis, in provincia di Genova*. Riv. ital. Orn. 58: 207.
- 278 - MARANINI L., 1989 - *L'avifauna di passo, nidificante e invernale nel Parco del Peralto a Genova*. Picus 15: 7-19.
- 279 - MARANINI N., 1990 - *Nidi di Rondine Hirundo rustica in altre due delegazioni di Genova*. Picus 16: 27-30.
- 280 - MARANINI N., 1991 - *Presenze ornitiche sul torrente Polcevera a Genova dal 1 dicembre 1987 al 30 aprile 1990*. Picus 17: 5-20.
- 281 - MARANINI N., 1991 - *Quattordici anni di osservazioni sull'arrivo e sulla partenza del Rondone, Apus apus, a Genova*. Riv. ital. Orn. 61: 69-70.
- 282 - MARANINI N., 1992 - *Presenza di Svasso collorosso Podiceps grisegena (Bodd.) in abito nuziale a Genova*. Picus 18: 97-98.
- 283 - MARANINI N., 1992 - *Nido di Cincarella Parus caeruleus collocato all'interno di un sedile rustico*. Picus 18: 153-154.
- 284 - MARANINI N., 1992 - *Precoce avvistamento primaverile di Calandrella, Calandrella brachydactila, a Genova*. Riv. ital. Orn. 62: 52-53.
- 285 - MARANINI N., BURLANDO B. & RATO F., 1992 - *Nuovo avvistamento di Oca facciabianca, Branta leucopsis, in Liguria*. Riv. ital. Orn. 62: 60-61.
- 286 - MARANINI N., CORNARA L., BURLANDO B. & BORGO E., 1991 - *Osservazione in Liguria di Piovanello violetto, Calidris maritima*. Riv. ital. Orn. 61: 67-68.
- 287 - MARANINI N. & RIDONDELLI S., 1989 - *Osservazione di Orchetto marino, Melanitta nigra, nel golfo di Genova*. Riv. ital. Orn. 59: 310-311.
- 288 - MARANINI N., SILVANO F. & TORREGIANI F., 1986 - *Nidificazione di Balia dal collare Ficedula albicollis in Liguria*. Uccelli d'Italia 11: 57-59.
- 289 - MARANINI N. & TRUFFI G., 1983 - *Passaggio precoce di Cavalieri d'Italia Himantopus himantopus in Liguria*. Avifauna 6: 276-277.
- 290 - MARANINI N. & TRUFFI G., 1988 - *Nidificazione di Rondine montana, Ptonoprogne rupestris, alla periferia di Genova*. Riv. ital. Orn. 58: 192.
- 291 - MARGIOCCO C., MONTANO G. & SALAMANNA G., 1981 - *Uccelli della Liguria*. Assess. Comun. Pubbl. Istr., Genova.
- 292 - MARTORELLI G., 1895 - *Monografia illustrata degli Uccelli di rapina in Italia*. Mem. Soc. it. Sc. nat. e Museo civ. St. nat. Milano (5): 1-216.
- 293 - MARTORELLI G., 1904 - *Il Beccofrusone (Ampelis garrulus, Linn.)*. Avicula 8: 42-47.
- 294 - MARTORELLI G., 1906 - *Gli uccelli d'Italia*. Cogliati, Milano.
- 295 - MARTORELLI G., 1913 - *Intorno alla "Caccabis labatei"*, Bouteille. Riv. ital. Orn. 2: 184-191.
- 296 - MASNATA G.E., 1931 - *Cacce di Liguria*. Arti Graf. Tigullio, Rapallo.

- 297 - MASSA B & CANGIALOSI G., 1969 - Nuova cattura di *Piro piro codalunga* (*Bartramia longicauda*). Riv. ital. Orn. 39: 410-411.
- 298 - MASSI A., 1990 - *La collezione ornitologica Paolucci*. Quad. Mus. Stor. Nat. Livorno 11: 25-86.
- 299 - MATTEUCCI C. & TOSO S., 1985 - *Note sulla distribuzione e lo status della Storna Perdix perdix in Italia*. In: Dessì Fulgheri F. e Mingozi T. (cur.), Biologia dei Galliformi, Arcavacata: 29-34.
- 300 - MAZZA F., 1890 - *Sul metacromatismo delle piume degli uccelli*. Atti Soc. Ligustica Sc. Nat. e Geogr. 1: 243-260.
- 301 - MELOTTI P. & SAVIGNI G., 1981 - *Analisi degli inanellamenti e riprese di Tordo bottaccio* (*Turdus philomelos* Brehm), *Tordo sassello* (*Turdus iliacus L.*) e *Cesena* (*Turdus pilaris L.*) avvenute in Italia nel periodo 1929-1978. Ric. Biol. Selvaggina (69).
- 302 - MELOTTI P. & SPAGNESI M., 1979 - *Analisi delle riprese di Falco pescatore* (*Pandion h. haliaetus L.*) avvenute in Italia nel periodo 1939-1977. Ric. Biol. Selvaggina (65): 3-19.
- 303 - MERIGGI A., 1992 - *Estate de gestion de la poblaciones de Perdiz roja (Alectoris rufa) en Italia*. In: La Perdiz roja. Gestión del Habitat. Fundacion "la Caixa", Barcelona: 101-108.
- 304 - MESCHINI E. (cur.), 1984 - *I primi dati*. Boll. Progetto Atlante Italiano 1: 7-11.
- 305 - MESCHINI E. & ROSELLI A. (cur.), 1985 - *La situazione di alcune specie*. Boll. Progetto Atlante Italiano 2: 8-11.
- 306 - MESCHINI E. & ROSELLI A. (cur.), 1986 - *La situazione di alcune specie*. Boll. Progetto Atlante Italiano 3: 6-9.
- 307 - MEZZALIRA G. & IAPICHINO C., 1992 - *Falco pecciaiolo* *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758). In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 447-457.
- 308 - MEZZANA N., 1895 - *Rissa tridactyla* Macgill. *Gabbiano terragnolo*. Boll. natur. 15: 25.
- 309 - MEZZANA N., 1910 - *Cattura di un'Aquila clanga*. Avicula 14: 10-11.
- 310 - MEZZANA N., 1910 - *Passaggio di Bianconi*. Avicula 14: 58.
- 311 - MEZZANA N., 1925 - *Il Museo Civico di Storia Naturale in Savona*. Archivio di storia della scienza 6 (5): 206-212.
- 312 - MEZZANA N., 1934 - *Notizie Ornitologiche del Savonese*. Riv. ital. Orn. 4: 166-167.
- 313 - MEZZANA N., 1935 - *Notizie di caccia dalla provincia di Savona durante la stagione venatoria 1934-35*. Riv. ital. Orn. 5: 287-288.
- 314 - MICHELI A., 1992 - *Poiana calzata* *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763). In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 584-588.
- 315 - MINGOZZI T., 1978 - *Il Biancone Circaetus gallicus* (Gmelin 1788) nelle Alpi occidentali piemontesi. Uccelli d'Italia 3: 96-110.
- 316 - MINGOZZI T., 1980 - *Sulla presenza in Piemonte dell'Occhiocotto* *Sylvia melanocephala* (Gmelin) e della *Magnanina* *Sylvia undata* (Boddaert). Riv. Piem. St. Nat. 1: 137-148.
- 317 - MINGOZZI T., 1981 - *Il Falco pellegrino* (*Falco peregrinus*) nelle Alpi occidentali. Riv. ital. Orn. 51: 179-190.
- 318 - MINGOZZI T., 1987 - *Revisione critica delle segnalazioni italiane di Poiana codabianca* (*Buteo rufinus Cr.*). In: Rapaci mediterranei. III. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XII: 155-168.
- 319 - MINGOZZI T., 1992 - *Poiana codabianca* *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827). In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 576-583.
- 320 - MINGOZZI T., BOANO G., PULCHER C. & COLL., 1988 - *Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val d'Aosta 1980-1984*. Museo Reg. Sc. Nat., Torino.
- 321 - MOCCI DEMARTIS A., 1972 - *Terza cattura in Sardegna dell'Orco marino* *Melanitta fusca fusca* (Linneo). Riv. ital. Orn. 42: 248-262.
- 322 - MOLINARO E. & BOANO G., 1982 - *Resoconto generale (anni 1976-1981) dell'attività di inanellamento dell'Osservatorio Ornitologico del Museo Craveri di Bra*. Riv. Piem. St. Nat. 3: 189-226.
- 323 - MOLTOMI E., 1925 - *La Cincia col ciuffo in Liguria*. Natura 16: 39-42.
- 324 - MOLTOMI E., 1931 - *Su alcuni uccelli rari italiani recentemente pervenuti alla Raccolta Ornitologica del Museo di Milano*. Natura 22: 109-113.
- 325 - MOLTOMI E., 1932 - *L'Aquila imperiale* (*Aquila heliaca Savigny*) in Italia. Atti Soc. it. Sc. nat. Mus. civ. St. nat. Milano 71: 281-284.
- 326 - MOLTOMI E., 1934 - *Comparse di Nocciolaia*. Riv. ital. Orn. 4: 129.
- 327 - MOLTOMI E., 1934 - *Le comparse di Sula bassana bassana* (Linn.) in Italia. Rassegna faunistica 1 (2): 56-65.
- 328 - MOLTOMI E., 1935 - *Uccelli inanellati*. Riv. ital. Orn. 5: 116-117.
- 329 - MOLTOMI E., 1936 - *Sull'invasione del Crociere* (*Loxia curvirostra Linn.*) avvenuta in Italia nel 1935. Riv. ital. Orn. 6: 53-60.
- 330 - MOLTOMI E., 1937 - *Ibrido fra Passera solitaria* (*Monticola solitarius solitarius* (L.)) e *Codirossone* (*Monticola saxatilis* (L.)). Riv. ital. Orn. 7: 206-212.
- 331 - MOLTOMI E., 1940 - *Catture interessanti*. Riv. ital. Orn. 10: 62.
- 332 - MOLTOMI E., 1942 - *Comparse dell'Aquila imperiale in Italia*. Riv. ital. Orn. 12: 62-63.
- 333 - MOLTOMI E., 1944 - *Straordinaria comparsa di Cincia mora* (*Parus ater ater* Linneo) nell'Italia settentrionale e centrale nell'autunno ed inverno 1943-44. Riv. ital. Orn. 14: 1-16.
- 334 - MOLTOMI E., 1944 - *La ricomparsa del Crociere nel 1943*. Riv. ital. Orn. 14: 37-42.

- 335 - MOLTONI E., 1944 - *Erratismo in femmine di Fagiano di monte (Lyrurus tetrix tetrix (Linneo))*. Riv. ital. Orn. 14: 71-74.
- 336 - MOLTONI E., 1944 - *Ancora sull'invasione della Cincia mora nel 1943-44*. Riv. ital. Orn. 14: 100-102.
- 337 - MOLTONI E., 1944 - *Il Crociere in Italia nel 1944*. Riv. ital. Orn. 14: 140.
- 338 - MOLTONI E., 1945 - *Elenco degli uccelli italiani con l'attuale nome scientifico e relativa pronuncia in riguardo all'accento*. Riv. ital. Orn. 15: 33-78.
- 339 - MOLTONI E., 1946 - *L'etimologia e il significato dei nomi volgari e scientifici degli uccelli italiani*. Riv. ital. Orn. 16: 3-79.
- 340 - MOLTONI E., 1947 - *Passaggio di Cuculi dal ciuffo - Clamator glandarius (Linneo) - in quel di Bordighera*. Riv. ital. Orn. 17: 143.
- 341 - MOLTONI E., 1947 - *Ancora sulla comparsa del Beccofrusone in Italia nel 1946-47*. Riv. ital. Orn. 17: 143-144.
- 342 - MOLTONI E., 1948 - *La Poiana codabianca - Buteo rufinus rufinus (Cretzschmar) - in Italia*. Riv. ital. Orn. 18: 44-45.
- 343 - MOLTONI E., 1948 - *Gli uccelli dannosi alle api*. Riv. ital. Orn. 18: 74-86.
- 344 - MOLTONI E., 1948 - *Ulteriori osservazioni bromatologiche sugli Uccelli Rapaci italiani*. Riv. ital. Orn. 18: 101-125.
- 345 - MOLTONI E., 1948 - *Uccelli inanellati all'estero e ripresi in territorio italiano*. Riv. ital. Orn. 18: 126-134.
- 346 - MOLTONI E., 1949 - *Altre riprese in territorio italiano di uccelli inanellati all'estero*. Riv. ital. Orn. 19: 78-84.
- 347 - MOLTONI E., 1949 - *Alcuni dati sul peso e sulla longevità degli uccelli rapaci italiani*. Riv. ital. Orn. 19: 95-122.
- 348 - MOLTONI E., 1949 - *Comparse dell'Aquila macchiata maggiore - Aquila clanga, Pallas - in Italia nell'autunno-inverno 1948-49*. Riv. ital. Orn. 19: 128-129.
- 349 - MOLTONI E., 1950 - *Notizie su uccelli inanellati all'estero e ripresi in territorio italiano*. Riv. ital. Orn. 20: 7-16.
- 350 - MOLTONI E., 1950 - *Altro accertamento in Europa di Passerella iliaca iliaca (Merrem)*. Riv. ital. Orn. 20: 74-75.
- 351 - MOLTONI E., 1950 - *Dati positivi sull'alimentazione dei Rondoni (Micropus) in Italia*. Riv. ital. Orn. 20: 140-144.
- 352 - MOLTONI E., 1951 - *Ulteriori notizie su uccelli inanellati all'estero e ripresi in territorio italiano*. Riv. ital. Orn. 21: 15-23.
- 353 - MOLTONI E., 1951 - *La frequenza dei Falaropi (Phalaropus) in Italia*. Riv. ital. Orn. 21: 24-28.
- 354 - MOLTONI E., 1951 - *Catture di Gallina prataiola in Alta Italia*. Riv. ital. Orn. 21: 39-40.
- 355 - MOLTONI E., 1951 - *Notizie su due specie di Zigoli (Emberiza) considerati rari per l'Italia*. Riv. ital. Orn. 21: 45-51.
- 356 - MOLTONI E., 1951 - *Le specie di uccelli nel cui nido vengono deposte le uova dal Cuculo*. Riv. ital. Orn. 21: 75-78.
- 357 - MOLTONI E., 1951 - *In Italia i primi Rondoni (Micropus apus) arrivano in marzo*. Riv. ital. Orn. 21: 108-111.
- 358 - MOLTONI E., 1951 - *Alcune notizie sul passo della Cincia mora - Parus ater ater L. - e del Crociere - Loxia c. curvirostra L. - in Italia nel 1949*. Riv. ital. Orn. 21: 163-166.
- 359 - MOLTONI E., 1952 - *Altre notizie su uccelli inanellati all'estero e ripresi in territorio italiano*. Riv. ital. Orn. 22: 1-18.
- 360 - MOLTONI E., 1952 - *Elenco dei rapaci inanellati in Germania e ripresi in Italia ed annotazioni sulla durata dell'inanellamento di alcuni di essi*. Riv. ital. Orn. 22: 76-78.
- 361 - MOLTONI E., 1953 - *Uccelli inanellati all'estero e ripresi in territorio italiano e nella Libia*. Riv. ital. Orn. 23: 1-12.
- 362 - MOLTONI E., 1953 - *Alcune catture di Fenicottero - Phoenicopterus ruber roseus, Pallas - avvenute sul continente italiano*. Riv. ital. Orn. 23: 39-41.
- 363 - MOLTONI E., 1954 - *Alcune notizie su uccelli inanellati all'estero e ripresi in Italia*. Riv. ital. Orn. 24: 1-23.
- 364 - MOLTONI E., 1954 - *Presenza di Rondini montane - Ptyponoprogne rupestris - in quel di Sondrio (Valltellina) nel dicembre 1953*. Riv. ital. Orn. 24: 60.
- 365 - MOLTONI E., 1954 - *Altra cattura di Rusignolo maggiore - Luscinia luscinia (L.) - avvenuta in Italia*. Riv. ital. Orn. 24: 140-141.
- 366 - MOLTONI E., 1954 - *La Tortora dal collare orientale - Streptopelia decaocto decaocto (Frivaldszky) - in Italia*. Riv. ital. Orn. 24: 147-158.
- 367 - MOLTONI E., 1955 - *È la Rondine montana - Ptyponoprogne rupestris rupestris (Scopoli) - sedentaria in parte, ovvero eccezionalmente invernale in Italia?* Riv. ital. Orn. 25: 132-134.
- 368 - MOLTONI E., 1955 - *Altra comparsa di Orchetto marino - Melanitta nigra nigra (L.) - sul Lago Maggiore ed alcune catture nell'Italia centro-settentrionale*. Riv. ital. Orn. 25: 144-145.
- 369 - MOLTONI E., 1955 - *Ricomparsa della Tortora dal collare orientale Streptopelia d. decaocto (Friv.) - in Liguria*. Riv. ital. Orn. 25: 182-183.
- 370 - MOLTONI E., 1955 - *Comparsa del Beccofrusone - Bombycilla g. garrulus (L.) - nell'inverno 1953-54 nell'Italia settentrionale*. Riv. ital. Orn. 25: 198-201.

- 371 - MOLTONI E., 1955 - Aggiornamento della lista della Poiana codabianca - *Buteo rufinus rufinus* (Cretschmar) - prese in Italia. Riv. ital. Orn. 25: 203-204.
- 372 - MOLTONI E., 1956 - Notizie sul passo del Crociere - *Loxia curvirostra* - nel 1952 e 1953-54 in Italia. Riv. ital. Orn. 26: 67-77.
- 373 - MOLTONI E., 1956 - Il Corrione biondo - *Cursorius cursor cursor* (Latham) - in Italia. Riv. ital. Orn. 26: 82-85.
- 374 - MOLTONI E., 1957 - Notizie sul passo del Crociere - *Loxia curvirostra* - in Italia nel 1956-57. Riv. ital. Orn. 27: 122-124.
- 375 - MOLTONI E., 1957 - Elenco degli Edredoni - *Somateria mollissima* (L.) - catturati in Italia. Riv. ital. Orn. 27: 154-157.
- 376 - MOLTONI E., 1957 - L'Averla baia od Averla capirossa africana - *Lanius senator badius*, Hartl. - si può rinvenire anche nell'Italia settentrionale. Riv. ital. Orn. 27: 158-161.
- 377 - MOLTONI E., 1958 - Note su alcune riprese in Italia e nella Libia di uccelli inanellati all'estero. Riv. ital. Orn. 28: 1-74.
- 378 - MOLTONI E., 1958 - Codirossi (*Phoenicurus phoenicurus*), Codirossi spazzacamino (*Phoenicurus ochruros gibraltariensis*) e Pettirossi (*Erithacus rubecula*) inanellati all'estero e ripresi in Italia. Riv. ital. Orn. 28: 124-132.
- 379 - MOLTONI E., 1958 - La Rondine di mare maggiore - *Hydroprogne caspia* (Pallas) - in Italia. Riv. ital. Orn. 28: 218-223.
- 380 - MOLTONI E., 1958 - Le catture del Pigliamosche pettirosso in Italia. Riv. ital. Orn. 28: 232-233.
- 381 - MOLTONI E., 1959 - Alcuni casi di nidificazione del Falco pecchiaiolo - *Pernis apivorus* - in Piemonte e Lombardia. Riv. ital. Orn. 29: 16-21.
- 382 - MONTONI E., 1959 - Comparsa in Italia del Beccofrusone - *Bombycilla g. garrulus* (L.) - nel 1959. Riv. ital. Orn. 29: 170-172.
- 383 - MOLTONI E., 1960 - Altra Averla baia - *Lanius senator badius*, Hartl., catturata in Piemonte ed alcuni dati su questa averla. Riv. ital. Orn. 30: 162-166.
- 384 - MOLTONI E., 1961 - Altra cattura di Spioncello marino o settentrionale - *Anthus spinolella littoralis*, Brehm - in Italia. Riv. ital. Orn. 31: 120-121.
- 385 - MOLTONI E., 1961 - Altre Poiana codabianca - *Buteo rufinus rufinus* (Cretschmar) - prese in Italia. Riv. ital. Orn. 31: 121.
- 386 - MOLTONI E., 1962 - Il Canapino - *Hippolais polyglotta* (Vieillot) - nidifica in Lombardia, Piemonte e Liguria. Riv. ital. Orn. 32: 56-57.
- 387 - MOLTONI E., 1962 - Notizie sul passo dello Zigolo della neve - *Plectrophenax nivalis nivalis* (Linneo) - in Italia. Riv. ital. Orn. 32: 121-132.
- 388 - MOLTONI E., 1962 - Catture di Stercorario mezzano - *Stercorarius pomarinus* (Temminck) - in Italia nel 1961. Riv. ital. Orn. 32: 149.
- 389 - MOLTONI E., 1962 - Altre notizie di catture, o comparse, del Cuculo dal ciuffo - *Clamator glandarius* (L.) - in Italia. Riv. ital. Orn. 32: 282-283.
- 390 - MOLTONI E., 1965 - Il Cuculo dal ciuffo - *Clamator glandarius* (L.) - ha nidificato in Italia ove si è fatto meno raro. Riv. ital. Orn. 35: 237-241.
- 391 - MOLTONI E., 1965 - Alcune Poiane calzate - *Buteo lagopus lagopus* (Brünn.) - catturate in Italia nei primi mesi del 1963. Riv. ital. Orn. 35: 242-244.
- 392 - MOLTONI E., 1966 - Altre notizie su uccelli inanellati all'estero e ripresi in Italia e in Libia. Riv. ital. Orn. 36: 109-314.
- 393 - MOLTONI E., 1968 - La Pavoncella gregaria - *Chettusia gregaria* (Pallas) - in Italia. Riv. ital. Orn. 38: 67-70.
- 394 - MOLTONI E., 1968 - Escursioni ornitologiche all'Isola d'Ischia (Napoli) tra il maggio 1967 e l'aprile 1968. Riv. ital. Orn. 38: 81-149.
- 395 - MOLTONI E., 1968 - Notizie sull'Otarda - *Otis tarda tarda* (L.) - in Italia. Riv. ital. Orn. 38: 223-234.
- 396 - MOLTONI E., 1968 - Dono al Museo Civico di Storia Naturale di Milano di un esemplare di Gruccione egiziano - *Merops persicus persicus*, Pallas - preso a Malta. Riv. ital. Orn. 38: 296-298.
- 397 - MOLTONI E., 1969 - Le comparse in Italia del Beccofrusone *Bombycilla garrulus garrulus* (L.) nel 1963-64, 1965-66 e 1967-68. Riv. ital. Orn. 39: 1-25.
- 398 - MOLTONI E., 1969 - Altra notizia sull'Otarda - *Otis tarda tarda* L. - in Italia. Riv. ital. Orn. 39: 55-56.
- 399 - MOLTONI E., 1969 - Lo Storno roseo - *Pastor roseus* (L.) - in Italia. Riv. ital. Orn. 39: 128-157.
- 400 - MOLTONI E., 1970 - Altra Silvia del Rüppell - *Sylvia rüppelli*, Temminck - presa in Italia. Riv. ital. Orn. 40: 70-72.
- 401 - MOLTONI E., 1970 - Altra Averla meridionale - *Lanius excubitor meridionalis*, Temminck - presa in Liguria. Riv. ital. Orn. 40: 72-74.
- 402 - MOLTONI E., 1971 - Notizie riguardanti la comparsa in Italia del Beccofrusone - *Bombycilla g. garrulus* (L.) - nel 1970-71. Riv. ital. Orn. 41: 150-160.
- 403 - MOLTONI E., 1973 - Gli uccelli ad oggi rinvenuti o notati all'Isola di Pantelleria (Provincia di Trapani, Sicilia). Riv. ital. Orn. 43: 173-437.
- 404 - MOLTONI E., 1973 - Elenco di parecchie centinaia di uccelli inanellati all'estero e ripresi in Italia e in Libia. Riv. ital. Orn. 43 suppl.: 1-182.

- 405 - MOLTOM E., 1974 - *Note riguardanti la comparsa in Italia del Beccofrusone - Bombycilla g. garrulus*. (L.) - nel 1971-72 (con qualche notizia sulle incursioni degli anni immediatamente precedenti). Riv. ital. Orn. 44: 197-205.
- 406 - MOLTOM E., 1976 - *Nuovi dati su uccelli inanellati all'estero e ripresi in Italia e in Libia*. Riv. ital. Orn. 46 suppl.: 1-71.
- 407 - MOLTOM E., 1977 - *Uccelli inanellati presi in Umbria*. Riv. ital. Orn. 47: 31-54.
- 408 - MOLTOM E. & BRICHETTI P., 1976 - *Note riguardanti la comparsa in Italia del Beccofrusone - Bombycilla garrulus* (L.) - negli autunni-inverni 1974-75 e 1975-76. Riv. ital. Orn. 46: 24-32.
- 409 - MOLTOM E. & BRICHETTI P., 1978 - *Elenco degli uccelli italiani*. Riv. ital. Orn. 48: 65-142.
- 410 - MOLTOM E. & BRICHETTI P., 1979 - *Osservazioni ornitologiche nell'isola di Mallorca (Isole Baleari) agli inizi dell'aprile 1979 ed Elenco degli uccelli inanellati presi alle Isole Baleari*. Riv. ital. Orn. 49: 117-186.
- 411 - MOLTOM E. & VANDONI C., 1931 - *Note alla 2^a ed. di: Martorelli G., Gli uccelli d'Italia*, Rizzoli, Milano.
- 412 - MOLTOM E. & VANDONI C., 1960 - *Note alla 3^a ed. di: Martorelli G., Gli uccelli d'Italia*, Rizzoli, Milano.
- 413 - MONTAGNA D. & TOSO S., 1992 - *Starna Perdix perdix (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 799-811.
- 414 - MOSTINI L., 1990 - *Uccelli e risorse alimentari di origine vegetale*. Riv. ital. Orn. 60: 97-98.
- 415 - MUSEO CRAVERI & G.P.S.O., 1986 - *Uccelli inanellati in Piemonte. Rapporto 1985*. Riv. Piem. St. Nat. 7: 197-211.
- 416 - NORANTE N., 1980 - *Il Corrione biondo - Cursorius cursor (Latham)*. Uccelli d'Italia 5: 242-252.
- 417 - OLIOSO G., 1980 - *Observation d'un Mergule nain Alle alle en Méditerranée*. Alauda 48: 257.
- 418 - ORLANDO C., 1955 - *Cuculo dal ciuffo - Clamator glandarius (L.)*. Riv. ital. Orn. 25: 163-170.
- 419 - ORLANDO C., 1956 - *Nuove notizie sulla frequenza del Cuculo dal ciuffo, Clamator glandarius (L.), in Italia*. Riv. ital. Orn. 26: 174-177.
- 420 - ORSINI G., 1879 - *Catalogo di uccelli della Liguria raccolti dal dottore Gaetano Orsini*. Martini, Genova.
- 421 - ORTALI A., 1974 - *Gli Uccelli del Museo Brandolini*. Galeati, Imola.
- 422 - PACINI CANDELO M., 1901 - *Tra i Cigni*. Avicula 5: 23-24.
- 423 - PACINI CANDELO M., 1902 - *Discorso sul Museo di Storia Naturale*. In: Solenne inaugurazione della Pinacoteca Civica e del Museo. Ricci, Savona: 29-44.
- 424 - PANIZZI N., 1897 - *Catture di specie rare od avventizie e note ornitologiche*. Avicula 1: 39-40.
- 425 - PANIZZI N., 1897 - *Cacce e passaggi*. Avicula 1: 52-53.
- 426 - PARODI D., 1887 - *Cyanacula leucocycanea*. Boll. natur. 7: 76.
- 427 - PARODI D., 1887 - *Passo di uccelli*. Boll. natur. 7: 89.
- 428 - PARODI R., 1887 - *Catalogo della Collezione Ornitolologica del Museo Friulano di Storia Naturale*. Mus. Friulano St. Nat., Udine.
- 429 - PARODI R. & PERCO F., 1992 - *Cigno minore Cygnus columbianus (Ord, 1815)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 252-257.
- 430 - PARONA C., 1900 - *Il Museo Zoologico dell'Università di Genova (Cenni storici)*. Boll. Musei Zoologia e Anatom. Comp. R. Univ. di Genova (94): 1-5.
- 431 - PATRIZI-MONTORO F., 1909 - *Materiali per una avifauna della provincia di Roma*. Boll. Soc. Zool. Ital. 18: estratto.
- 432 - PAVESE M., BOERO P. & PREFUMO R., 1985 - *Nidificazione di Martin pescatore Alcedo atthis all'interno di nidi artificiali*. Picus 11: 5-10.
- 433 - PAZZUCONI A., 1966 - *La nidificazione del Ciuffolotto nelle province di Pavia e di Genova*. Riv. ital. Orn. 36: 381-382.
- 434 - P.D.E. (ma D. Parodi), 1890 - *Note ornitologiche*. Boll. natur. 10: 81-82.
- 435 - P.D.E. (ma D. Parodi), 1890 - *Note ornitologiche*. Boll. natur. 10: 141.
- 436 - PERCO D. & F., 1976 - *I rapaci, conoscerli e proteggerli*. Ist. Encycl. Friuli-Venezia Giulia.
- 437 - PERCO F., 1969 - *Sulla cattura di un'Aquila imperiale nei pressi di Monfalcone*. Riv. ital. Orn. 39: 236-238.
- 438 - PERCO F., LAMBERTINI M., LO VALVO M., MILONE A., 1986 - *Gabbiano reale Larus cachinnans Pallas, 1811*. In: Fasola M. (cur.), Distribuzione e popolazione dei Laridi e Sternidi nidificanti in Italia. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XI: 53-72.
- 439 - PERCO F. & UTMAR P., 1992 - *Edredone Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 401-406.
- 440 - PESENTI P.G., 1948 - *Ricerche sulla migrazione della balia nera, del codirosson e del pettirosso*. Riv. ital. Orn. 18: 57-64.
- 441 - PETRETTI A. & F., 1981 - *Statut et conservation du Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus en Italie. Premières données*. In: Rapaces mediterranées. C.R.O.P., Aix en Provence: 108-110.
- 442 - PETRETTI F., 1976 - *Sulla presenza della Sula - Sula b. bassana (L.) - nel Mar Tirreno*. Riv. ital. Orn. 46: 51-57.
- 443 - PICCHI C., 1899 - *Breve nota sulle catture della Rissa Tridactyla (Linn.) "Gabbiano terragnolo" in Sardegna e sulla sua frequenza in Italia*. Avicula 3: 153-156.

- 444 - PICCHI C., 1903 - *Nota sopra alcuni rapaci della mia collezione ornitologica italiana*. Avicula 7: 35-45.
- 445 - PICCHI C., 1904 - *Elenco degli uccelli conservati nella sua Collezione Ornitológica Italiana al 29 febbraio 1904 con notizie intorno alla distribuzione e nidificazione in Italia*. Ornis 12: 381-542.
- 446 - PICCHI C., 1910 - *Sulla comparsa nell'Adriatico del Larus audouini Payr. ed ulteriori notizie sull'habitat e sui caratteri giovanili distributivi di questo gabbiano*. Avicula 14: 41-48.
- 447 - PODENZANA G., 1888 - *Notizie di caccia e note ornitologiche*. Boll. natur. 8: 74.
- 448 - PODENZANA G., 1891 - *Notizie di caccia e note zoologiche*. Boll. natur. 11: 33-34.
- 449 - PODENZANA G., 1891 - *Notizie di caccia e note zoologiche*. Boll. natur. 11: 88.
- 450 - PODENZANA G., 1912 - *Aggiunte all'Avifauna della Lunigiana*. Riv. ital. Orn. 2: 1-10.
- 451 - PODENZANA G., 1914 - *La cattura di una "Uria troile" nel Golfo della Spezia*. Riv. ital. Orn. 3: 136-138.
- 452 - POLLACCI G., 1905 - *L'Isola Gallinara e la sua flora*. Atti Ist. Bot. Univ. Pavia 9: 113.
- 453 - PRATESI F., 1978 - *Parchi nazionali e zone protette d'Italia*. Musumeci, Aosta.
- 454 - PRIOLI A. & BOCCA M., 1992 - *Coturnice Alectoris graeca (Meisner, 1804)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 766-777.
- 455 - RALLO G.P., 1979 - *Osservazioni ornitologiche in Lunigiana, litorale toscano e Montefeltro*. Boll. Mus. Civ. Venezia 30: 215-233.
- 456 - REALINI G., 1979 - *Uccelli nidificanti in provincia di Varese. Quaderno 2: uccelli della montagna*. Amm. Prov., Varese.
- 457 - REALINI G., 1982 - *Uccelli nidificanti in provincia di Varese*. Reg. Lombardia, Milano.
- 458 - REGALIA E., 1909 - *Catture di specie rare od avventizie*. Avicula 13: 70.
- 459 - RIDOLFI C., 1908 - *Collezione Ornitológica di Meleto in Val d'Elsa*. Ricci, Firenze.
- 460 - ROMÉ A. & TRAVISON G., 1982 - *Nuovi dati sul Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) in Italia*. Riv. ital. Orn. 52: 85-90.
- 461 - ROSSI A., 1953 - *Notizie ornitologiche da Sori (Genova)*. Riv. ital. Orn. 23: 165.
- 462 - ROSSI A., 1954 - *Note liguri*. Riv. ital. Orn. 24: 190-191.
- 463 - ROSSI A., 1955 - *L'Orchetto marino (Melanitta nigra nigra) in Liguria*. Riv. ital. Orn. 25: 143.
- 464 - ROSSI A., 1962 - *Catture rare*. Riv. ital. Orn. 32: 60.
- 465 - ROSSI D., 1948 - *Cattura di Poiana codabianca - Buteo r. rufinus (Cretzschmar) - nei pressi di Roma*. Riv. ital. Orn. 18: 42-43.
- 466 - ROSSI D., 1971 - *Dove, come e perché migrano gli uccelli*. Mursia, Milano.
- 467 - ROTONDI M., 1963 - *Migratori alati*. A.R.O., Roma.
- 468 - RYDZEWSKI W., 1960 - *Recoveries of ringed birds. Mediterranean Islands*. Riv. ital. Orn. 30: 1-77.
- 469 - SAINO N. & CANOVA L., 1992 - *Volpoca Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 305-310.
- 470 - SALVADORI T., 1864 - *Catalogo degli uccelli di Sardegna*. Atti Soc. it. Sc. Nat. 6: 63.
- 471 - SALVADORI T., 1872 - *Fauna d'Italia. Uccelli*. Vallardi, Milano.
- 472 - SALVADORI T., 1887 - *Elenco degli uccelli italiani*. R. Ist. Sordomuti, Genova.
- 473 - SALVADORI T., 1888 - *Altre notizie intorno ai Serratte in Italia nel 1888*. Boll. Mus. Zool. Anatom. Comp. R. Univ. Torino 3 (52).
- 474 - SALVADORI T., 1889 - *Le ultime notizie intorno ai Serratte in Italia negli anni 1888 e 1889*. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. Univ. Torino 4 (70).
- 475 - SALVADORI T., 1890 - *Res Ligusticae XIII. Il Cypselus affinis in Liguria*. Annali Museo Civ. St. Nat. Genova 9: 549-553.
- 476 - SALVADORI T., 1905 - *Nota intorno allo Stercorario mezzano (Lestrus pomatorhinus)*. Avicula 9: 151.
- 477 - SALVADORI T., 1912 - *Catture del "Turdus aureus" in Italia*. Riv. ital. Orn. 1: 121-124.
- 478 - SALVADORI T., 1912 - *Cattura di un Pigliamosche pettirosso in Liguria*. Riv. ital. Orn. 1: 162.
- 479 - SALVADORI T., 1914 - *Notizie storiche intorno alla Collezione ornitologica del Museo di Torino*. Mem. R. Accad. Scienze Torino 65: 1-49.
- 480 - SANNAZZARO A., 1973 - *Il Phalaropus fulicarius (L.) in Piemonte*. Riv. ital. Orn. 43: 462-466.
- 481 - SANTINI L. & FARINA A., 1978 - *Roditori e insettivori predati da Tyto alba nella Toscana settentrionale. Avocetta* 1: 49-60.
- 482 - SANTORELLI F., 1935 - *Catture di Otarda (Otis tarda) in Italia nel 1933-34*. Riv. ital. Orn. 5: 213-216.
- 483 - SAVI P., 1827-31 - *Ornitologia toscana*. Nistri, Pisa.
- 484 - SAVI P., 1873-77 - *Ornitologia italiana*. Succ. Le Monnier, Firenze.
- 485 - SCHEMBRI A., 1843 - *Quadro geografico-ornitologico ossia quadro comparativo le ornitologie di Malta, Sicilia, Roma, Toscana, Liguria, Nizza e la provincia di Gard*. Tip. Anglo-Maltese, Valletta.
- 486 - SCHLAW H., 1877 - *Tagebuchnotizen aus Italien*. Jour f. Ornith. 25: 191-202.
- 487 - SCOTTI P., 1947 - *La distribuzione del Circus pygargus in Italia*. Riv. ital. Orn. 17: 151-157.
- 488 - SECCI A., 1980 - *Nuovi dati sul passo della Cicogna bianca (Ciconia ciconia) in Sardegna*. Uccelli d'Italia 5: 175-189.
- 489 - SILVANO F., 1978 - *Cattura di Cesena fosca Turdus naumanni eunomus*. Uccelli d'Italia 3: 250.
- 490 - SILVANO F., 1979 - *Catture di Gabbiani tridattili nel Golfo Ligure*. Riv. ital. Orn. 49: 108-109.
- 491 - SILVANO F., 1979 - *Osservazioni ornitologiche*. In: Aa. Vv., Spedizione dall'Antola al Po via Scrivia. Notiz. Gruppo Naturalisti Stazzano (29): 18-23.

- 492 - SILVANO F., 1981 - *Note sull'alimentazione del Gheppio nell'Italia nord occidentale (Aves, Falconiidae)*. Riv. Piem. St. Nat. 2: 231-235.
- 493 - SILVANO F., 1984 - *Nuova segnalazione di Falco della regina Falco eleonorae (Genè) per il Piemonte (Aves, Falconiidae)*. Riv. Piem. St. Nat. 5: 241-242.
- 494 - SILVANO F., 1986 - *Presenza di un Grifone, Gyps fulvus, in Piemonte*. Riv. ital. Orn. 56: 125-126.
- 495 - SILVIUS (ma C. Carpeneti), 1891 - *Guida pratica illustrata del cacciatore in Liguria*. Bacigalupi, Genova.
- 496 - SORCI G., MASSA B. & CANGIALOSI G., 1971 - *Il genere Stercorarius Brisson è regolare nel Mediterraneo*. Riv. ital. Orn. 41: 161-198.
- 497 - SORCI G., MASSA B. & CANGIALOSI G., 1973 - *Avifauna delle Isole Egadi con notizie riguardanti quella della provincia di Trapani (Sicilia)*. Riv. ital. Orn. 43: 1-119.
- 498 - SPALLANZANI L., 1792-97 - *Opuscoli cinque sopra diverse specie di Rondini. Appendice a Viaggi alle due Sicilie e in alcune parti dell'Appennino*. Pavia.
- 499 - SPANÒ S., 1965 - *La Sula (Sula bassana bassana (L.)) in Italia*. Riv. ital. Orn. 35: 1-33.
- 500 - SPANÒ S., 1966 - *Ulteriori notizie sulla comparsa di Sula bassana (L.) in Italia*. Riv. ital. Orn. 36: 91-92.
- 501 - SPANÒ S., 1966 - *Due brevi notizie*. Riv. ital. Orn. 36: 91-92.
- 502 - SPANÒ S., 1967 - *Considerazioni su una raccolta ornitologica della Liguria orientale*. Riv. ital. Orn. 37: 314-335.
- 503 - SPANÒ S., 1968 - *Una cattura di Codazzurro (Tarsiger cyanurus cyanurus (Pallas))*. Riv. ital. Orn. 38: 57-58.
- 504 - SPANÒ S., 1969 - *Nota preliminare per uno studio dell'avifauna del Promontorio di Portofino (Genova)*. Riv. ital. Orn. 39: 251-304.
- 505 - SPANÒ S., 1969 - *Note ornitologiche sul Promontorio di Portofino*. Archivio Botanico e Biogeografico Italiano 14: 370-374.
- 506 - SPANÒ S., 1971 - *Brevi note ornitologiche dalla Liguria*. Riv. ital. Orn. 41: 32.
- 507 - SPANÒ S., 1974 - *Il contributo alla conoscenza dei ritmi di occupazione ornitica dell'aeroporto di Genova*. Riv. ital. Orn., 44: 81-114.
- 508 - SPANÒ S., 1975 - *Il Gabbiano zafferano in Liguria*. Mondo degli Uccelli 5 (5): 16.
- 509 - SPANÒ S., 1975 - *Indagini ornitologiche nell'aeroporto di Genova*. Mondo degli Uccelli 5 (6): 10.
- 510 - SPANÒ S., 1976 - *Osservazioni ornitologiche nell'Orto Botanico di Genova*. Mondo degli Uccelli 6: 19.
- 511 - SPANÒ S., 1976 - *Gli stormi svernanti a Genova (inverno 1974-75)*. Mondo degli Uccelli 6: 29.
- 512 - SPANÒ S., 1976 - *Stormi svernanti (1976)*. Mondo degli Uccelli 6: 43.
- 513 - SPANÒ S., 1976 - *Appunti sulla Tortora dal collare orientale*. Mondo degli uccelli 6: 118.
- 514 - SPANÒ S., 1976 - *Catture e osservazioni interessanti*. Mondo degli Uccelli 6: 176.
- 515 - SPANÒ S., 1976 - *I Gabbiani*. Mondo degli Uccelli 6: 180-181.
- 516 - SPANÒ S., 1977 - *Conferma di Cutrettola testigialla orientale (Motacilla citreola Pallas) in Italia*. Riv. ital. Orn. 47: 235-238.
- 517 - SPANÒ S., 1977 - *Avifauna ligure. Vecchi e nuovi dati*. Mondo degli Uccelli 7: 15-33.
- 518 - SPANÒ S., 1977 - *Considerazioni sui piccioni delle nostre piazze*. Mondo degli Uccelli 7: 109-110.
- 519 - SPANÒ S., 1977 - *Gli stormi svernanti a Genova*. Mondo degli uccelli 7: 138.
- 520 - SPANÒ S., 1977 - *Avifauna ligure (Vecchi e nuovi dati)*. Uccelli d'Italia 2: 231-233.
- 521 - SPANÒ S., 1978 - *Stormi svernanti e considerazioni diverse*. Avifauna 1: 45-47.
- 522 - SPANÒ S., 1978 - *Nuovi ibridi naturali Alectoris rufa rufa (L.) x Alectoris graeca saxatilis (Bechstein) sulle Alpi Marittime e relative considerazioni tassonomiche*. Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 82: 154-162.
- 523 - SPANÒ S., 1979 - *Nuova cattura di Ortolano grigio in Italia*. Riv. ital. Orn. 49: 295-296.
- 524 - SPANÒ S., 1980 - *Uccelli avvelenati*. Avifauna 3: 84-85.
- 525 - SPANÒ S., 1980 - *La Beccaccia in casa*. Avifauna 3: 284-285.
- 526 - SPANÒ S., 1981 - *Taccole a Genova*. Avifauna 4: 79-81.
- 527 - SPANÒ S., 1981 - *Respirazione bocca a bocca ad una Tortora*. Avifauna 4: 122.
- 528 - SPANÒ S., 1982 - *Gli uccelli selvatici hanno davvero terrore della cattura e della gabbia?* Avifauna 5: 182.
- 529 - SPANÒ S., 1982 - *Stato attuale ed evoluzione dell'avifauna nella città di Genova: analisi delle relative, probabili cause*. Avifauna 5: 257-262.
- 530 - SPANÒ S., 1982 - *Il punto sulla Beccaccia*. Olimpia, Firenze.
- 531 - SPANÒ S., 1983 - *Indici kilometrici di abbondanza in diverse località alpine e collinari (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria) in periodo riproduttivo*. Uccelli d'Italia 8: 176-188.
- 532 - SPANÒ S., 1983 - *Uccelli nidificanti sulle Alpi Liguri*. Boll. Mus. Ist. biol. Univ. Genova 50-51: 39-53.
- 533 - SPANÒ S., 1984 - *I Parrocchetti dal collare Psittacula krameri si sono ambientati allo stato libero anche nella città di Genova*. Avifauna 7: 58.
- 534 - SPANÒ S., 1984 - *Ancora sui "pappagalli" in libertà*. Avifauna 7: 124.
- 535 - SPANÒ S., 1984 - *Nidificazioni curiose*. Avifauna 7: 138.
- 536 - SPANÒ S., 1984 - *Pernice rossa e Coturnice*. U.N.C.Z.A., Cuneo.
- 537 - SPANÒ S., 1984 - *Uccelli nidificanti in territorio di Carpeneto (AL): variazioni quali-quantitative nei recenti decenni*. Riv. Piem. St. Nat. 5: 117-129.
- 538 - SPANÒ S., 1985 - *Elenco di alcuni uccelli differenziati raccolti in natura*. Avifauna 8: 79.
- 539 - SPANÒ S., 1985 - *Gli Appennini e la gestione del patrimonio Beccaccia*. In: Atti Conv. Progetto Faunistico dell'Appennino, F. I. d. C., Pescara: 64-69.

- 540 - SPANÒ S., 1985 - *Stato e prospettive della ricerca sulla Pernice rossa Alectoris rufa in Italia*. In: Fasola M. (red.), Atti III Conv. ital. Orn., Salice Terme: 19-24.
- 541 - SPANÒ S., 1986 - *La Pernice rossa. Risultati delle ricerche promosse dalla Regione Liguria sull'allevamento e la reintroduzione*. Reg. Liguria - Sagep, Genova.
- 542 - SPANÒ S., 1986 - *Nidificazione di Gabbiano reale, Larus cachinnans, nella città di Genova*. Riv. ital. Orn. 56: 269-270.
- 543 - SPANÒ S., 1987 - *La caccia in Liguria*. Reg. Liguria - Sagep, Genova.
- 544 - SPANÒ S., 1988 - *Nouvelles données sur la Becasse en Italie*. In: Troisième Symposium européen sur la Becasse et la Becassine. Compte rendu, Paris: 108-113.
- 545 - SPANÒ S., 1992 - *Pernice rossa Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 779-786.
- 546 - SPANÒ S. & BACCHETTI N., 1992 - *Sula Sula bassana (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 93-99.
- 547 - SPANÒ S. & BORGO E., 1987 - *Ulteriore reperto di Falco della regina, Falco eleonorae, nel basso Piemonte*. Riv. ital. Orn. 57: 272-273.
- 548 - SPANÒ S. & PODESTÀ E., 1981 - *Quindici anni di inanellamenti a Chiavari e Lavagna (Osservatorio Ornitologico Ligure): risultati e osservazioni*. Boll. Mus. Ist. biol. Univ. Genova 48-49: 143-168.
- 549 - SPANÒ S. & TOSCHI A., 1969 - *Ritmi di occupazione ornitica dell'aeroporto di Genova in un ciclo annuale*. Riv. ital. Orn. 39: 305-383.
- 550 - SPANÒ S. & TRAVERSO G., 1985 - *Pernice rossa e Coturnice appenninica*. In: Atti Conv. Progetto Faunistico dell'Appennino, FI.d.C., Pescara: 165-166.
- 551 - SPANÒ S., TRAVERSO G., TRUFFI G., ZACCHELLI D., 1985 - *Distribuzione e consistenza della Pernice rossa Alectoris rufa in Italia e definizione dell'areale potenziale di reintroduzione della specie*. In: Fasola M. (red.), Atti III Conv. ital. Orn., Salice Terme: 55-57.
- 552 - SPANÒ S., TRAVERSO G., TRUFFI G., ZACCHELLI D., 1987 - *La Pernice rossa Alectoris rufa in Italia*. Boll. Mus. Ist. biol. Univ. Genova 53: 5-33.
- 553 - SPANÒ S. & TRUFFI G., 1984 - *Nuova cattura di Usignolo d'Africa, Cercotrichas galactotes galactotes, in Liguria e rassegna delle presenze in Italia*. Riv. ital. Orn. 54: 81-87.
- 554 - SPANÒ S. & TRUFFI G., 1986 - *Il Parrocchetto dal collare, Psittacula krameri, allo stato libero in Europa, con particolare riferimento alle presenze in Italia, e primi dati sul Pappagallo monaco, Myiopsitta monachus*. Riv. ital. Orn. 56: 231-239.
- 555 - SPANÒ S. & TRUFFI G., 1987 - *Gli Uccelli della Liguria occidentale*. Reg. Liguria - Sagep, Genova.
- 556 - SPANÒ S. & TRUFFI G., 1992 - *Quaglia Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 812-824.
- 557 - SPANÒ S., TRUFFI G. & MARSAN A., 1984 - *La Taccola Corvus monedula spermologus Vieillot a Genova e in Liguria*. Uccelli d'Italia 9: 26-30.
- 558 - SPINA F., 1992 - *Falco della regina Falco eleonorae Gené, 1839*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 658-673.
- 559 - THIBAULT J.C., 1983 - *Les Oiseaux de la Corse*. P.N.R.C., Ajaccio.
- 560 - THIBAULT J.C. & PATRIMONIO Q., 1992 - *Falco pescatore Pandion haliaetus (Linneus, 1758)*. In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 622-632.
- 561 - TIBALDI R. & MOLINARO E. (red.), 1991 - *Quindici anni di inanellamento e di rilievi biometrici sull'avifauna piemontese effettuati dal Museo Civico Craveri di Bra*. Mus. Civ. Craveri di St. Nat., Bra.
- 562 - TINARELLI R., 1990 - *Risultati dell'indagine sul Cavaliere d'Italia Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)*. Ric. Biol. Selvaggina (87): 1-102.
- 563 - TOSCHI A., 1934 - *Rapporto sui risultati degli inanellamenti dell'Osservatorio Ornitologico del Garda nel 1931*. Ric. Zool. appl. Caccia (8): 1-102.
- 564 - TOSCHI A., 1937 - *Reperti dell'Osservatorio Ornitologico di Genova*. Ric. Zool. appl. Caccia (10): 47-72.
- 565 - TOSCHI A., 1938 - *Risultati delle ricerche sulla migrazione dello Storno in Italia (Sturnus vulgaris, L.)*. Ric. Zool. appl. Caccia (12): 1-58.
- 566 - TOSCHI A., 1956 - *Esperienze sul comportamento di quaglie (Coturnix c. coturnix (L.)) a migrazione interrotta*. Ric. Zool. appl. Caccia (27): 1:275.
- 567 - TOSCHI A., 1969 - *Avifauna italiana*. Olimpia, Firenze.
- 568 - TORNIELLI A., 1955 - *Esperienze di inanellamenti eseguiti dall'anno 1948 alla primavera 1955*. Riv. ital. Orn. 25: 192-194.
- 569 - TORREGIANI F., 1978 - *La Calandrella*. Avifauna 1: 170-174.
- 570 - TOSO S. (red.), 1983 - *Nuovi avvistamenti*. Avocetta 7: 59-61.
- 571 - TOSO S. (red.), 1985 - *Nuovi avvistamenti*. Avocetta 9: 89-92.
- 572 - TRUFFI G., 1976 - *Un caso documentato di assistenza interspecifica unilaterale Pettirosso-Ballerina gialla. Mondo degli Uccelli* 6: 87-89.
- 573 - TRUFFI G., 1977 - *Lo Zigolo minore*. Mondo degli Uccelli 7: 252-255.
- 574 - TRUFFI G., 1978 - *Ancora sul Passero*. Avifauna 1: 163-167.
- 575 - TRUFFI G., 1980 - *Ancora sul parassitismo di cova: il Cuculo e i suoi ospiti in Italia*. Avifauna 3: 127-134.

- 576 - TRUFFI G., 1983 - *Gli uccelli parassitati dal Cuculo Cuculus canorus L. in Italia. Vecchi e nuovi dati.* Avifauna 6: 65-80.
- 577 - TRUFFI G., 1983 - *Il Cuculo dal ciuffo, Clamator glandarius, in Liguria.* Riv. ital. Orn. 53: 15-25.
- 578 - TRUFFI G., 1984 - *Airone guardabuoi, Bubulcus ibis, presente in inverno 1984 alla periferia di Genova e nel Savonese.* Riv. ital. Orn. 54: 97.
- 579 - TRUFFI G., 1984 - *Primo contributo alla conoscenza degli uccelli presenti in primavera-estate nel Parco Naturale di Capanne di Marcarolo (AL).* Riv. Piem. St. Nat. 5: 151-159.
- 580 - TRUFFI G., 1985 - *Nuove segnalazioni di Passera d'Italia, Passer domesticus italiae, che si nutre di lucertole.* Riv. ital. Orn. 55: 98.
- 581 - TRUFFI G., 1985 - *Nuova osservazione di Airone guardabuoi, Bubulcus ibis, nei dintorni di Genova in gen-naio 1985.* Riv. ital. Orn. 55: 199-200.
- 582 - TRUFFI G., 1985 - *Materiali per una storiografia ornitologica minore: la distrutta Collezione di Santa Margherita Ligure (Genova) e note sull'avifauna del Promontorio di Portofino e del golfo del Tigullio.* Uccelli d'Italia 10: 128-131.
- 583 - TRUFFI G., 1986 - *Gli uccelli parassitati dal Cuculo Cuculus c. canorus in Italia: nuove segnalazioni e riconferme.* Avocetta 10: 53-57.
- 584 - TRUFFI G., 1986 - *Analisi delle presenze di Merlo dal collare, Turdus torquatus, in località pianeggianti e collinari della Liguria.* Riv. ital. Orn. 56: 257-260.
- 585 - TRUFFI G., 1986 - *Nuove segnalazioni di presenza di Cuculo dal ciuffo, Clamator glandarius, in Liguria.* Riv. ital. Orn. 56: 262-263.
- 586 - TRUFFI G., 1986 - *Materiali per una storiografia ornitologica minore. Nota 2: reperti interessanti nella Collezione dei padri Salesiani ad Alassio.* Uccelli d'Italia 11: 41-45.
- 587 - TRUFFI G., 1987 - *Rassegna delle specie ospiti del Cuculo Cuculus c. canorus nelle singole regioni italiane.* Picus 13: 23-28.
- 588 - TRUFFI G., 1987 - *Indici kilometrici di abbondanza rilevati in periodo riproduttivo in località collinare della Liguria centro-orientale.* Riv. ital. Orn. 57: 146-149.
- 589 - TRUFFI G., 1991 - *Liguria. Notizie.* Habitat 1 (0): 34-35.
- 590 - TRUFFI G., 1991 - *Ulteriori presenze invernali di Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) in Liguria (1988-89).* In: S.R.O.P.U. (red.), Atti V Conv. ital. Orn., Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XVII: 493-496.
- 591 - TRUFFI G., 1992 - *Strolaga minore Gavia stellata (Pontoppidan, 1763).* In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 1-8.
- 592 - TRUFFI G., 1992 - *Strolaga mezzana Gavia arctica (Linnaeus, 1758).* In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 9-15.
- 593 - TRUFFI G., 1992 - *Strolaga maggiore Gavia immer (Brünnich, 1764).* In: Brichetti P. et al. (eds.), Fauna d'Italia. XXIX. Aves. I. Calderini, Bologna: 16-22.
- 594 - TRUFFI G., BORGEO E., SPANO S., 1991 - *Edredoni (Somateria mollissima) e mitilicoltura a La Spezia. Un approccio per la stima dei danni.* In: Spagnesi M. e Toso S. (eds.), Atti II Convegno Nazionale dei Biologi della Selvaggina. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XIX: 721-723.
- 595 - TRUFFI G. & MARANINI N., 1989 - *Nidificazione di Corriere piccolo, Charadrius dubius, nell'alveo del torrente Bisagno nell'area urbana di Genova.* Riv. ital. Orn. 59: 102-104.
- 596 - TRUFFI G. & MARANINI N., 1989 - *Presenza di Gabbiano roseo, Larus genei, a Genova.* Riv. ital. Orn. 59: 290-291.
- 597 - UNTERSTEINER L., 1911 - *I nostri migliori uccelli canori.* Hoepli, Milano.
- 598 - VAN DER STRAAETEN J. & VERHAGEN M., 1991 - *Changing lands use patterns and the breeding birds of the ligurian Apennines.* Sovon, Beek.
- 599 - VASSALLO M., 1974 - *Notizie ornitologiche.* Riv. ital. Orn. 44: 318-319.
- 600 - VASSALLO M., 1975 - *Un'altra Averla meridionale presa in Liguria.* Riv. ital. Orn. 45: 292.
- 601 - VASSALLO M., 1977 - *Aquila anatrica e Zigolo delle nevi in provincia di Imperia (Liguria) nel novembre 1976.* Riv. ital. Orn. 47: 69-70.
- 602 - VASSALLO M., 1978 - *Uccelli non comuni da me preparati, presi recentemente nella Liguria di Ponente e in Piemonte (provincia di Cuneo).* Riv. ital. Orn. 48: 180-183.
- 603 - VIOLANI C., DATURI A., CAGNOLARO L., 1984 - *Uccelli estinti e rari nei Musei naturalistici di Milano, Genova e Firenze.* Riv. ital. Orn. 54: 105-178.
- 604 - VIVIANI M.D., 1807 - *Voyage dans les Apennines de la ci-devant Ligurie pour servir d'introduction a l'histoire naturelle de ce Pays.* Giossì, Génés.
- 605 - ZANGHERI P. & PASA A., 1969 - *Uccelli e mammiferi.* Martello, Firenze.

ELENCO DELLE SPECIE

Strolaga minore *Gavia stellata* (Pontoppidan, 1763)

2(c); 12; 54(c); 66; 71; 79; 125(c); 131(c); 132(c); 134(c); 178; 179; 227; 228(c); 229; 231; 241; 420(c); 485; 517; 555(c); 591 (c)

Strolaga mezzana *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758)

2(c); 12; 19; 23; 26; 79; 178; 179; 227; 228(c); 229; 231; 420(c); 450(c); 471(c); 485; 502(c); 504(c); 505; 517; 555; 592(c)

Strolaga maggiore *Gavia immer* (Brünnich, 1764)

12; 21(c); 22(c); 26(c); 79; 131(c); 151; 179(c); 188(c); 226(c); 227(c); 228(c); 229; 231(c); 471(c); 472(c); 517; 548; 555(c); 589; 593(c)

Tuffetto *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764)

2(c); 54; 79; 125; 131(c); 133(c); 134(c); 178; 179; 227; 228(c); 229; 420(c); 485; 502(c); 517; 548; 555

Svasso maggiore *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758)

19; 22; 26; 79; 125(c); 131(c); 178; 179; 182(c); 227; 228(c); 229; 282; 294; 420(c); 450(c); 485; 504(c); 505; 517; 555(c)

Svasso colorosso *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783)

26(c); 79; 131(c); 178; 179; 227(c); 228(c); 229; 231(c); 282; 420(c); 471(c); 485; 517; 548; 555(c)

Svasso cornuto *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758)

26(c); 79; 97; 125; 134(c); 178; 179; 226(c); 227(c); 228(c); 229; 231(c); 450(c); 471; 485; 517; 555(c)

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis* C.L. Brehm, 1831

23; 26; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228(c); 229; 420(c); 485; 502(c); 517; 555

Fulmaro *Fulmarus glacialis* (Linnaeus, 1761)

110(c)

Berta di Bulver *Bulweria bulwerii* (Jardine & Selby, 1828)

21(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 105; 115; 211(c); 231 (c); 338(c); 409; 517; 559; 567

Berta maggiore *Calonectris diomedea* (Scopoli, 1769)

2(c); 3(n); 68; 79; 87; 125(c); 131(c, n); 134(c); 178; 179; 182(c); 227; 228(n); 229; 230; 232; 241; 291; 420(c); 471; 483; 485; 495; 517; 555

Berta grigia *Puffinus griseus* (Gmelin, 1789)

83(c); 105; 115; 116; 150(c); 159; 173(c); 409; 412(c); 502(c); 504(c); 505; 517(c); 520(c); 567

Berta minore *Puffinus puffinus* (Brünnich, 1764)

2(c); 19; 42; 68; 79; 87; 96; 98(c); 125; 133; 159; 176(c); 178; 179(c); 182(c); 227(c); 229; 230(a); 231; 241; 420(c); 428(c); 450(c); 459(c); 471; 483(c); 484(c); 485; 495; 504(c); 505; 517; 555(c); 570

Uccello delle tempeste *Hydrobates pelagicus* (Linnaeus, 1758)

2(c); 22; 23; 26; 79; 87; 131; 159; 178; 179; 182(c); 223(c); 225(c); 227; 228; 229; 241; 420(c); 471; 485; 517; 555(c)

Sula *Sula bassana* (Linnaeus, 1758)

2(c); 7(c); 19; 21; 22(c); 23(c); 26(c); 54(c); 68; 79(c); 83; 104; 158(c); 159; 182(c); 198(c); 226; 227; 228(c); 231(c); 241; 242; 291; 294(c); 327; 442; 471; 472; 499(c); 500(c); 504(c); 505; 506(c); 517; 520(c); 546; 555(c); 602(c)

Cormorano *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758)

2(c); 3(n); 19; 28; 30; 49(r); 54(c); 71; 79; 89; 125(c); 131(c); 134(c); 159; 178; 179; 214; 227; 228; 229; 241; 242; 485; 495; 504(c); 505; 507; 517; 548; 549; 555(c, n)

Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis* (Linnaeus, 1761)
13(n); 21; 22; 23; 71; 79; 89; 99; 153; 178(c); 179; 227; 445; 471; 485; 517; 548; 549; 555

Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus* (Pallas, 1773)
23; 26; 79; 89; 226(c); 228; 231; 517; 555

Pellicano *Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758
79; 125(c); 178(c); 179; 207; 228; 485; 517; 555

Tarabuso *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758)
3(n); 4; 54(c, n); 79; 125; 131(c); 134(c); 153(n); 178; 179; 227; 228; 229; 280; 296; 485; 517; 520; 555

Tarabusino *Ixobrycus minutus* (Linnaeus, 1766)
3(n); 66; 79; 91; 100; 125; 131(c); 134(c); 153(n); 159; 178; 179; 214; 225(c); 227; 228; 229; 230; 280; 420(c); 485; 517; 548(i); 555

Nitticora *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758)
49(r); 54(c, r); 66; 71; 79; 107; 125; 131(c); 134(c); 153; 159; 178; 179; 214; 227; 228; 229; 230; 280; 291; 296; 312; 392(r); 420(c); 485; 509; 517; 548; 549; 555

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769)
54; 79; 107; 125; 133(c); 134(c); 159; 178; 179; 227; 228; 229; 230; 280; 420(c); 449(c); 485; 502; 507; 509; 517; 548; 549; 555; 604(c)

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758)
4; 21(c); 22(c); 79; 107; 109; 178(c); 179; 226; 227(c); 231(c); 244; 294(c); 445; 470(c); 471(c); 472; 484(c); 485; 517; 555(c); 578(c); 581; 589; 590

Garzetta *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766)
2(c); 4; 6; 19; 49(r); 54(c, r); 66; 71; 79; 107; 125(c); 131(c); 134(c); 153; 178; 179; 227; 228(c); 229; 241; 280; 291; 404(r); 406(r); 420(c); 449(c); 485; 502(c); 504; 505; 507; 509; 517; 548; 549; 555(c, r)

Airone bianco maggiore *Egretta alba* (Linnaeus, 1758)
31; 79; 131(c); 134(c); 149; 178(c); 179; 227; 229; 280; 296; 448(c); 450(c); 485; 517; 520; 555(c)

Airone cenerino *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758
1(n); 3(n); 19; 45(r); 48(r); 49(r); 54(c, r); 66; 79; 107(r); 125; 131(c); 134(c); 149; 152(c); 153; 159; 178; 179; 227; 228(c); 229; 230; 241; 280; 294; 296; 313(c); 404(r); 420(c); 485; 502(c); 504; 505; 507; 509; 517; 548; 549; 555(c)

Airone rosso *Ardea purpurea* Linnaeus, 1766
9(i); 10(r); 48(r); 49(r); 54(c); 55(c); 66; 79; 107; 125; 131(c); 134(c); 153; 159; 178; 179; 182(c); 227; 228; 229; 230; 280; 313; 392(r); 404(r); 420(c); 461; 485; 502(c); 504(c); 505; 507; 509; 517; 548; 549; 555(c); 582

Cicogna nera *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)
2(c); 8(c); 65; 79; 179; 227; 296; 420(c); 517; 520; 555(c)

Cicogna bianca *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758)
2(c); 18; 49(r); 54; 56(r); 65; 79; 89; 125(c); 131(c); 132; 152(c); 159; 178; 179; 227; 228(c); 229; 280; 296(c); 359(r); 377(r); 392(r); 406(r); 485; 488(c); 517; 520; 555(c); 582(c)

Mignattaio *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766)
2(c); 54; 79; 89; 125; 131(c); 132; 134(c); 178(c); 179; 227; 228; 229; 296; 420(c); 485; 502(c); 517; 520; 555(c); 604(c)

Spatola *Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758
2(c); 79; 125(c); 131(c); 178; 179; 227; 228; 229; 485; 517; 520; 555(c)

Fenicottero *Phoenicopterus ruber* Linnaeus, 1758
2(c); 54; 79; 83; 91; 101; 125(c); 131(c); 150; 178; 179; 227(c); 228(c); 229(c); 231; 362(c); 411(c); 412(c); 471; 485; 517; 529; 543; 555(c); 599(c); 602(c)

Cigno reale *Cygnus olor* (Gmelin, 1789)

54; 203; 227(c); 228(c); 422(c); 428(c); 471(c); 517; 555(c)

Cigno minore *Cygnus columbianus* (Ord, 1815)

429(c); 517; 520; 555(c)

Cigno selvatico *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758)

79; 125(c); 178; 179; 227; 422(c); 485; 517; 555(c)

Oca granaiola *Anser fabalis* (Latham, 1787)

2(c); 54; 131(c); 134(c); 153; 178; 179; 227; 229; 296; 420(c); 485; 517; 555

Oca lombardella *Anser albifrons* (Scopoli, 1769)

2(c); 54; 79; 178; 179; 227; 231; 485; 517; 555(c)

Oca lombardella minore *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758)

517; 520

Oca selvatica *Anser anser* (Linnaeus, 1758)

54; 79; 125; 153; 280; 495; 517; 520; 548; 555

Oca faccianebbia *Branta leucopsis* (Bechstein, 1803)

111; 277; 285

Oca colombaccio *Branta bernicla* (Linnaeus, 1758)

22(c); 26(c); 79; 108; 231; 517

Casarea *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764)

517(c); 520

Volpoca *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758)

2(c); 19; 22; 54; 79; 131; 134(c); 178; 203; 228(c); 229; 420(c); 448(c); 450(c); 469; 471; 485(c); 495; 517; 548; 555

Anatra mandarina *Aix galericulata* (Linnaeus, 1758)

112(c); 130(c); 517; 555(c)

Fischione *Anas penelope* Linnaeus, 1758

54; 66; 79; 125; 131(c); 149; 153; 178; 179; 203; 227; 228; 229; 230; 280; 420(c); 485; 495; 517; 548; 555

Canapiglia *Anas strepera* Linnaeus, 1758

54; 79; 125; 131(c); 178; 228(c); 229; 485; 502(c); 517; 548; 555

Alzavola *Anas crecca* Linnaeus, 1758

2(c); 19; 49(r); 54; 66; 79; 125; 131(c); 134(c); 153; 178; 179; 203; 227; 228; 229; 230; 280; 392(r); 420(c); 485; 502(c); 507; 517; 548; 549; 555

Germano reale *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758

1(n); 2(c); 3(n); 9(i); 19; 44(r); 54(n); 66; 79; 106(n); 125; 131(c); 132(n); 133(c); 134(c); 149; 153(n); 178; 179; 203; 227; 228; 229(c, n); 230; 273(n, a); 280; 291(n); 296; 322(r); 420(c); 485; 495; 502(c); 504; 505; 509; 517(n); 543(n); 548; 549; 555(n, r); 561(r)

Codone *Anas acuta* Linnaeus, 1758

19; 54; 79; 131(c); 134(c); 153; 178; 179; 227; 228; 229; 280; 296; 420(c); 485; 495; 509; 517; 548; 549; 555

Marzaiola *Anas querquedula* Linnaeus, 1758

2(c); 3(n); 19; 54; 66; 125; 131(c); 134(c); 153; 178; 179; 203; 227; 228; 229; 230; 280; 291; 296(n); 359(r); 392(r); 404(r); 420(c); 425; 485; 495; 502(c); 504; 505; 507; 509; 517; 543; 548; 549; 555

Mestolone *Anas clypeata* Linnaeus, 1758

19; 54; 66; 125; 131(c); 153; 178; 179; 203; 227; 228; 229; 280; 296; 377(r); 420(c); 450(c); 485; 495; 507; 509; 517; 548(i); 555

Anatra marmorizzata *Marmaronetta angustirostris* (Menetries, 1832)
79; 517; 520

Fistione turco *Netta rufina* (Pallas, 1773)
2(c); 20(c); 22; 79; 125; 131(c); 178; 179; 203; 227; 228; 311(c); 420(c); 450(c); 470; 483; 485; 495; 517;
548; 555(c)

Moriglione *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758)
2(c); 19; 49(r); 54(r); 79; 125; 131(c); 134(c); 153; 159; 178; 179; 203; 227; 228; 229; 420(c); 485; 517; 548;
555

Moretta tabaccata *Aythya nyroca* (Gäldenstädt, 1770)
22; 54; 79; 125; 131(c); 134(c); 151; 178; 227; 228; 229; 420(c); 450(c); 470; 485; 495; 517; 548; 555

Moretta *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758)
19; 49(r); 54; 66; 79; 125; 131(c); 153; 178; 179; 203; 227; 228; 229; 280; 420(c); 485; 495; 502(c); 517;
548; 555

Moretta grigia *Aythya marila* (Linnaeus, 1761)
20(c); 79; 131(c); 178(c); 179; 215; 227; 228; 229; 470; 485; 502; 517; 548; 555

Edredone *Somateria mollissima* (Linnaeus, 1758)
7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 25(c); 26(c); 54(c, n); 66; 71; 73; 74; 75; 79; 82(c); 83; 103; 153; 183(c); 222;
223(c); 227(c); 228(c); 229; 231(c); 294(c); 311(c); 375(c); 439; 445; 472(c); 506(c); 517; 520; 555(c);
594

Re degli edredoni *Somateria spectabilis* (Linnaeus, 1758)
7(c); 23(c); 26(c); 69; 74(c); 83(c); 105; 113(c); 117; 231(c); 338(c); 409; 412(c); 517; 555(c); 567(c)

Moretta codona *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758)
20(c); 21(c); 22(c); 26(c); 79; 131(c); 134(c); 227(c); 228(c); 229; 231; 445; 517; 543; 555(c)

Orchetto marino *Melanitta nigra* (Linnaeus, 1758)
19; 21(c); 22(c); 23; 26(c); 54; 79; 179; 216; 227(c); 231(c); 287; 368(c); 411(c); 412(c); 445; 463(c); 502(c);
517; 555

Orco marino *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758)
2(c); 18(c); 21; 22; 29; 54; 66; 79; 125(c); 129(c); 131(c); 178; 179; 203; 214; 227; 228(c); 229(c); 321(c);
428(c); 470; 472; 485; 502(c); 517; 548; 555(c); 586(c)

Quattroci *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758)
79; 125; 131(c); 133(c); 134(c); 178; 179; 227; 228; 229(c); 392(r); 420(c); 485; 495; 517; 555

Pesciailola *Mergus albellus* Linnaeus, 1758
2(c); 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228(c); 229; 231; 420(c); 450(c); 485; 495; 517; 555(c)

Smergo minore *Mergus serrator* Linnaeus, 1758
2(c); 19; 54; 66; 79; 125(c); 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228; 229; 230; 241; 242; 420(c); 485; 502(c);
509; 517; 549; 555(c)

Smergo maggiore *Mergus merganser* Linnaeus, 1758
2(c); 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228; 229; 485; 495; 517; 548

Gobbo rugginoso *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769)
22; 79; 121; 125(c); 131(c); 227; 228(c); 229(c); 471; 485(c); 517; 555

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758)
2(c); 3(n); 20(c); 21; 22; 23; 32; 33; 34; 39(n); 71; 79; 131(c); 134(c); 142; 159; 178; 179; 182(c); 201; 225;
227; 228(c); 229; 230; 231; 232; 292(c); 307(n); 344(c); 347(c); 381; 406(r); 420(c); 450; 485; 502(c);
517(n); 548; 555(c, n)

Nibbio bruno *Milvus migrans* (Boddaert, 1783)
2(c); 3(n); 22(n); 32; 33; 34; 39(n); 79(n); 125(n); 131(c); 145(n); 159; 162; 178(c, n); 179(n); 208; 225(c);
227(c); 228; 311(c); 420(c); 471(n); 483(c, n); 484; 485(n); 517; 555(n); 582

- Nibbio reale** *Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 3(n); 32; 33; 34; 39(n); 79; 125(c); 131(c); 134(c); 178; 179(n); 201; 227; 228; 420(c); 485; 517; 555(n)
- Aquila di mare** *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 3(n); 26(n); 79(c); 83; 105; 131(c); 134(c); 173; 178(c); 179; 217; 227; 228; 229; 292; 420; 485; 517; 555; 567(n)
- Gipeto** *Gypaetus barbatus* (Linnaeus, 1758)
 162; 178; 179; 193; 227; 485; 517; 520; 555
- Capovaccaio** *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 41; 79; 83(n); 145; 178; 179; 411(c); 412(c, n); 423(c); 485; 517; 555(c, n)
- Grifone** *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783)
 79(c); 125(c); 178; 179; 218; 227(c); 231; 464(c); 471(c); 476; 485; 494; 517; 555
- Avvoltoio monaco** *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766)
 21; 22; 23; 26; 79(c); 178(c); 179; 213; 227; 445; 471(c); 485; 517; 555
- Biancone** *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788)
 1(n); 2(c, n); 3(n); 21; 22; 26; 32; 33; 34; 39(n); 60(n); 79; 83(n); 124(c, n); 125(n); 131(c); 132; 134(c); 142; 143(n); 145(n); 159; 178(n); 179(n); 182(c); 190(n); 201; 206(c); 225; 226; 227(n); 228(n); 229(n); 230(a, c); 231(a, c); 235(c); 270(n); 291; 292; 294; 296(n); 310(c); 312; 315; 347; 420(c); 441(n); 444(c); 445(c); 462; 472; 485(n); 502(c); 504(c); 505; 517(n); 520; 555(c, n); 567; 586(c); 598(n)
- Falco di palude** *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758)
 22; 32; 33; 34; 45(r); 54; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 292; 294; 420(c); 445; 471; 472; 485; 507; 509; 517; 549; 555(c)
- Albanella reale** *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766)
 3(n); 22; 32; 33; 39; 79; 125; 131(c, n); 134(c); 178; 179; 182(c); 227; 228(n); 229; 420(c); 485; 509; 517; 549; 555(n)
- Albanella pallida** *Circus macrourus* (Gmelin, 1771)
 34; 79; 134(c); 159; 178; 179; 225(c); 227; 228; 231; 232; 292; 294; 311(c); 344(c); 347(c); 420(c); 450(c); 471; 485; 504(c); 505; 517; 555(c)
- Albanella minore** *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 21; 32; 33; 34; 54; 79; 83; 131(c); 134(c); 178; 179; 182(c); 225(c); 227; 228; 229; 231; 294; 420(c); 445; 450(c); 485; 487(a, c); 509; 517; 548; 549; 555(c, n)
- Astore** *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758)
 1(n); 2(c, n); 3(n); 34; 79; 94(n); 125; 131(c); 152(c); 178; 179; 227; 228; 229; 280; 412(c); 485; 517(n); 520; 543(n); 555(c, n); 582(c); 598(n)
- Sparviere** *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758)
 2(c, n); 3(n); 32; 33; 34; 39(n); 79(n); 94(n); 125(n); 128; 131(c, n); 134(c); 137; 159; 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 230; 270; 291; 296(n); 420(c); 471(n); 485; 502(c); 517(n); 543; 548; 555(c, n); 598(n)
- Poiana** *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 3(n); 26(c); 32; 33; 34; 39(n); 49(i); 54; 79; 125; 128; 131(c, n); 134(c); 137; 152(c); 153; 178; 179(n); 182(c); 214; 227; 228(n); 229; 230; 270; 278; 280; 291; 296(n); 344(c); 347(c); 420(c); 485; 491; 502(c); 504; 505; 517(n); 531(n); 532; 543; 548; 555(c, n); 582(c); 598(n)
- Poiana codabianca** *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827)
 2(c); 7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79; 225(c); 226(c); 227(c); 294(c); 318(c); 319(c); 331(c); 342(c); 371(c); 385(c); 465(c); 471(c); 472(c); 517; 555(c)
- Poiana calzata** *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763)
 2(c); 26(c); 79; 131(c); 178; 179; 182(c); 225(c); 226; 227(c); 228(c); 229; 231(c); 314; 391(c); 411; 412(c); 420(c); 485; 517; 555(c)
- Aquila anatraia minore** *Aquila pomarina* C.L. Brehm, 1831
 7(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79; 102; 125(c); 178(c); 179; 225(c); 227(c); 445; 471; 472; 485; 517(c); 555(c)

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga* Pallas, 1811
3(n); 22; 26(n); 79; 83(n); 105; 142; 159; 182(c); 220; 225(c); 227; 231; 292; 294; 309(c); 311(c); 348(c); 420(c); 445; 471; 504(c); 505; 517; 555(c); 601(c)

Aquila rapace *Aquila rapax* (Temmink, 1828)
7(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 105; 118(c); 205; 211(c); 225(c); 227(c); 338(c); 409; 412(c); 436(c); 517; 567(c)

Aquila imperiale *Aquila heliaca* Savigny, 1809
3(n); 5(c); 23; 114(c); 125(c, n); 178; 325(c); 332(c); 338(c); 412(c); 436(c); 437(c); 471; 517; 555(c); 567(c)

Aquila reale *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758)
1(n); 2(c, n); 3(n); 39(n); 79(n); 80; 89(n); 125(n); 145; 152(c); 159; 178(n); 179(n); 191(n); 192(n); 227; 228; 229; 291(n); 313(c); 320(n); 347(c); 420(c); 423(c); 424(c); 450(c); 485(n); 517(n); 555(c, n); 582(c); 598(n)

Aquila minore *Hieraetus pennatus* (Gmelin, 1788)
21; 22; 23(c); 26(c); 32; 33; 34; 79; 83; 142; 178(c); 179(c); 184(c); 221; 224(c); 225(c); 226(c); 227(c); 230(a, c); 231(c); 311(c); 420(c); 470(c); 471(c); 484(c); 485; 517; 555(c)

Aquila del Bonelli *Hieraetus fasciatus* (Vieillot, 1822)
3(n); 22; 23; 26; 33; 79; 131(c); 145(n); 153(c); 201; 225; 228(c); 229(c); 231; 517; 555

Falco pescatore *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758)
32; 33; 34; 54; 79; 125(c); 131(c); 134(c); 145; 153; 178; 179; 225; 228; 229; 247(c); 280; 302(r); 360(r); 420(c); 445; 450(c); 485; 502(c); 517; 548; 555(c); 560

Grillai *Falco naumanni* Fleischer, 1818
2(c); 32(r); 33; 79; 131(c); 134(c); 145(c); 178; 179; 227; 228(c); 229; 404(r); 420(c); 450(c); 484; 485; 502(c); 517; 555(c)

Gheppio *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758
3(n); 13(n); 32; 33; 34; 39(n); 49(r); 54; 71(n); 79; 125(n); 128; 131(c, n); 134(c); 137; 145(c); 146(r); 152(c); 153; 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 230; 231; 270; 278(n); 280; 291; 292(c); 294(a, c); 296(n); 344(c); 377(r); 392(r); 404(r); 406(r); 420(c); 452(n); 453(n); 485; 492(c); 502(c); 504(c); 505; 507; 517(n); 531; 532(n); 549(n); 555(n, r); 582(c); 598(n)

Falco cuculo *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766
32; 33; 34; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 226; 227; 228; 229; 230; 292; 294; 296; 420(c); 485; 502(c); 517; 548(i); 555(c)

Smeriglio *Falco columbarius* Linnaeus, 1758
2(c); 32; 33; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228; 229; 296; 485; 517; 548; 555(c)

Lodolaio *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758
3(n); 32; 33; 34; 79; 125; 131(c); 134(c); 145(c); 178; 179; 210(n); 227; 228(c); 229; 230; 344(c); 347(c); 404(r); 420(c); 484(a, c); 485; 502(c); 517; 543(n); 548; 555(c, n); 598(n)

Falco della regina *Falco eleonorae* Gené, 1839
2(c); 3(n); 21; 22(c); 23; 26(c); 61(c); 79; 83; 105; 131(c); 134(c); 178(c); 179(c); 225(c); 226(c); 227(c); 228(c); 229(c); 230(c); 231(c, n); 232; 292; 294(c, n); 412(c); 430(c); 445; 470; 471(c); 484; 485; 493; 517; 547(c, n); 555(c, n); 558

Lanario *Falco biarmicus* Temminck, 1825
234(c); 517(c)

Sacro *Falco cherrug* J.E. Gray, 1834
22(c); 79; 225(c); 227(c); 231(c); 292(c); 294(c); 472; 517; 520; 555(c)

Pellegrino *Falco peregrinus* Tunstall, 1771
3(n); 13(n); 22(c, n); 23(c); 26(c); 34; 71; 79(n); 125(n); 131(c); 134(c); 137; 142; 145(n, r); 152(c); 153; 178(n); 179(n); 194(n); 195(n); 227; 228(n); 229(n); 292(c); 294(c, n); 317(n); 412; 420(c); 485(n); 502(n); 504(c); 505; 517; 520; 555(c, n); 587(c); 603(c); 605(n)

Falcone di Barberia *Falco pelegrinoides* Temminck, 1829
26(c); 119(c)

Francolino di monte *Bonasa bonasia* (Linnaeus, 1758)

3(c, n); 16(n); 39(c); 517; 555(n)

Pernice bianca *Lagopus mutus* (Montin, 1776)

1(n); 3(n); 16(n); 39; 72(c); 79(n); 125(n); 178(n); 179(n); 227; 291; 485(n); 517(n); 555(n)

Fagiano di monte *Tetrao tetrix* Linnaeus, 1758

1(n); 2(c, n); 3(n); 16(n); 39(n); 53; 72(c); 79(n); 90(n); 105; 125(n); 134(c); 161; 178(n); 179(n); 227; 296(n); 335(c); 420(c); 423(c); 471(n); 485(n); 517(n); 532(n); 543(n); 555(c, n)

Gallo cedrone *Tetrao urogallus* Linnaeus, 1758

39; 125; 179; 227; 471; 485(c); 517; 555

Coturnice *Alectoris graeca* (Meisner, 1804)

1(n); 2(c, n); 3(n); 16(n); 26(n); 39(n); 51; 52; 61; 72(c); 79(n); 92(n); 93(n); 95(n); 125(n); 131(c, n); 134; 178(n); 179(n); 201; 227; 228(n); 229; 231; 291; 295; 296(n); 420(c); 454(n); 483 (n); 485(n); 517(n); 520; 522(n); 532(n); 543(n); 555(n)

Pernice rossa *Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758)

1(n); 3(n); 9(i); 16(n); 22(n); 26(n); 39(n); 49(i); 51; 52; 62; 72(c); 79(n); 83(n); 93(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 142(n); 159; 178(n); 179(n); 190; 208(n); 227; 228(n); 229(n); 231; 257(n); 291(n); 294(n); 295; 296(n); 303(n); 338(n); 420(c); 485(n); 495; 502(c); 517(n); 522(n); 532(n); 536; 540(n); 541(n); 543(n); 545(n); 550; 551(n); 555(n); 567(n); 598(n)

Pernice sarda *Alectoris barbara* (Bonnaterre, 1790)

3(n); 16(n); 22(c); 39; 131(c); 179(n); 471; 517; 520

Starna *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758)

3(n); 16(n); 39(n); 62(c, n); 72(c); 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 152(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 296(n); 299(n); 413(n); 485(n); 495; 502(c); 517(n); 543(n); 555(n); 582(c)

Quaglia *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758)

3(n); 9(i, r); 54(n); 62(c); 71; 79(n); 125(n); 131(c); 134(c); 152(c); 159; 178(n); 179(n); 180(r); 181(r); 227; 228(c, n); 229(n); 230; 291; 296; 374(r); 377(r); 394(i); 403(i); 407(r); 410(r); 420(c); 452; 468(r); 476; 485(n); 495; 497(i); 502(c); 504; 507; 517(n); 529; 548; 549(c, n); 555(c, n, r); 556(n); 564(i, r); 568(r); 582(c)

Fagiano comune *Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758

2(c); 3(n); 13(n); 39(n); 54(n); 72(c); 137; 278(n); 280; 502(c); 504; 505; 507; 509; 517(n); 543(n); 548; 555(n); 598(n)

Porciglione *Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758

3(n); 54(n); 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 229; 280; 420(c); 485; 517; 555(c)

Voltolino *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766)

54; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228; 229; 296; 420(c); 485; 495; 517; 555(c)

Schiribilla *Porzana parva* (Scopoli, 1769)

54; 79; 125; 131(c); 178; 179; 227; 228(c); 229; 230; 296; 420(c); 445(c); 485; 495; 517; 548(i); 555(c)

Schiribilla grigiata *Porzana pusilla* (Pallas, 1776)

79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228; 229; 296; 420(c); 485; 517; 555(c)

Re di quaglie *Crex crex* (Linnaeus, 1758)

79(n); 125; 131(c); 133(c); 134(c); 178; 179; 227; 228; 229; 296; 420(c); 485; 495; 517; 548; 555

Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758)

2(c, n); 3(n); 54(n); 79; 125; 131(c); 134(c); 149; 152(c); 153(n); 176(c); 178; 179; 214; 227; 228(a, c); 229; 280(n); 291(n); 420(c); 485; 495; 517(n); 548(i); 555(c, n); 582(c)

Pollo sultano di Allen *Porphyrrula allenii* (Thomson, 1842)

26(c); 105; 134(c); 338(c); 409; 412(c)

Pollo sultano *Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758)

2(c); 21; 22; 26(c); 79; 131(c); 178(c); 179; 226; 227; 228(c); 229; 231; 445; 471(c); 472; 485(c); 517; 555

- Folaga** *Fulica atra* Linnaeus, 1758
 3(n); 54(n); 79; 125; 131(c); 134(c); 152(c); 153(n); 178; 179; 203; 227(c); 228(c); 229; 280; 291; 420(c); 485; 495; 517; 548; 555(n); 582(c)
- Folaga cornuta** *Fulica cristata* Gmelin, 1789
 21; 22; 23; 26(c); 61; 79; 162; 179; 227; 412(c); 471; 567(c)
- Gru** *Grus grus* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 79; 125; 131(c); 152(c); 159; 178; 179; 227; 228(c); 256; 296; 354(c); 420(c); 450(c); 471(c); 485; 495; 517; 520; 543; 555(c); 582(c)
- Gallina prataiola** *Tetrao tetrix* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 79; 125(c); 131(c); 178; 179; 227; 228(c); 256; 296; 354(c); 420(c); 450(c); 471(c); 485; 495; 517; 520; 543; 555(c); 571(c); 582
- Otarda** *Otis tarda* Linnaeus, 1758
 2(c); 79; 125(c); 131(c); 138(c); 139(c); 144(c); 178; 179; 226(c); 227(c); 228(c); 231; 296; 395(c); 398(c); 412; 420(c); 482(c); 485; 495; 517; 520; 555(c)
- Beccaccia di mare** *Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758
 54; 79; 83; 105; 125(c); 131(c); 134(c); 178(c); 179; 227; 228; 229; 311(c); 420(c); 485; 502(c); 509; 517; 529; 548; 549; 555(c)
- Cavaliere d'Italia** *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 4; 54; 79; 83; 125; 131(c); 134(c); 153(n); 159; 178; 179; 214; 227; 228; 229; 280; 289; 291; 296; 420(c); 460(n); 485; 502(c); 507; 509; 517; 529; 548(i); 549; 555(c); 562(n)
- Avocetta** *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758
 2(c); 54; 79; 125(c); 131(c); 153(c); 159; 178; 179; 227; 228(c); 229; 296; 420(c); 450(c); 485; 517; 548; 555(c)
- Occhione** *Burhinus oedicnemus* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 4; 26(c); 54; 66; 79; 125; 131(c); 134(c, n); 178; 179; 227; 228; 229; 230; 296; 420(c); 445(c); 485; 495; 502(c); 504; 505; 509; 517; 520; 548; 549; 555
- Corrione biondo** *Cursorius cursor* (Latham, 1787)
 2(c); 79; 125; 131(c); 134(c); 170(c); 178(c); 179; 227; 228(c); 229(c); 231(c); 373(c); 416(c); 485(c); 517; 543; 555(c)
- Pernice di mare** *Glareola pratincola* (Linnaeus, 1766)
 21; 22; 23; 79; 125; 131(c); 132; 134(c); 178; 179; 227; 228; 229; 231; 294; 420(c); 434; 485; 495; 502(c); 507; 509; 517; 548(i); 549; 555(c)
- Corriere piccolo** *Charadrius dubius* Scopoli, 1786
 2(c, n); 3(n); 54(n); 79; 125; 131(c); 134(c); 153(n); 178(n); 179(n); 214(n); 227; 228(n); 229(n); 280(n); 291(n); 392(r); 404(r); 485(n); 491; 502(c); 507; 509; 517(n); 548(i); 549; 555(n, r); 595(n)
- Corriere grosso** *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758
 3(n); 23(n); 26(n); 54; 66; 79; 83(n); 105(n); 125(n); 131(c); 134(c); 178(n); 179(n); 182(c); 206(c); 211(n); 214; 227; 228(n); 229(n); 231(n); 280; 420(c); 445(n); 471(n); 472; 485(n); 502(c); 507; 509; 517; 548(i, r); 549; 555
- Fratino** *Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758
 3(n); 79; 125; 131(c); 178(n); 179; 227; 228; 229; 231; 420(c); 471; 485(n); 507; 509; 517; 548(i); 549; 555
- Piviere tortolino** *Eudromias morinellus* (Linnaeus, 1758)
 54; 79; 125; 131(c); 174(c); 178; 179; 182(c); 227; 228; 229; 231; 485; 502(c); 509; 517; 555
- Piviere dorato** *Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758)
 54; 66; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228(c); 229(c); 230; 296; 377(r); 420(c); 485; 495; 507; 509; 517; 549; 555
- Pivieressa** *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758)
 54; 79; 125; 131(c); 178; 179; 182(c); 227; 228; 229; 420(c); 483; 485; 507; 509; 517; 529; 549; 555(c)

Pavoncella gregaria *Chettusia gregaria* (Pallas, 1771)
2(c); 7(c); 21; 23; 26(c); 79(c); 393(c); 517

Pavoncella *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758)

2(c); 49(r); 54; 62; 66; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 214; 227; 228; 229; 230; 296; 345(r); 359(r); 392(r); 404(r); 420(c); 485; 495; 502(c); 504; 505; 507; 509; 517; 548; 549; 555

Piovanello maggiore *Calidris canutus* (Linnaeus, 1758)

79; 125; 131(c); 133(c); 134(c); 178; 179; 227(c); 228(c); 229; 296; 471; 485; 502(c); 507; 509; 517; 548(i); 555(c); 604(c)

Piovanello tridattilo *Calidris alba* (Pallas, 1764)

54; 79; 125; 131(c); 178; 179; 227(c); 228; 296; 471; 483; 485; 509; 517; 548(i); 549

Gambecchio *Calidris minuta* (Leisler, 1812)

54; 66; 79; 125; 131(c); 153; 178; 179; 227; 228; 229; 296; 392(r); 406(r); 420(c); 449(c); 485; 502(c); 517; 548(i); 555

Gambecchio nano *Calidris temminckii* (Leisler, 1812)

79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228; 229; 296; 449(c); 485; 509; 517; 548(i); 549; 555(c)

Piovanello ferruginea (Pontoppidan, 1763)

22; 26; 54; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 226; 227; 228; 229; 230; 420(c); 483; 484; 485; 517; 548(i); 555

Piovanello violetto *Calidris maritima* (Brünnich, 1764)

21; 22(c); 23; 26(c); 79; 83; 105; 125(c); 178; 179; 226; 227; 228; 229; 296; 445; 471; 472; 483; 484; 485; 517; 555; 589

Piovanello piancianera *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758)

54; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 182(c); 227; 228; 229; 420(c); 485; 507; 509; 517; 548(i); 549; 555(c)

Gambecchio frullino *Limicola falcinellus* (Pontoppidan, 1763)

21; 22; 79; 125; 131(c); 178; 179; 227; 228(c); 229(c); 231; 445; 472; 485; 517; 548(i); 555

Combattente *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758)

2(c); 4; 20(c); 21; 22(c); 54; 66; 79; 125; 131(c); 134(c); 153; 178; 179; 214; 227; 228(c); 229(c); 230(a, c); 251(c); 296; 352(r); 420(c); 485; 495; 502(c); 507; 509; 517; 548(i); 549; 555(c, r)

Frullino *Lymnocryptes minimus* (Brünnich, 1764)

54; 79; 125(a); 131(c); 134(c); 153; 178; 179; 227; 228; 229; 296; 485; 495; 509; 517; 548; 549; 555

Beccaccino *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758)

2(c); 3(n); 21(n); 22(n); 26(a, n); 45(r); 54; 79; 125; 131(c); 134(c); 152(c); 153; 178; 179; 227; 228; 229; 280; 296; 320(n); 445; 462; 467; 471; 485; 495; 507; 509; 517; 548; 549; 555; 582(c)

Croccolone *Gallinago media* (Latham, 1787)

54; 79; 125; 131(c); 134(c); 153; 178; 179; 227; 228; 229; 230; 296; 420(c); 485; 517; 520; 548; 555(c)

Beccaccia *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758

2(c, n); 3(n); 21(n); 22(n); 54; 62; 71(c); 79; 125(n); 126; 131(c); 134(c); 137; 152(c); 178(n); 179(n); 190(n); 211(n); 227; 228; 229; 239; 251(c); 291; 296; 404(r); 420(c); 452; 453; 462; 467(n, r); 471(n); 483(n); 484(n); 485(n); 495; 502(c); 517(n); 530(c, n, i, r); 539; 543(n); 544(n); 548; 555(n, r); 582(c)

Pittima reale *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758)

54; 79; 125(n); 131(c); 134(c); 153; 178; 179; 227; 228; 229; 231; 294; 420(c); 485; 502(c); 504; 505; 509; 517; 548; 549; 555

Pittima minore *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758)

26(c); 54; 79; 83; 131(c); 134(c); 178; 179; 226; 227(c); 228; 229; 296; 420(c); 485; 517; 555(c)

- Chiurlo piccolo** *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758)
 19; 54; 66; 79; 83; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228(c); 229; 241; 420(c); 449(c); 485; 495; 502(c);
 507; 509; 517; 548; 549; 555
- Chiurlottello** *Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817
 20(c); 79; 125; 131(c); 178; 227; 228; 229; 296; 485; 517; 555(c)
- Chiurlo maggiore** *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758)
 19; 54; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228(c); 229; 420(c); 485; 495; 517; 555(c)
- Piro piro codalunga** *Bartramia longicauda* (Bechstein, 1812)
 7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79; 83(c); 105; 171(c); 187(c); 211; 227(c); 258(c); 297; 338(c); 409; 412(c);
 431(c); 470(c); 471(c); 472; 517; 567(c)
- Totano moro** *Tringa erythropus* (Pallas, 1764)
 54; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228; 229; 231; 296; 420(c); 485; 502(c); 514(i); 517; 548(i); 555;
 582(c)
- Pettegola** *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 4; 22(n); 23(n); 26(n); 54; 66; 79; 125; 131(c, n); 134(c); 142; 178; 179; 227; 228(c, n); 229 (n); 232(n);
 280; 420(c); 485; 502(c); 507; 509; 517; 548(i); 549; 555(c)
- Albastrello** *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803)
 22; 26; 54; 79; 125; 131(c); 134(c); 142; 178; 179; 227; 228; 229; 294; 420(c); 445; 471; 485; 502(c); 517;
 548; 555(c)
- Pantana** *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767)
 54; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 227; 228; 229; 296; 420(c); 485; 491; 502(c); 517; 548(i); 555
- Piro piro culbianco** *Tringa ochropus* Linnaeus, 1758
 3(n); 54; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 213; 227; 228(c, n); 229(n); 231(n); 280; 485; 491; 509; 517;
 548; 549; 555(c)
- Piro piro boschereccio** *Tringa glareola* Linnaeus, 1758
 54; 66; 79; 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 213; 227; 228; 229; 280; 406(r); 485; 491; 502(c); 517; 543(i);
 548(i, r); 555
- Piro piro di Terek** *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1774)
 22; 26; 84; 131(c); 134; 228; 233; 507; 509; 517; 543; 589
- Piro piro piccolo** *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 49(i); 54(n); 66; 71; 79; 125; 131(c); 134(c); 178(n); 179; 213; 227; 228(n); 229(n); 241; 280; 296;
 420(c); 483; 484; 485(n); 491; 495; 502(c); 507; 509; 517(n,); 548(i); 549; 555(n)
- Voltapietre** *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758)
 22; 23; 26; 54; 66; 79; 125(c); 131(c); 134(c); 178; 179; 182(c); 227(c); 228; 229; 280; 296; 471; 483; 484;
 485; 517; 548; 555
- Falaropo beccosottile** *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 19; 21(c); 22(c); 23; 26(c); 79; 83(c); 226; 227(c); 294; 353(c); 445; 471(c); 472; 517; 555
- Falaropo beccolargo** *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758)
 4(c); 21; 22; 23; 26(c); 79; 83; 105; 226(c); 227(c); 294; 353(c); 471(c); 472; 480(c); 517; 555
- Stercorario mezzano** *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815)
 19; 20(c); 21; 22; 23; 26; 79; 131(c); 134(c); 142; 159; 178; 179; 182(c); 226(c); 227(c); 228(c); 229; 231(c);
 388; 445; 459(c); 471; 472(c); 476(c); 485; 496; 517; 555(c)
- Labbo** *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758)
 19; 21(c); 22; 26; 68; 79; 83; 131(c); 132(c); 134(c); 178(c); 179; 223(c); 226(c); 227(c); 228(c); 229(c);
 231(c); 296; 459(c); 471; 472(c); 496(c); 504(c); 505; 517; 555(c)
- Labbo codalunga** *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819
 22(c); 26(c); 76(c); 79; 450; 517

- Gabbiano corallino** *Larus melanocephalus* Temminck, 1820
 11; 21; 22; 23; 26; 35(r); 54; 66; 68; 71; 79; 83; 86; 125; 131(c); 134(c); 142; 178; 179; 182(c); 206(c); 227; 228; 229; 230(a); 231; 241; 245; 296; 298(c); 346(r); 352(r); 363(r); 377(r); 420(c); 445; 459(c); 471(c); 472; 483; 484; 502(c); 504(c); 505; 507; 509; 515; 517; 548; 549; 555(r); 567
- Gabbianello** *Larus minutus* Pallas, 1776
 11; 20(c); 26; 66; 68; 79; 83; 105; 125; 131(c); 133(c); 134(c); 178; 179; 214; 225(c); 227; 228; 229; 280; 471; 502(c); 507; 509; 515; 517; 548; 549; 555(c)
- Gabbiano comune** *Larus ridibundus* Linnaeus, 1766
 2(c); 3(n); 11(r); 21; 22; 45(r); 49(r); 54(c, r); 66; 68; 79; 83; 125; 131(c); 134(c); 149; 152(c); 153; 159; 178; 179; 182(c); 190; 201(c); 202; 214; 227; 228(n); 229; 230; 241; 245; 260; 263; 280; 291; 294; 296; 359(r); 377(r); 392(r); 404(r); 406(r); 420(c); 445(c); 484; 485; 502(c); 504; 505; 507; 509; 515; 517; 521; 529; 543; 548; 549; 555(r); 582(c); 595
- Gabbiano roseo** *Larus genei* Brême, 1839
 11; 22; 23; 26; 79; 162; 179; 227; 484; 517; 548; 555; 596
- Gabbiano piombino** *Larus atricilla* Linnaeus, 1758
 23; 178; 485; 514
- Gabbiano corso** *Larus audouinii* Payraudeau, 1826
 11; 22(c); 23(c); 26(c); 71; 79; 83; 131(c); 133; 158(c); 182(c); 190; 211; 227(c); 231(c); 445; 446(c); 471(c); 472(c); 486(c); 504(c); 505; 515; 517; 555(c); 603(c)
- Gavina** *Larus canus* Linnaeus, 1758
 3(n); 11; 23; 26; 66; 68; 79; 125; 131(c); 133(c); 178; 179(n); 214; 227; 228; 229; 231; 243; 245; 260; 280; 296; 420(c); 445; 485; 502(c); 507; 509; 515; 517; 549; 555(c)
- Zafferano** *Larus fuscus* Linnaeus, 1758
 3(n); 11; 19; 20(c); 22; 23(n); 26; 66; 71; 79(n); 83; 105(n); 125(c, n); 151(n); 173(n); 176(c); 178(n); 179(n); 190; 206(c); 225(c); 227(c); 231(c, n); 241; 242; 243; 245; 260; 420(c); 445(n); 450(c); 471; 472; 483; 484; 485(n); 502(c); 504; 505; 507; 508; 509; 515; 517; 548; 549; 555(c)
- Gabbiano reale nordico** *Larus argentatus* Pontoppidan, 1763
 11; 555
- Gabbiano reale** *Larus cachinnans* Pallas, 1811
 3(n); 11(n); 13(n); 22(n); 23(n); 26(n); 40(n); 49(r); 54(c); 66; 68; 71(n); 79(n); 105; 125; 131(c); 134(c); 137; 149; 153(n); 173(n); 178; 179; 182(c); 190; 202; 214(n); 227; 228(n); 229; 241; 243; 245(n); 260; 263; 280; 291(n); 294(n); 296(n); 304(n); 404(r); 412(n); 420(c); 438(n); 453; 455; 485(n); 502(c); 504; 505; 507; 509; 515; 517; 532(n); 542(n); 548; 549; 555(n, c, r)
- Gabbiano d'Islanda** *Larus glaucopterus* Meyer, 1822
 11; 15; 21(c); 23(c); 26(c); 105; 115; 116; 231(c); 294(c); 296; 409; 411(c); 412(c); 471(c); 472(c); 517; 567(c)
- Gabbiano glaudo** *Larus hyperboreus* Gunnerus, 1767
 7(c); 11; 21(c); 22; 23(c); 26(c); 79; 83(c); 105; 117; 125(c); 144; 167(c); 178; 179; 200(c); 211; 226(c); 227(c); 231(c); 260(c); 324(c); 338(c); 409; 411(c); 412(c); 420(c); 445(c); 471(c); 472(c); 485; 517; 555(c); 567(c)
- Nugnaiaccio** *Larus marinus* Linnaeus, 1758
 7; 11; 14; 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79; 83(c); 105; 178; 179; 226(c); 227(c); 231(c); 338(c); 409; 411(c); 412(c); 445(c); 485; 517; 555; 567(c)
- Gabbiano tridattilo** *Rissa tridactyla* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 3(n); 11; 19; 21; 22; 23; 26; 66; 79; 83; 105; 125; 131(c); 134(c); 142; 151; 159(c); 176(c); 178; 179(n); 182(c); 211; 226(c); 227(c); 228(c); 229; 241; 294; 308(c); 421(c); 443(c); 445; 450(c); 459(c); 471; 472; 483; 485; 491(c); 517; 555(c); 567
- Gabbiano eburneo** *Pagophila eburnea* (Phipps, 1774)
 83; 105; 115; 241; 409; 517

- Sterna zampenere** *Gelochelidon nilotica* (Gmelin, 1789)
 79; 131(c); 178(c); 179; 227; 228(c); 229; 231(c); 406(r); 471; 485; 507; 509; 517; 549; 555(r)
- Sterna maggiore** *Sterna caspia* Pallas, 1770
 22; 23; 26; 79; 83; 86; 131(c); 134(c); 179; 227(c); 228; 229; 231(c); 379(c); 485; 509; 517; 549; 555
- Beccapesci** *Sterna sandvicensis* Latham, 1787
 3(n); 22; 23(n); 26(n); 49(r); 54; 66; 68; 71; 79; 83(n); 105(n); 125(n); 131(c); 134(c); 163; 178; 179; 201(c); 211(n); 214; 227; 228; 229; 231; 242; 245; 420(c); 483(c); 485; 502(c); 517; 548; 555
- Sterna del Dougall** *Sterna dougallii* Montagu, 1813
 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 125(c); 178(c); 201(c); 226; 227(c); 231(c); 294(c); 338(c); 445(c); 471(c); 472(c); 483(c); 484(c); 485(c); 517; 567(c)
- Sterna comune** *Sterna hirundo* Linnaeus, 1758
 19; 54; 79; 125; 131(c); 134(c); 153; 159; 178; 179; 214; 227; 228; 229; 243; 291; 392(r); 420(c); 450(c); 485; 502(c); 504(c); 505; 509; 517; 548; 549; 555
- Sterna codalunga** *Sterna paradisaea* Pontoppidan, 1763
 7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 105; 178(c); 179; 211; 227; 338; 411(c); 420(c); 445; 471(c); 472(c); 485; 517; 555(c)
- Fraticello** *Sterna albifrons* Pallas, 1764
 26; 54; 79; 131(c); 178; 227; 228(c); 229; 296; 471; 485; 517; 548; 555(c)
- Mignattino piombato** *Chlidonias hybridus* (Pallas, 1811)
 79; 131(c); 134(c); 179; 227; 228(c); 229(c); 471(c); 509; 517; 548; 549; 555(c)
- Mignattino alibianche** *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815)
 20(c); 125; 131(c); 134(c); 178; 179(c); 182(c); 227; 228; 229; 280; 420(c); 449(c); 471; 485; 502(c); 509; 517; 548; 549; 555
- Uria** *Uria aalge* (Pontoppidan, 1763)
 7(c); 20(c); 21(c); 22; 23; 26(c); 79; 83; 105; 125; 451; 517; 520; 555
- Gazza marina** *Alca torda* Linnaeus, 1758
 2(c); 21; 22; 62(c); 66; 79; 83; 105; 125; 131(c); 134(c); 159; 163; 173(r); 176(c); 178; 179; 182(c); 223(c); 226(c); 227(c); 228(c); 229(c); 230; 231(c); 241; 294; 363(r); 392(r); 404(r); 412(c); 420(c); 445(c); 459(c); 471; 472; 485; 502(c); 504(c); 517; 520; 548; 555(c)
- Gazza marina minore** *Alle alle* (Linnaeus, 1758)
 7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 105; 151; 211(c); 231(c); 294(c); 409; 417; 517; 555(c); 567(c)
- Pulcinella di mare** *Fratercula arctica* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 19; 20(c); 22; 26(c); 36(c); 49(r); 54(c); 79; 83; 105; 125; 131(c); 153(c); 159; 176(c); 178(c); 179; 182(c); 205; 206(c); 223(c); 225(c); 226; 227(c); 228(c); 229; 231(c); 241; 242; 412(c); 420(c); 445; 450(c); 459(c); 471; 472; 485(c); 502(c); 504(c); 505; 517; 548; 555(c)
- Ganga** *Pterocles orientalis* (Linnaeus, 1758)
 517
- Sirratte** *Syrrhaptes paradoxus* (Pallas, 1773)
 133(c); 134(c); 228(c); 231(c); 294(c); 473(c); 474(c); 502(c); 517
- Piccione selvatico** *Columba livia* Gmelin, 1789
 2(c); 3(n); 9(i); 22; 37; 71; 79; 125; 131(c); 152(c); 178; 179; 226; 227; 228; 229; 231; 294; 296(n); 414; 445; 471; 472; 485; 495; 517; 518; 529; 555; 582(c)
- Colombella** *Columba oenas* Linnaeus, 1758
 2(c); 3(n); 9(i); 22(n); 54; 79(n); 125(n); 131; 132; 134(c); 159; 178(n); 179(n); 227; 228; 229; 230; 296(n); 420(c); 450(c); 485(n); 495; 502(c); 517; 520; 548; 555

- Colombaccio** *Columba palumbus* Linnaeus, 1758
 2(c); 3(n); 9(i, r); 13(n); 54; 62; 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 159; 178(n); 179(n); 190; 225; 227; 228(n); 229(n); 230; 251(c); 291; 296(n); 420(c); 450(c); 452; 453; 462; 485(n); 495; 502(c); 504; 505; 517(n); 543(n); 548; 555(n)
- Tortora dal collare orientale** *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838)
 2(c) 3(n); 13(n); 54(n); 60; 83(n); 105; 120(n); 280(n); 291(n); 365(c); 369(c); 467; 502(c); 513(n); 517(n); 520; 529(n); 548(i); 555(c, n); 567
- Tortora** *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 3(n); 9(i, r); 13(n); 44(i, r); 46(i, r); 47(i, r); 49(i); 54(n); 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 137; 159; 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 230; 270; 278(n); 280; 291; 294; 296; 392(r); 420(c); 485(n); 490; 495; 502(c); 504; 505; 509; 517(n); 527; 531; 532(n); 543(r); 548(i, r); 549(n); 555(n); 564(i, r)
- Parrocchetto dal collare** *Psittacula krameri* (Scopoli, 1769)
 3(n); 533; 534; 554(n); 555(n)
- Parrocchetto monaco** *Myiopsitta monachus* (Boddaert, 1783)
 3(n); 213(n); 554(n)
- Cuculo dal ciuffo** *Clamator glandarius* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 3(n); 17(c); 21; 22; 23(c); 26; 59; 79; 83; 105(n); 125; 131(c); 142; 158(c); 159; 168(c); 169(c); 178; 179; 190; 196(c); 197(c); 225(c); 226(c); 227(c); 228(c); 229(c); 231; 237(c); 259(c); 280(c); 294(c); 340(c); 389(c); 390(c); 412(c); 418(c); 419; 420(c); 450(c); 471; 472; 483(c); 484(c); 485; 502(c); 514(i); 517; 548(i); 555(c); 577(c); 582(c); 585(c)
- Cuculo** *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758
 3(n); 9(i); 54(n); 71; 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 152(c); 153(n); 178(n); 179(n); 189(n); 227; 228(n); 229(n); 230; 270(n); 278(n); 291; 296(n); 356(n); 361(r); 404(r); 420(c); 434(c); 485(n); 495; 502(c); 504(n); 505; 517(n); 531; 532(n); 548(i); 555(n); 575; 576(n); 582(c); 583(n); 587(n); 588(n); 598(n)
- Barbagianni** *Tyto alba* (Scopoli, 1769)
 3(n); 13(n); 49(i, r); 54(n); 79(n); 125(n); 131(c, n); 132; 134(c); 152(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 270; 278(n); 291; 296(n); 304(n); 344(c); 406(r); 420(c); 481; 485(n); 502(c); 517(n); 529(n); 548; 555(n); 582(c)
- Assiolo** *Otus scops* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 13(n); 27(c); 49(r); 54; 79(n); 125(a, n); 131(c, n); 134(c); 152(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 296(n); 420(c); 485(n); 502(c); 517(n); 529(n); 548(i); 555(n); 582(c)
- Gufo reale** *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758)
 1(n); 2(c); 3(n); 39(n); 79(n); 125(n); 131(c, n); 132(c); 134(c); 137; 159(c, n); 178(n); 179(n); 190; 227(n); 228(n); 229(n); 291(n); 296(c, n); 420(c); 485(n); 517(n); 520; 555(c, n)
- Civetta nana** *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758)
 517; 520
- Civetta** *Athene noctua* (Scopoli, 1769)
 3(n); 13(n); 54(n); 79; 125; 131(c, n); 134(c); 137; 152(c); 155; 159(n); 178(n); 179(n); 227; 228 (n); 229(n); 230; 278 (n); 292; 296(n); 305(n); 306(n); 420(c); 485(n); 491; 502(c); 517(n); 548; 555(n); 582(c); 588(n)
- Allocco** *Strix aluco* Linnaeus, 1758
 3(n); 13(n); 54(n); 79(n); 125(n); 131(c, n); 132; 134(c); 137; 152(c); 159(n); 178(n); 179(n); 226; 227; 228(c, n); 229(c); 230; 270; 278(n); 291; 296(n); 420(c); 425; 453(n); 471; 485(n); 502(c); 504(c); 505; 517(n); 548(i); 555(n); 582(c); 598(n)
- Gufo comune** *Asio otus* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 79(n); 125(n); 178(n); 179(n); 227; 228; 229(n); 296(n); 404(r); 420(c); 471; 485(n); 517(n); 548; 555(n)
- Gufo di palude** *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763)
 3(n); 22(n); 34; 39(n); 45(r); 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 178(n); 179(n); 225(c); 227; 228(n); 229(n); 230; 231; 292(c); 420(c); 485(n); 517; 555

Civetta capogrosso *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758)

3(n); 92(n); 178(n); 179; 182(c); 225; 227; 484(n); 485(n); 517(n); 532(n); 555(c, n)

Succiacapre *Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758

2(c, n); 3(n); 13(n); 54(n); 79(n); 125; 131(c, n); 134(c), 178(n); 179(n), 227; 228(n), 229(n); 270; 278(n); 291; 296(n); 420(c); 485(n); 502(c); 509; 517(n), 548; 549; 555(n)

Succiacapre asiatico *Caprimulgus asiaticus* Latham, 1790

23(c); 225(c); 227(c); 228; 472(c)

Rondone *Apus apus* (Linnaeus, 1758)

3(n); 13(n); 22; 26; 54(n); 71(n); 79(n); 125(n); 128; 131(c); 132; 134(c); 137; 152(c); 159; 178(n); 179(n); 214(n); 227; 228(n); 229(n); 230(a); 253; 264(n); 270; 281(n); 284; 291; 294(n); 296(n); 420(c); 485(n); 490; 502(c); 504(n); 505; 507; 509; 510(n); 517(n); 529(n); 532(n); 548(i); 549(n); 555(n); 582(c); 595; 598(n)

Rondone pallido *Apus pallidus* (Shelley, 1870)

3(n); 13(n); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 71(n); 79(c); 105(n); 131(c); 175(n); 412; 450(c); 517(n); 555(n); 582(n)

Rondone maggiore *Apus melba* (Linnaeus, 1758)

3(n); 22; 39(n); 54; 79(n); 125; 131(c, n); 134(c); 137; 159; 178(n); 179; 214; 225; 227; 228(c, n); 229(n); 351(c); 404(r); 411(c); 412(c); 420(c); 450(c); 452(n); 455; 485; 498(n); 504; 505; 517; 548; 555(n)

Rondone indiano *Apus affinis* (J.E. Gray, 1830)

7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 38(c); 79(c); 83(c); 105; 115; 223(c); 224(c); 225(c); 231(c); 294(c); 338(c); 409; 431(c); 445(c); 475(c); 567(c)

Martin pescatore *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758)

2(c); 3(n); 54(n); 79(n); 125(n); 128; 131(c, n); 132; 134(c); 137(n); 152(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 241; 270; 280; 392(r); 396(n); 420(c); 432(n); 485(n); 495; 502(c); 517(n); 548; 555(n); 582(c)

Gruccione egiziano *Merops superciliosus* Linnaeus, 1766

7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 38(c); 61(c); 79(c); 105; 131(c); 162(c); 165(c); 170(c); 178(c); 179; 225(c); 226(c); 227(c); 228(c); 229(c); 231(c); 294(c); 338(c); 396(c); 409; 445(c); 471(c); 472; 484(c); 485(c); 517

Gruccione *Merops apiaster* Linnaeus, 1758

2(c); 3(n); 22(n); 54(n); 64(n); 71; 79; 125; 131(c, n); 134(c); 148; 153(n); 159; 166(c); 178; 179; 182(c); 190; 227; 228(n); 229(n); 230; 296; 313; 343(c); 420(c); 427; 485; 502(c); 504; 505; 517(n); 548; 555(c, n); 604(c)

Ghiandaia marina *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758

2(c); 3(n); 63(c); 79(n); 125(c, n); 131(c, n); 134(c); 152(c); 159; 178(n); 179(n); 182(c); 227; 228(n); 229(n); 230; 294; 313(c); 420(c); 485(n); 502(c); 517; 555(c); 582(c)

Upupa *Upupa epops* Linnaeus, 1758

2(c); 3(n); 9(i); 13(n); 54(n); 62; 71; 79(n); 125; 128; 131(c, n); 134(c); 137; 152(c); 159; 178(n); 179(n); 190; 214; 227; 228(n); 229; 230; 270(n); 278(n); 280; 291; 296(n); 361(r); 420(c); 453; 485(n); 495; 504(i); 505; 507; 510; 517(n); 548(i); 549; 555(n); 582(c); 588(n)

Torcicollo *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758

3(n); 9(i); 13(n); 49(i); 54(n); 79(n); 125(n); 131(c, n); 132(c); 134(c); 178(n); 179(n); 190; 227; 228(n); 229(n); 230; 254; 270(n); 278(n); 296(n); 392(r); 411; 412(c); 420(c); 485; 502(c); 504(i); 505; 510; 517(n); 531; 548(i); 555(c, n, r); 588(n); 598(n)

Picchio cenerino *Picus canus* Gmelin, 1788

3(n); 21; 22; 26(c); 38; 79; 131(c); 178(c, n); 179; 182(c); 225(c); 227; 228(c); 229(c); 232; 294(c); 412(c); 445; 471(c); 472; 484; 485(n); 517; 555; 586(c)

Picchio verde *Picus viridis* Linnaeus, 1758

3(n); 9(i); 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 152(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 230; 270(n); 296(n); 420(c); 485(n); 490; 502(c); 504; 505; 517(n); 531; 532(n); 548; 555(n); 582(c); 598(n)

Picchio nero *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)

1(n); 2(c, n); 3(n); 39(c, n); 79; 92(n); 162; 178(c); 179; 227; 294; 296; 423(c); 471(c); 472; 485; 517(n); 520; 555(n); 589(c)

Picchio rosso maggiore *Picoides major* (Linnaeus, 1758)

3(n); 38; 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 178(n); 179(n); 189(n); 227; 228(n); 229(n); 230(a, c); 231(a, c); 270(n); 278(n); 291; 420(c); 471(a, c); 485(n); 502(c); 517(n); 548; 555(n); 588(n); 598(n)

Picchio rosso mezzano *Picoides medius* (Linnaeus, 1758)

21; 49(i); 88; 131; 179; 182(c); 225; 227; 445; 517; 520; 555(c)

Picchio dorsobianco *Picoides leucotos* (Bechstein, 1803)

7(c); 20(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 105; 172(c); 204(c); 225(c); 226(c); 227(c); 231(c); 280(c); 294; 338(c); 409; 411(c); 412(c); 420(c); 445(c); 470(c); 471(c); 472(c); 555(c); 567(c)

Picchio rosso minore *Picoides minor* (Linnaeus, 1758)

3(n); 79(n); 125(n); 131(c); 132; 134(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 296; 412; 420(c); 485(n); 517(n); 555(n)

Picchio tridattilo *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758)

79

Calandra *Melanocorypha calandra* (Linnaeus, 1766)

2(c); 3(n); 79; 125(c); 131(c); 134(c); 178(n); 179(n); 227; 228(c); 229; 296; 305(n); 420(c); 450(c); 485(n); 517; 543; 548(c); 555(c, n)

Calandra siberiana *Melanocorypha leucoptera* (Pallas, 1811)

22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 228(c); 231(c)

Calandra nera *Melanocorypha yeltoniensis* (J.R. Forster, 1768)

21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 231(c)

Calandrella *Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814)

3(n); 9(i); 54(n); 79; 105(n); 125; 131(c); 134(c); 178; 179; 182(c); 214; 227; 228; 229; 284(n); 296; 420(c); 450(c); 485(n); 507; 509; 517(n); 520(n); 529(n); 543(r); 548(i, r); 549(n); 555(n); 569(n)

Pispolella *Calandrella rufescens* (Vieillot, 1820)

22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 131(c); 134(c); 228(c); 229(c); 338(c); 409; 517

Cappellaccia *Galerida cristata* (Linnaeus, 1758)

3(n); 54; 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 296; 420(c); 485(n); 495(c); 517(n); 520; 548; 555(n)

Tottavilla *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758)

2(c, n); 3(n); 9; 79(n); 125(n); 131(c, n); 132(c); 134(c); 159; 178(a, n); 179(n); 227; 228(c); 229(n); 296(n); 420(c); 485(n); 495(c); 502(c); 504; 505; 507; 509; 517(n); 531; 532(n); 538(a, c); 543; 548(i); 549; 555(n); 598(n)

Allodola *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758

3(n); 9(i); 49(r); 54; 62; 79(n); 125(n); 131(c, n); 132; 134(c); 152(c); 153; 159; 178(a, n); 179(n); 227; 228(n); 229; 230(a); 236; 278; 280; 291; 296(n); 340; 420(c); 435; 462; 485(n); 495(c); 502(c); 504; 505; 507; 509; 517(n); 531; 532(n); 538(a, c); 543; 548(i); 549; 555(a, c, n); 582(c); 583(n); 587(n); 598(n)

Allodola golagialla *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758)

2(c); 21(c); 22; 26(c); 38(c); 79; 224(c); 226; 227(c); 228(c); 229(c); 445; 470(c); 471(c); 472; 517; 555(c)

Topino *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758)

3(n); 9(i); 22; 26; 39(n); 45(r); 54(n); 79(n); 125(n); 131(c); 134(c); 159; 178(n); 179(n); 214; 227; 228; 229; 230; 280; 343(c); 404(r); 420(c); 445; 485(n); 507; 517(n); 548(i); 549; 555(n)

Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769)

3(n); 22(n); 26(n); 79(n); 92(n); 125(n); 131(c); 163; 178(n); 179(n); 225; 226; 227; 228(n); 229(n); 232(n); 290(n); 294; 296(n); 364; 367(c); 471; 485; 491(n); 517(n); 548; 555(c, n); 595(n)

Rondine *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758

2(c); 3(n); 13(n); 26; 54(n); 71; 79(n); 125(n); 128; 131(c, n); 132; 134(c); 137; 152(c); 153(n); 159(n); 178(n); 179(n); 214; 227; 228(n); 229(n); 230(a); 270(n); 276(n); 278(n); 279(n); 280(n); 291(n); 296(n); 298(c); 305(n); 306(n); 392(r); 404(r); 420(c); 485(n); 491; 495; 498; 502(c); 504(c, i, n); 505; 507; 510; 517(n); 529(n); 548(i, r); 549(n); 555(n, r); 582(c); 595

- Rondine rossiccia** *Hirundo daurica* Linnaeus, 1771
 21; 22; 23; 26; 38; 50(n); 79(n); 126(c); 131(c); 162; 178; 179; 182(c); 225; 226; 227(c); 228(c); 229; 231; 280; 420(c); 428(c); 455; 471; 472; 483(c); 484(c); 485; 517; 548; 555
- Balestruccio** *Delichon urbica* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 3(n); 13(n); 23; 54(n); 79(n); 125(n); 128; 131(c); 134(c); 137; 152(c); 159(n); 178(n); 179(n); 214(n); 227; 228(n); 229(n); 230; 270(n); 278(n); 280(n); 291(n); 296(n); 420(c); 485(n); 491; 495; 504; 505; 507; 510; 517(n); 529(n); 531; 548(i); 549(n); 555(n); 582(c); 595(n); 598(n)
- Calandro maggiore** *Anthus novaeseelandiae* (Gmelin, 1789)
 3(n); 59; 79; 131(c); 178(n); 179(n); 227(c); 231(c); 485(n); 517; 548(i); 555(i)
- Calandro** *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 20(c); 54(n); 79(n); 125(n); 131(c); 178(n); 179(n); 182(c); 227; 228(n); 229(n); 230; 294(n); 420(c); 485(n); 495; 502(c); 507; 517(n); 548(i); 549; 555(i, n)
- Prispolone** *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 9(i, r); 22; 54; 62; 71; 79(n); 125; 131(c); 132; 134(c); 153; 178(n); 179(n); 214; 227; 228; 229; 230; 278(n); 291; 296(n); 404(r); 420(c); 485(n); 495; 510; 517(n); 531; 532(n); 548(i); 555(n, r); 563(r); 564(i, r); 598(n)
- Pispola** *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 9(i, r); 54; 62; 71; 79(n); 125; 131(c); 134(c); 153; 178(n); 179(n); 214; 227; 228; 229; 236; 280; 296(n); 349(r); 392(r); 404(r); 406(r); 420(c); 485(n); 495; 502(c); 507; 517; 548(i); 549; 555(n); 564(i, r)
- Pispola golarossa** *Anthus cervinus* (Pallas, 1811)
 3(n); 22(n); 26(n); 79(n); 131(c); 178(n); 179(n); 228; 229; 471; 484; 485(n); 509; 514(i); 517; 548(i); 549; 555(c); 582(c)
- Spioncello** *Anthus spinolella* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 7(c); 9(i); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 94(n); 105; 125; 131(c); 134(c); 178; 179(n); 227; 228(n); 229(n); 231(c); 280; 291; 296; 338(c); 384(c); 392(r); 404(r); 409; 412(c); 472; 485; 495; 502(c); 517(n); 548(i); 555(n, r)
- Cutrettola** *Motacilla flava* Linnaeus, 1758
 3(n); 22; 23(c); 26(n); 47(i); 49(i, r); 54; 62; 79; 123; 125; 131(c); 132; 134(c); 178(n); 179(n); 213; 227; 228; 229; 230; 280; 296; 363(r); 404(r); 420(c); 445; 471; 472; 484; 485(n); 495; 502(a, c); 504; 505; 507; 517(n); 548(i, r); 549(n); 555
- Cutrettola testagialla orientale** *Motacilla citreola* Pallas, 1766
 105; 115; 125; 231; 409; 514(i); 516(i); 517; 520(i); 548(i); 582(c)
- Ballerina gialla** *Motacilla cinerea* Tunstall, 1771
 3(n); 49(r); 54; 79(n); 125(n); 128; 131(c); 132(n); 134(c); 153; 159; 178(n); 179(n); 214(n); 227; 228(n); 229(n); 254; 280(n); 291; 420(c); 485(n); 491; 495; 502(c); 507; 509; 510; 517(n); 529(n); 548(i); 555(n); 572(n); 595(n); 598(n)
- Ballerina bianca** *Motacilla alba* Linnaeus, 1758
 3(n); 9(i, r); 54(n); 79(n); 125(c, n); 128; 131(c, n); 132; 133(c); 134(c); 152(c); 153; 159; 178(n); 179(n); 182(c); 214(n); 227(c); 228(c, n); 229(n); 231; 278; 280(n); 290; 291; 296(n); 346(r); 420(c); 447; 471; 472; 483; 484; 485(n); 495; 502(c); 504; 505; 507; 517(n); 529(n); 548(i); 549(n); 555(c, n, r); 582(c); 595(n); 598(n)
- Beccofrusone** *Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 7(c); 22(c); 24(c); 26(c); 79; 125; 131(c); 152(c); 178; 179; 225; 228(c); 229; 231(c); 293; 294; 341; 370(c); 382; 397(c); 402(c); 404(r); 405(c); 408(c); 420(c); 471; 485; 501(c); 502(c); 517; 555(c); 582(c)
- Merlo acquaiolo** *Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758)
 2(c, n); 3(n); 54; 79(n); 94(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 230; 270; 280; 296(n); 420(c); 485(n); 491(n); 495; 502(c); 517(n); 548; 555(n)
- Sericciolo** *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 9(i); 13(n); 54(n); 71; 79; 125(n); 128; 131(c, n); 132; 134(c); 137; 152(c); 153; 159; 178(a, n); 179(n); 189(n); 214; 227; 228(n); 229(n); 254; 270(n); 278(n); 280(n); 291; 296(n); 420(c); 453(n); 485(n); 491(n); 502(c); 504; 505; 517(n); 529; 531; 532(n); 548(i); 555(n); 582(c); 598(n)

Passera scopaiola *Prunella modularis* (Linnaeus, 1758)

3(n); 9(i, r); 44(r); 45(r); 49(r); 54; 79; 94(n); 125(n); 131(c); 132; 134(c); 178(a, c, n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 254; 278; 280; 291; 404(r); 420(c); 485(n); 504; 505; 517(n); 548(i); 555(c, n, r); 587(n)

Passera scopaiola asiatica *Prunella montanella* (Pallas, 1776)

21(c); 23; 79(c); 231; 445

Sordone *Prunella collaris* (Scopoli, 1769)

3(n); 79; 92(n); 125; 131(c); 132(c); 134(c); 176(c); 178(n); 179; 227; 228(n); 229(n); 230(c); 296; 420(c); 485(n); 495; 502(c); 517(n); 532(n); 555(c, n)

Usignolo d'Africa *Cercotrichas galactotes* (Temminck, 1820)

7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 61(c); 79(c); 83(c); 105; 131(c); 170(c); 173; 178(c); 179; 185(c); 225(c); 226; 227(c); 228; 231(c); 280(c); 338(c); 409; 445(c); 459(c); 471(c); 472(c); 485; 517; 553(c, i); 555(c); 582(c)

Pettiroso *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758)

2(c); 3(n); 9(i, r); 13(n); 49(i, r); 54; 71; 79(n); 125(n); 128; 131(c, n); 137; 152(c); 153; 159; 178(n); 179(n); 189(n); 214; 227; 228(n); 229(n); 230(a, c); 254; 265(n); 270(n); 278(n); 280(n); 291; 296(n); 345(r); 378(r); 392(r); 404(r); 420(c); 452(n); 453(n); 485(n); 495; 502(c); 504(i); 505; 510; 517(n); 529; 531; 532(n); 548(i, r); 555(n, r); 572(n); 576(n); 582(c); 583(n); 587(n); 588(n); 598(n)

Usignolo maggiore *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758)

7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 105; 131(c); 209(c); 225(c); 227(c); 228; 231(c); 338(c); 365(c); 409; 445(c); 471; 517; 555

Usignolo *Luscinia megarhynchos* C.L. Brehm, 1831

2(c); 3(n); 9(i); 13(n); 54(n); 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 152(c); 159; 178(n); 179(n); 189(n); 227; 228(n); 229(n); 280(n); 296(n); 420(c); 472(c); 485(n); 495; 502(c); 504(i); 505; 517(n); 548(i); 555(n); 582(c); 588(n); 598(n)

Pettazzurro *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758)

3(n); 22; 26; 79; 83; 122; 125(c); 131(c); 132(c); 134(c); 178; 179; 227(c); 228(c); 229; 230; 296(n); 312(c); 420(c); 426; 445; 485; 517; 520(c); 548(i); 555(c, n); 604(c)

Codazzurro *Tarsiger cyanurus* (Pallas, 1773)

21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 105; 115; 150(c); 231(c); 338(c); 409; 503(c); 517; 520(c); 548(i); 567; 582(c)

Codirosso spazzacamino *Phoenicurus ochruros* (Gmelin, 1774)

3(n); 49(i, r); 54; 71; 79(n); 125(n); 131(c); 134(c); 178(n); 179(n); 227; 228(c, n); 229(n); 241, 254, 278(n); 280(n); 291; 296(n); 378(r); 420(c); 483; 484; 485(n); 491(n); 517(n); 529; 532(n); 548(i); 555(n, r); 598(n)

Codirosso *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)

3(n); 9(i, r); 46(i, r); 54; 71; 79(n); 125(n); 131(c); 134(c); 137; 178(n); 179; 227; 228; 229; 230; 266(n); 270(n); 272(n); 278(n); 280(n); 296(n); 378(r); 420(c); 440; 485(n); 495; 502(c); 504(i); 505; 507; 510; 517(n); 543(r); 548(i, r); 549; 555(n); 564(i, r); 588(n)

Stiaccino *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758)

3(n); 9(i); 54; 79(n); 94(n); 125; 131(c, n); 134(c); 153(n); 178(n); 179; 214; 227; 228(n); 229(n); 230; 280; 296(n); 420(c); 485(n); 495; 502(c); 504; 505; 507; 517(n); 532(n); 538(a, c); 548(i); 549(n); 555(n)

Saltimpalo *Saxicola torquata* (Linnaeus, 1766)

3(n); 9(i); 49(i); 54(n); 79(n); 125(n); 131(c, n); 132(n); 134(c); 137; 153; 178(n); 179(n); 214(n); 227; 228(n); 229(n); 230; 254(n); 278(n); 280(n); 291; 420(c); 485(n); 504(i); 505; 507; 517(n); 531; 532(n); 543(r); 548(i); 549(n); 555(a, c, n); 587; 598(n)

Culbianco *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758)

3(n); 9(i); 47(i); 49(i, r); 54; 79(n); 94(n); 125(n); 131(c); 134(c); 137; 153; 178(n); 179(n); 214; 227; 228(n); 229(n); 230; 278; 280; 291; 296(n); 322(r); 392(r); 420(c); 471(n); 485(n); 495; 502(c); 504; 505; 507; 517(n); 531(c); 532(n); 548(i); 549(n); 555(n); 598(n)

- Monachella dorsonero** *Oenanthe pleschanka* (Lepechin, 1770)
 22(c); 23(c); 26(c); 38(c); 83(c); 105; 170(c); 211(c); 225(c); 227(c); 231(c); 338(c); 409; 412(c); 470(c); 471(c); 472(c); 517; 567(c)
- Monachella** *Oenanthe hispanica* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 9(i); 21; 22; 23(n); 26(n); 38(n); 59; 79(n); 83(n); 125(n); 131(c); 133(c); 134(c); 142; 151(n); 162(n); 178(n); 179(n); 182(c); 226; 227(n); 228(n); 229(n); 230; 231(c, n); 232; 278; 280; 296(n); 412(c); 420(c); 445; 459(c); 470(c); 471(n); 472(n); 479(c); 483(c, n); 484(n); 485(n); 502(c); 517(n); 548(i); 555(n)
- Monachella del deserto** *Oenanthe deserti* (Temminck, 1825)
 83(c); 105; 147(c); 170(c); 211(c); 409; 412(c); 517; 555(c)
- Monachella nera** *Oenanthe leucura* (Gmelin, 1789)
 3(n); 20(c); 21(n); 22(n); 23(n); 26(n); 38(c); 79; 83(n); 84(n); 88; 105; 126(n); 131(c); 142(n); 170(c); 173(n); 178(c, n); 179(n); 182(c); 204(c); 205; 211(n); 225(n); 227(n); 228(n); 229(n); 231(c, n); 232(n); 294(n); 420(c); 445(n); 471(n); 472(n); 483(c, n); 484; 485(n); 517; 520; 555(c, n); 605(n)
- Codirossone** *Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1766)
 3(n); 9(i); 39(n); 79(n); 125(a, n); 131(c, n); 134(c); 178(a, n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 230; 296(n); 330; 356(n); 420(c); 450(c); 471(a); 485(n); 495; 502(c); 517(n); 548(i); 555(n); 576; 587; 598(n)
- Passero solitario** *Monticola solitarius* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 3(n); 13(n); 39(n); 70(n); 71(n); 79(n); 83(n); 105(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 178(n); 179(n); 182(c); 189(n); 227; 228(n); 229(n); 230; 296(n); 330; 343(c); 411(n); 412(n); 420(c); 452(n); 456(n); 457(n); 485(n); 495; 502(c); 504; 505; 517(n); 531; 532(n); 548; 555(n)
- Tordo dorato** *Zoothera dauma* (Latham, 1790)
 7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 225(c); 226(c); 227(c); 467(c); 470(c); 471(c); 472; 477(c); 484(c); 517; 555(c)
- Tordo eremita** *Catharus guttatus* (Pallas, 1811)
 23; 150(c); 225(c); 227(c); 231(c); 294(c); 409(c); 567(c)
- Tordo di Swainson** *Catharus ustulatus* (Nuttall, 1840)
 7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 79(c); 83(c); 105; 115; 116; 131(c); 135; 150(c); 171(c); 179(c); 205(c); 226(c); 227(c); 228(c); 294(c); 409; 412(c); 471(c); 472; 517
- Merlo dal collare** *Turdus torquatus* Linnaeus, 1758
 3(n); 79; 125; 131(c); 139(c); 178; 179; 227; 228(c); 229; 230; 231(c); 296(c); 392(r); 420(c); 435(c); 450(c); 485; 502(c); 517(n); 548; 555(c, n); 582; 584(c)
- Merlo** *Turdus merula* Linnaeus, 1758
 3(n); 9(i, r); 13(n); 44(r); 45(r); 47(r); 49(i, r); 54(n, r); 58(r); 62; 71(n); 79(n); 125(a, n); 128; 131(a, c, n); 134(c); 137; 152(c); 153(n); 178(a, n); 179(n); 180(r); 189(n); 227; 228(n); 229(n); 230(n); 236; 249(r); 251(c); 254; 270(n); 271(a); 272(n); 278(n); 280(n); 291(n); 296(n); 300(a, c); 304(n); 305(n); 306(n); 320(n); 322(r); 392(r); 404(r); 406(r); 420(a, c); 471(a); 485(n); 495; 502; 504(i); 505; 509; 510; 517(n); 529; 531; 532(n); 538(a, c); 548(i); 549(n); 555(a, n, r); 561(r); 563(r); 564(i, r); 582(c); 588(n); 598(n)
- Tordo oscuro** *Turdus obscurus* Gmelin, 1789
 22(c); 83(c); 226(c); 231(c); 409; 470(c); 471(c)
- Cesena di Naumann** *Turdus naumanni* Temminck, 1820
 2(c); 7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 105; 227(c); 338(c); 409; 412(c); 445(c); 472(c); 484(c); 489(c); 517
- Tordo golanera** *Turdus ruficollis* Pallas, 1776
 7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 105; 294(c); 338(c); 409; 517
- Cesena** *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758
 44(r); 47(r); 54; 58(r); 62; 79; 83(c); 125; 131(c); 134(c); 136(c); 152(c); 153; 178; 179; 228; 229; 296; 301(i, r); 322(r); 392(r); 404(r); 462; 485; 495; 502(c); 504; 505; 509; 510; 517; 548; 549; 555(r); 561(r); 582(c)
- Tordo bottaccio** *Turdus philomelos* C.L. Brehm, 1831
 3(n); 9(i, r); 22(n); 25; 44(r); 45(r); 47(r); 49(i, r); 54(r); 62; 71; 79(n); 125(n); 131(a, c); 134(c); 139(a, c); 151(n); 152(c); 153; 159; 178(n); 179(n); 180(r); 227; 228(n); 229(n); 230(a); 249(r); 254; 268(n); 270(n); 280; 291; 296(n); 301(i, r); 322(r); 346(r); 363(r); 377(r); 392(r); 404(r); 406(r); 415(r); 420(a, c); 466(r);

467; 485(n); 495; 502(c); 504(c, i); 505; 509; 510; 517; 529; 543; 548(i, r); 549; 555(n, r); 561(r); 563(r); 564(i, r); 582(c); 588(n); 598(n)

Tordo sassello *Turdus iliacus* Linnaeus, 1766

9(i); 44(r); 45(r); 47(r); 49(r); 54; 58(r); 62; 79; 125; 131(c); 132; 134(c); 153; 159; 178; 179; 227; 228; 229; 230; 296; 301(i, r); 322(r); 392(r); 404(r); 420(c); 462; 485; 495; 502(c); 504; 505; 509; 517; 548(i); 549; 555(a, c, r); 561(r); 564(i, r)

Tordola *Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758

3(n); 54; 62; 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 136(c); 139(a, c); 152; 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 270(n); 294(n); 296; 406(r); 411(n); 412(n); 420(c); 462; 485(n); 495; 502(c); 504(i); 505; 510; 517(n); 548(i); 555(n, r); 582(c); 598(n)

Usignolo di fiume *Cettia cetti* (Temminck, 1820)

3(n); 54(n); 79; 125; 131(c); 178; 179; 189(n); 227; 228; 229; 231; 294(n); 471(n); 485; 517; 548; 555(c, n)

Beccamoschino *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810)

3(n); 54(n); 79(n); 125; 131(c); 134(c); 178(n); 179(n); 227; 228(c, n); 229; 230; 280(n); 296; 420(c); 471(n); 485(n); 507; 517(n); 594(n); 555(c, n); 582

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia* (Boddaert, 1783)

21; 23; 54; 79; 125; 131(c); 178; 179; 227; 228; 229; 294(c); 445; 485; 495; 517; 548; 555

Salciaiola *Locustella lusciniooides* (Savi, 1824)

54(n); 79(n); 125; 131(c); 178; 179; 225; 227; 228; 229; 294; 471; 517; 555

Salciaiola olivastra *Locustella fluviatilis* (Wolf, 1810)

21(c); 22(c); 23(c); 26

Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon* (Temminck, 1823)

3(n); 21; 22; 79; 131(c); 178(c); 179; 227; 228(c); 229; 231(n); 471; 472; 485; 517; 548(i); 555

Pagliarolo *Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817)

79; 125; 131(c); 178; 179; 227; 228; 229; 231; 420(c); 445; 485; 495; 517; 555

Forapaglie *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758)

3(n); 9(i); 54; 79(n); 125; 131(c); 134(c); 153; 178; 179; 227; 228; 229; 296(n); 485; 517; 548(i); 555

Cannaiola verdognola *Acrocephalus palustris* (Bechstein, 1798)

22(c); 26(c); 79(n); 125; 131(c); 178; 179; 227; 228; 445; 471; 472; 485; 517; 555

Cannaiola *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804)

3(n); 54(n); 79(n); 125; 131(c); 153; 178; 179; 182(c); 227; 228(c); 229; 296; 420(c); 471; 485; 517; 548(i); 555

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus, 1758)

3(n); 54; 79(n); 125; 131(c); 134(c); 153; 178; 179; 227; 228; 229; 280; 296; 305(n); 306(n); 420(c); 449(c); 485; 517; 548; 555(n, r)

Canapino pallido *Hippolais pallida* (Emprich & Ehrenberg, 1833)

7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 105; 131(c); 135(c); 170(c); 173(c); 225(c); 227(c); 228(c); 231(c); 262(c); 294(c); 338(c); 409; 411(c); 471(c); 472(c); 517; 555(c); 567

Canapino levantino *Hippolais olivetorum* (Strickland, 1837)

22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 131(c); 135; 182(c); 225(c); 228(c); 231(c); 517; 555(c)

Canapino maggiore *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817)

3(n); 49(r); 54(r); 79(n); 178; 179(n); 131(c, n); 227; 228(n); 229; 280; 450(c); 485; 517; 555

Canapino *Hippolais polyglotta* (Vieillot, 1817)

3(n); 54(n); 79(n); 83(n); 125(n); 131(c, n); 132(c); 134(c); 137; 178; 179(n); 182(c); 228(n); 229(n); 270; 291; 296(n); 386(c, n); 485(n); 491(n); 504(n); 505; 517(n); 531; 532(n); 548(i); 555(n)

Magananina sarda *Sylvia sarda* Temminck, 1820

3(n); 21(c); 22(n); 23; 26; 79(c, n); 83; 125(c); 131(c); 178(n); 179(n); 211; 226(c); 227(c); 228(c); 231; 232; 294; 296; 320; 420(c); 445; 471; 472(c); 483(c); 485(n); 517; 520; 548(i); 555

- Magnanina** *Sylvia undata* (Boddaert, 1783)
 2(c); 3(n); 67(c, n); 71; 79(n); 83(n); 105; 125(n); 131(c, n); 132(n); 134(c); 160(n); 173(n); 178(n); 179(n); 225(n); 227(n); 228(n); 229(n); 231; 278; 294; 316(n); 420(c); 471(n); 485(n); 517(n); 555(n); 567(n); 582; 598(n)
- Sterpazzola di Sardegna** *Sylvia conspicillata* Temminck, 1820
 3(n); 21; 22; 23(n); 79; 125(n); 131(c); 178(n); 179(n); 227(c); 228(c, n); 229(n); 231(n); 471; 472; 483(c); 484; 485; 517; 555
- Sterpazzolina** *Sylvia cantillans* (Pallas, 1764)
 2(c); 3(n); 13(n); 79; 83(n); 125(c); 131(c); 134(c); 178(n); 179(n); 182(c); 189(n); 227; 228(n); 229(n); 280; 420(c); 471; 472(n); 483(n); 484(n); 485; 517(n); 548; 555(n); 598(n)
- Occhiocotto** *Sylvia melanocephala* (Gmelin, 1789)
 2(c); 3(n); 13(n); 21(n); 22(n); 23(n); 26(n); 54; 71(n); 79(n); 83(n); 105(n); 125(n); 128; 131(c, n); 132(c); 134(c); 137; 178(n); 179(n); 182(c); 189(n); 225(n); 227(n); 228(n); 229(n); 231(n); 232(n); 254; 280(n); 291; 294; 305(n); 306(n); 316(n); 411(n); 412(c, n); 420(c); 445(n); 453(n); 471; 472(n); 485(n); 495; 504(n); 505; 517(n); 548(i); 555(n); 567(n); 588(n); 598(n)
- Silvia del Rüppel** *Sylvia rueppelli* Temminck, 1823
 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 231(c); 294(c); 338(c); 400(c); 409(c); 517; 567(c)
- Bigia grossa** *Sylvia hortensis* (Gmelin, 1789)
 3(n); 13(n); 22; 23(n); 26; 53; 79; 83; 125(n); 131(c, n); 134(c); 142; 151; 178(n); 179(n); 182(c); 189(c); 225; 227; 228(n); 229(n); 231; 232; 278(n); 294(c); 306(n); 411(c); 412(c, n); 420(c); 471; 483; 484; 485(n); 502(c); 517(n); 548(i); 555(c, n); 588(n); 595; 598(n)
- Bigia padovana** *Sylvia nisoria* (Bechstein, 1795)
 21; 22; 79; 125(c); 131(c); 179; 227; 228(c); 445; 471; 485; 517; 555
- Bigarella** *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 9(i); 20(c); 79; 125(n); 131(c, n); 132(c); 134(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229; 296(n); 485(n); 504; 505; 517(n); 548; 555(n)
- Sterpazzola** *Sylvia communis* Latham, 1787
 3(n); 9(i); 54; 79; 125(n); 131(c, n); 134(c); 178; 179(n); 153; 227; 228(n); 229(n); 278(n); 280; 296(n); 420(c); 485(n); 495; 504; 505; 517(n); 548(i); 555(n); 598(n)
- Beccafico** *Sylvia borin* (Boddaert, 1783)
 3(n); 9(i); 54; 79(n); 125(n); 131(c, n); 132(n); 133(a, c); 134(c); 137; 152(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 294; 296; 359(r); 392(r); 411; 420(c); 485; 495; 517(n); 548(i); 555(n); 582(c); 598(n)
- Capinera** *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 9(i, r); 13(n); 44(r); 47(r); 49(r); 54(n); 71(n); 79(n); 125(a, n); 128; 131(c, n); 132; 134(c); 137; 152; 153; 159; 178; 179(n); 180(r); 189(n); 214(n); 227; 228(n); 229(n); 230(a, c); 239(n); 254(n); 270(n); 278(n); 280(n); 291; 300(a, c); 320(n); 377(r); 392(r); 404(r); 412(c); 420(a, c); 485; 495; 502(c); 504(i, n); 505; 510(n); 517(n); 529(n); 531; 532(n); 548(i, r); 555(a, n, r); 564(i, r); 582(c); 588(n); 595(n); 598(n)
- Luì forestiero** *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842)
 83(c); 211; 338(c); 409; 567(c)
- Luì bianco** *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819)
 3(n); 21; 22; 26; 79; 125(c); 131(c, n); 134(c); 178(n); 179(n); 225(n); 227(n); 228(n); 229(n); 278(n); 280; 294(c); 296(n); 411; 412(n); 445; 485(n); 517(n); 531; 548(i); 555(n); 598(n)
- Luì verde** *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793)
 3(n); 54; 71; 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 137; 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 270; 305(n); 306(n); 420(c); 485(n); 504; 505; 517; 548(i); 555
- Luì piccolo** *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817)
 3(n); 9(i, r); 13(n); 22(n); 49(i); 54; 71; 79; 125(n); 131(c, n); 132; 134(c); 137; 153; 159(n); 178(n); 179; 227; 228(n); 229; 249(r); 254; 270(n); 278(n); 280(n); 291(n); 294; 296; 377(r); 406(r); 420(c); 485(n); 502(c) 504(n); 505; 510; 517(n); 529; 531; 532(n); 548(i); 549(n); 555(n, r); 588(n); 597; 598(n)

Lui grosso *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758)
54; 71; 79; 125; 131(c, n); 134(c); 137; 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 296; 485(n); 504; 510; 517; 548(i); 555; 598(n)

Regolo *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758)
3(n); 9(i); 79; 94(n); 125; 131(c); 134(c); 137; 153; 159; 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 291; 296; 420(c); 485(n); 504; 505; 517(n); 548; 555

Fiorrancino *Regulus ignicapillus* (Temminck, 1820)
3(n); 13(n); 54; 79; 125; 131(c); 132(c); 134(c); 137; 159; 178(n); 179(n); 227; 228; 229(n); 278(n); 296; 420(c); 485(n); 502(c); 504; 505; 517(n); 548(i); 555(n); 598(n)

Pigliamosche *Muscicapa striata* (Pallas, 1764)
3(n); 9(i); 13(n); 38(c); 49(r); 54(r); 79(n); 125(n); 128; 131(c); 134(c); 137; 178(n); 179(n); 214; 226; 227; 228(n); 229(n); 267(n); 269(n); 270(n); 272(n); 278(n); 280(n); 296; 412(c); 420(c); 450(c); 485(n); 502(c); 504(n); 505; 517(n); 548(i); 555(n); 588(n); 598(n)

Pigliamosche pettirosso *Ficedula parva* (Bechstein, 1794)
2(c); 7(c); 21; 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83; 131(c); 135(c); 178(c); 179(c); 225(c); 227(c); 228(c); 231(c); 296; 331(c); 380(c); 445(c); 470(c); 471(c); 472; 478(c); 484(c); 485; 517; 555(c)

Balia dal collare *Ficedula albicollis* (Temminck, 1815)
3(n); 22(n); 23(n); 26(n); 79; 125; 131(c); 134(c); 178(n); 179; 225(c, n); 227; 228; 229; 288(n); 296; 420(c); 450(c); 485; 517; 548(i); 555(n)

Balia nera *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764)
3(n); 9(i, r); 49(i); 54; 71; 79(n); 83(n); 123; 125; 131(c); 134(c); 137; 178(n); 179(n); 214; 227; 228(n); 229; 280; 296(n); 392(r); 420(c); 440(i, r); 485; 504; 505; 507; 517; 548(i); 549(n); 555(r)

Basettino *Panurus biarmicus* (Linnaeus, 1758)
3(n); 79(n); 131(c); 178(n); 179(n); 227; 228(c); 229; 280(n); 485; 517; 555

Codibugnolo *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758)
3(n); 9(i); 13(n); 54; 79(n); 125(n); 131(c, n); 132; 133(c); 134(c); 137; 178(n); 179(n); 225; 226; 227; 228(c, n); 229(n); 230; 231(n); 270(n); 291; 296(n); 420(c); 485(n); 502(c); 504; 505; 517(n); 531; 532(n); 548(i); 555(c, n); 586(c)

Cincia bigia *Parus palustris* Linnaeus, 1758
3(n); 9(i, r); 54; 79(n); 125; 131(c); 132(c); 134(c); 153; 178; 179; 227(n); 228(n); 229(n); 270(n); 291; 296; 485; 495; 517(n); 548; 555(n)

Cincia bigia alpestre *Parus montanus* Conrad, 1827
3(n); 94(n); 131(c); 228(c); 229; 291; 517(n); 555(n)

Cincia dal ciuffo *Parus cristatus* Linnaeus, 1758
1(n); 3(n); 26(n); 77(c); 79; 92(n); 95(n); 105(n); 131(c); 178(n); 179; 211(n); 225; 227; 228; 229(c); 255(n); 268(n); 270(n); 278(n); 296(n); 323(n); 338(n); 411(n); 412(n); 471; 484; 485(n); 517(n); 532(n); 555(c, n); 579; 598(n)

Cincia mora *Parus ater* Linnaeus, 1758
3(n); 79; 125(n); 128; 131(c); 132; 159; 178(n); 179; 189(n); 227; 228; 229; 230; 238; 254; 270(n); 274(n); 278(n); 291; 296; 333(c); 336; 358; 392(r); 404(r); 406(r); 420(c); 471; 485(n); 502(c); 504; 505; 510; 517(n); 548(i); 555(n, r); 598(n)

Cinciarella *Parus caeruleus* Linnaeus, 1758
3(n); 9(i, r); 13(n); 45(r); 49(r); 54; 79(n); 125(n); 128; 131(c, n); 134(c); 137; 178(n); 179(n); 182(c); 189(n); 227; 228(n); 229(n); 238; 270(n); 280(n); 283(n); 291; 296(n); 356; 361(r); 377(r); 391(r); 404(r); 406(r); 420(c); 485(n); 491; 495; 502(c); 504(i); 505; 510; 517(n); 531; 532(n); 548(i); 555(n, r); 564(i, r); 575; 576; 587; 588(n); 598(n)

Cinciallegra *Parus major* Linnaeus, 1758
3(n); 9(i, r); 13(n); 54(n); 79(n); 125(n); 128; 131(c, n); 134(c); 137; 152(c); 153; 159; 178(n); 179(n); 189(n); 227; 228(n); 229(n); 239(n); 254; 270(n); 278(n); 280(n); 291(n); 296(n); 391(r); 404(r); 406(r); 420(c); 485(n); 495; 502(c); 504(i, n); 505; 510(n); 517(n); 529(n); 535(n); 548(i); 555(n, r); 564(i, r); 582(c); 588(n); 598(n)

Picchio muratore *Sitta europaea* Linnaeus, 1758

3(n); 13(n); 79(n); 125(n); 131(c); 132; 133(c); 134(c); 137; 178(n); 179(n); 189(n); 227; 228(n); 229(n); 247(c); 270(n); 296(n); 420(c); 485(n); 491; 502(c); 504; 505; 517(n); 548(i); 555(n); 588(n); 598(n)

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria* (Linnaeus, 1766)

1(n); 3(n); 39(n); 71; 79; 92(n); 125(n); 131(c); 134(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229; 230; 241; 296; 420(c); 484(n); 485(n); 502(c); 517(n); 548; 555(c, n); 604(c)

Rampichino alpestre *Certhia familiaris* Linnaeus, 1758

3(n); 22; 26; 79(n); 105; 131(c); 134(c); 228(c); 229(c); 291(n); 296; 517(n); 548(i); 555(n); 598(n)

Rampichino *Certhia brachydactyla* C.L. Brehm, 1820

3(n); 9(i); 79(n); 125(n); 131(c); 134(c); 137; 176(c); 178(n); 179(n); 189(n); 227; 228(n); 229(n); 270(n); 278(n); 291(n); 420(c); 485(n); 504; 505; 517(n); 548(i); 555(n); 598(n)

Pendolino *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758)

3(n); 54(n); 79; 125; 131(c, n); 153(n); 178; 179; 182(c); 227; 228(c, n); 229; 230; 280; 305(n); 313(c); 420(c); 450(c); 485; 517; 555(c, e, r); 586(c)

Rigogolo *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758)

3(n); 13(n); 54(n); 71; 79; 125; 131(c, n); 134(c); 152(c); 153; 178; 179; 182(c); 227; 228(n); 229(n); 230; 270; 294; 296(n); 420(c); 427; 453; 467; 485; 491; 495; 502(c); 517(n); 548; 555(n); 582(c)

Averla piccola *Lanius collurio* Linnaeus, 1758

3(n); 9(i); 13(n); 54(n); 71; 79(n); 125; 128; 131(c); 132(c); 134(c); 137; 153; 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 270(n); 275; 278(n); 280(n); 291(n); 296(n); 420(c); 485(n); 491; 495; 502(c); 504(n); 505; 509; 517(n); 531; 532(n); 548(i); 549(n); 555(n); 583(n); 587(n); 588(n); 598(n)

Averla cenerina *Lanius minor* Gmelin, 1788

3(n); 22; 26; 54(n); 79; 125; 131(c); 134(c); 142; 178; 179(n); 225(c); 227; 228(n); 229(n); 270(n); 275(n); 296(n); 420(c); 485; 495; 502(c); 517(n); 520; 548(i); 555(c, n)

Averla maggiore *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758

2(c); 9(i); 22; 23(c); 26(c); 38; 79; 83(c); 105; 125; 131(c); 134(c); 170(c); 173; 178; 179; 206(c); 225(c); 227; 228(c); 229; 231; 294(c); 296; 338(c); 401(c); 420(c); 445; 459; 471; 472; 484; 485; 495; 517; 520; 555(c); 600(c)

Averla capriosa *Lanius senator* Linnaeus, 1758

3(n); 47(i); 54; 79(n); 83(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 178(n); 179(n); 189(n); 214; 227; 228(n); 229(n); 239(n); 270(n); 280; 294; 376(c); 383(c); 420(c); 434(c, n); 485; 502(c); 509; 510; 517(n); 537; 548(i); 549(n); 555(n); 605

Ghiandaia *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758)

2(c); 3(n); 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 137; 152(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 291; 296; 304(n); 305(n); 306(n); 420(c); 450(c); 485(n); 517(n); 555(c, n); 582(c)

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758)

2(c); 3(n); 22; 39(c, n); 78(c); 79; 92(n); 125(c); 131(c); 178(n); 179; 225; 227; 228; 229(c); 231(c); 294(c); 326; 412(c); 420(c); 471(c); 484; 485; 502(c); 517(n); 555(c, n)

Gracchio alpino *Pyrrhocorax graculus* (Linnaeus, 1766)

2(c); 3(n); 39(n); 79(n); 92(n); 125; 133(c); 178(n); 179(n); 227; 228; 229; 291; 420(c); 471; 485(n); 502(c); 517(n); 532(n); 555(c, n)

Gracchio corallino *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Linnaeus, 1758)

1(n); 2(c); 3(n); 39(n); 79(n); 125; 131(c); 178(n); 179(n); 227; 228; 420(c); 471; 485(n); 517(n); 532(n); 555(c, n)

Taccola *Corvus monedula* Linnaeus, 1758

1(n); 2(c); 3(n); 13(n); 39(n); 71(n); 79; 125; 131(c); 178; 179; 214(n); 227; 228; 229; 280(n); 291; 296; 420(c); 471; 485; 502(c); 517(n); 526(n); 529(n); 548; 555(c, n); 557(n); 586(c)

- Corvo** *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758
 79; 125; 131(c); 132; 134(c); 140(n); 178; 179; 227; 228; 229; 420(c); 471; 485; 502(c); 517; 555(c, n); 582(c)
- Cornacchia nera** *Corvus corone corone* Linnaeus, 1758
 3(n); 9(i); 79(n); 90(n); 125(n); 131(c); 132; 140; 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229; 296; 471(n); 485(n); 517(n); 531; 532(n); 543; 548; 555(n)
- Cornacchia grigia** *Corvus corone cornix* Linnaeus, 1758
 3(n); 13(n); 54(n); 71; 79(n); 125(n); 131(c, n); 132; 134(c); 153(n); 178(n); 179(n); 214; 227; 229(n); 270; 278(n); 280(n); 291; 420(c); 462; 485(n); 491; 502(c); 504; 505; 517(n); 543; 548; 555(n); 598(n)
- Corvo imperiale** *Corvus corax* Linnaeus, 1758
 2(c); 3(n); 13(n); 79(n); 90(n); 125(n); 131(c, n); 132; 178(n); 179(n); 227; 228; 229(n); 291; 296(n); 485(n); 517(n); 532(n); 555(c, n)
- Storno** *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758
 2(c); 3(n); 9(i, r); 44(i, r); 45(r); 47(i, r); 49(i, r); 54(n, r); 62; 79; 125; 131(c); 132; 141(r); 152(c); 153(n); 178; 179(n); 180(r); 227; 228; 229; 230; 236; 270(n); 272(n); 280(n); 291(n); 296; 346(r); 349(r); 359(r); 377(r); 392(r); 404(r); 406(r); 420(c); 462; 485; 491(n); 502(c); 504(i); 505; 507; 510; 511; 512; 517(n); 519; 520; 521; 529; 531; 532(n); 543(r); 548(i); 549(n); 555(c, n, r); 564(i, r); 565(r); 582(c); 598(n)
- Storno nero** *Sturnus unicolor* Temminck, 1820
 2(c); 21(c); 22(c); 23; 26(c); 79; 83; 105; 125(c); 153(c); 227(c); 228(c); 229; 445(c); 472(c); 517; 555(c)
- Storno roseo** *Sturnus roseus* (Linnaeus, 1758)
 2(c); 3(n); 7; 23; 61; 79; 83; 105; 125(c); 126; 127; 131(c, n); 151; 153(c); 178(c, n); 179; 182(c); 201; 227; 228(c, n); 229(n); 230; 246(c); 294; 313(c); 399(c); 412(c); 420(c); 450(c); 459(c); 471(c); 484(c); 485(n); 502(c); 517; 548; 555(c); 571; 604(c)
- Passera** *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 7(c); 22(n); 23; 26; 79; 94(n); 131(c); 151; 178(n); 179; 182(c); 227; 228(c, n); 229(c); 231(n); 296; 471(c); 485(n); 517; 548; 555(c, n)
- Passera d'Italia** *Passer italiae* (Vieillot, 1817)
 3(n); 9(i, r); 13(n); 21; 49(i, r); 54(n); 62(c); 71; 79(n); 125(a, n); 131(c, n); 134(c); 137; 152(c); 153; 159; 177(a, c); 178(a, n); 179(n); 182(c); 214(n); 227; 228(n); 229(n); 230(a, n); 254; 270(n); 278(n); 280(n); 291; 296; 300(a, c); 420(c); 485(a, n); 495; 502(c); 504(i); 505; 507; 509; 510(n); 517(n); 521; 529(n); 531; 532(n); 538(a, c); 543(r); 548(i); 549(n); 555(a, c, n); 564(i, r); 574(a); 580(n); 582(c); 595(n); 598(n)
- Passera sarda** *Passer hispaniolensis* (Temminck, 1820)
 3(n); 21; 22(n); 79(n); 170(c); 178(n); 179(n); 227(c); 296; 445; 472; 485(n); 517; 555(c, n)
- Passera mattugia** *Passer montanus* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 9(i, r); 47(i, r); 49(i); 54(n); 62(c); 79; 125(n); 131(c, n); 153(n); 178(n); 179(n); 182(c); 189(n); 227; 228(n); 229; 238; 254; 280; 296(n); 377(r); 392(r); 420(a, c); 485(n); 495; 502(c); 507; 509; 517(n); 538(a, c); 548(i); 549(r); 555(n, r); 564(i, r)
- Passera lagia** *Petronia petronia* (Linnaeus, 1766)
 3(n); 9(i); 79; 125; 131(c); 132; 134(c); 178(n); 179(n); 227; 228; 229; 296; 462; 485(n); 495; 517; 520; 548; 555(c, n)
- Fringuello alpino** *Montifringilla nivalis* (Linnaeus, 1766)
 3(n); 22(n); 79(n); 83; 125; 131(c); 138(c); 139(c); 179(n); 225; 227; 228(c); 229(c); 294(c); 313(c); 412(c); 485; 495; 502(c); 517(n); 555(c, n)
- Fringuello** *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758
 3(n); 9(i, r, n); 13(n); 44(i, r); 45(r); 47(i, r); 49(i, r); 54(n); 62; 79(n); 125(n); 131(c, n); 134(c); 137; 141(r); 152(c); 153; 159(n); 178(n); 179(n); 180(r); 189(n); 212(r); 214; 227; 228(n); 229(n); 230(a); 236; 238; 239; 254; 267(n); 270(n); 278(n); 280(n); 291(n); 296(n); 322(r); 377(r); 392(r); 404(r); 420(c); 453(n); 462; 485(n); 491; 495; 502(c); 504(c, i, n); 505; 507; 510; 517(n); 528(c); 529(n); 531; 532(n); 538(a, c); 548(i, r); 549(n); 555(n, r); 561(r); 563(r); 564(i, r); 582(c); 588(n); 595(n); 598(n)

- Peppola** *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758
 3(n); 9(i, r); 44(r); 47(r); 49(i, r); 54; 79; 125(n); 131(c); 132; 134(c); 159; 178(n); 179(n); 227; 228; 229; 236; 296; 392(r); 404(r); 415(r); 420(c); 462; 485(n); 502; 504(i); 505; 517; 548(i); 555(r); 564(i, r)
- Verzellino** *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)
 3(n); 9(i, r); 13(n); 46(r); 47(i); 54(n); 79(n); 125(n); 131(c, n); 132; 134(c); 153(n); 159(n); 178(n); 179(n); 214; 227; 228(n); 229(n); 270; 278(n); 280(n); 296; 328(r); 392(r); 404(r); 485(n); 495; 502(c); 504(i, n); 505; 517(n); 520(n); 531; 548(i); 555(a, c, n); 564(i, r); 588(n); 598(n)
- Venturone** *Serinus citrinella* (Pallas, 1764)
 3(n); 21; 22(n); 26(n); 38; 79; 94(n); 125; 131(c); 178; 179; 225; 227; 228; 229; 291; 294(n); 296; 445; 485; 517(n); 555(c, n)
- Verdone** *Carduelis chloris* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 9(i, r, n); 13(n); 44(i, r); 49(i, r); 54(n); 71; 79(n); 125(n); 131(c, n); 137; 178(n); 179(n); 189(n); 227; 228(n); 229(n); 270(n); 278(n); 280(n); 296(n); 392(r); 404(r); 406(r); 407(r); 412(n); 485(n); 495; 502(c); 504(i, n); 505; 517(n); 529(n); 531; 532(n); 548(i); 555(n, r); 564(i, r); 588(n); 598(n)
- Cardellino** *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 9(i, r); 13(n); 43(i, r); 44(i, r); 49(i, r); 54(n); 58(r); 71; 79(n); 125(n); 128; 131(c, n); 134(c); 137; 152(c); 153(n); 157(a, c); 159(n); 176(c); 178(n); 179(n); 189(n); 214(n); 227; 228(n); 229(n); 230; 270(n); 278(n); 280(n); 291; 296(n); 322(r); 392(r); 420(c); 462; 485(n); 495; 502(c); 504(i, n); 505; 507; 510; 517(n); 528(c); 529(n); 531; 532(n); 543(r); 548(i); 549(n); 555(n, r); 561(i, r); 564(i, r); 582(c); 588(n); 595(n); 598(n)
- Lucarino** *Carduelis spinus* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 9(r); 25; 44(i, r); 45(r); 47(r); 49(i, r); 54(r); 58(r); 62(c); 79(n); 125; 131(c); 134(c); 152(c); 159; 178; 179; 180(r); 214; 227; 228; 229; 230; 249(r); 278; 280; 296; 352(r); 377(r); 392(r); 404(r); 406(r); 420(c); 485; 495; 502(c); 504(i); 505; 517; 548(i); 555(n, r); 561(i, r); 563(r); 564(i, r); 582(c)
- Fanello** *Carduelis cannabina* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 9(i, r); 22(c, n); 44(r); 47(i, r); 54; 71; 79(n); 125(n); 131(c); 134(c); 152(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229; 236; 238; 270; 280(n); 296(n); 328(r); 392(r); 404(r); 415(r); 420(c); 485(n); 495; 502(c); 504(i); 505; 509; 517(n); 531; 532(n); 548(i); 549; 555(n, r); 561(r); 564(i, r); 582(c); 588(n); 598(n)
- Fanello nordico** *Carduelis flavirostris* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 21(c); 22(c); 23(c, n); 26(c); 79; 125(c); 131(c); 178(n); 179; 186(c); 226(c); 227(c); 228(c); 229; 231(c); 338(c); 445; 470(c); 471(n); 472; 484; 485(n); 517; 555(c, n)
- Organetto** *Carduelis flammea* (Linnaeus, 1758)
 3(n); 38; 79; 131(c); 178; 179; 182(c); 206(c); 227(c); 228(c); 229(c); 231; 248(c); 296; 420(c); 484; 485; 502(c); 517(n); 555(c, n); 582
- Crociere fasciato** *Loxia leucoptera* Gmelin, 1788
 517
- Crociere** *Loxia curvirostra* Linnaeus, 1758
 3(n); 9(i, r); 44(i, r); 62; 79; 81; 94(n); 125; 131(c); 134(c); 164(c); 178; 179; 227; 228(n); 229; 236; 238; 270; 291(n); 296; 329(c); 334(c); 337; 372(c); 374(c); 392(r); 420(c); 450(c); 458; 485; 502(c); 517(n); 548; 555(n, r); 564(i, r)
- Crociere delle pinete** *Loxia pytyopsittacus* Borkhausen, 1793
 21(c); 22(c); 23; 26(c); 79; 83(c); 105; 125; 131(c); 178(c); 179(c); 204(c); 225; 228(c); 229(c); 338(c); 409; 411(c); 412(c); 471; 472; 484; 485; 517; 555(c); 582(c)
- Trombettiere** *Bucanetes githagineus* (M.H.C. Lichtenstein, 1823)
 21(c); 22; 23; 26(c); 79; 83; 105; 227(c); 338(c); 412(c); 445; 517; 555(c)
- Ciuffolotto scarlatto** *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770)
 3(n); 22; 23; 61; 79; 83; 105; 131(c); 139(c); 151; 162; 178(c, n); 179; 182(c); 226; 227(c); 228(c); 229(c); 470(c); 471; 472; 483(c); 484(c); 485; 509; 517; 543; 549; 555(c, n)
- Ciuffolotto delle pinete** *Pinicola enucleator* (Linnaeus, 1758)
 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 231(c); 445(c); 555(c)

Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
3(n); 9(i); 79(n); 125(n); 131(c, n); 137; 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 231(c); 236; 270(n); 294(n); 296(n); 420(c); 433(n); 472; 485(n); 491(n); 495; 502(c); 504; 505; 517(n); 548; 555(n); 598(n)

Frosone *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758)
3(n); 9(i, r, n); 10(r); 45(r); 47(i, r); 58(r); 62; 79; 125; 131(c); 134(c); 152(c); 178; 179(n); 227; 228(n); 229; 236; 238; 296; 322(c); 392(r); 404(r); 420(c); 453; 485; 495; 502(c); 517; 548(i, r); 555 (n, r); 561(r); 564(i, r); 579(n); 582(c)

Passerella iliaca *Zonotrichia iliaca* (Merrem, 1786)
105; 115; 156(c); 171(c); 350(c); 409; 412(c); 517

Zigolo di Lapponia *Calcarius lapponicus* (Linnaeus, 1758)
2(c); 21; 22(c); 26(c); 79(c); 131(c); 151; 226; 227(c); 228(c); 229(c); 445; 470(c); 471(c); 472; 517; 555(c)

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis* (Linnaeus, 1758)
2(c); 3(n); 9(i); 79; 125(c); 131(c); 134(c); 178(n); 179; 225(e); 227; 228; 229; 230; 261; 296; 387(c); 448(c); 450(c); 471; 485; 495; 502(c); 507; 509; 517; 529; 543; 549; 555(c, i); 601(c)

Zigolo golarossa *Emberiza leucocephala* Gmelin, 1771
21; 22; 23(c); 26; 27(c); 62(c); 79; 131(c); 142; 225(c); 227(c); 228(c); 229; 355(c); 470(c); 471(c); 472; 484; 502(c); 517; 555(c)

Zigolo giallo *Emberiza citrinella* Linnaeus, 1758
3(n). 9(i); 79; 125(n); 131(c, n); 134(c); 178(n); 179(n); 227; 228; 229; 230; 296(n); 420(c); 448(a, c); 485(n); 495; 502(c); 504; 517(n); 548; 555(n); 598(n)

Zigolo nero *Emberiza cirrlus* Linnaeus, 1766
3(n); 9(i, r); 79; 125(n); 131(c, n); 134(c); 178(n); 179(n); 182(c); 214; 227; 228(n); 229(n); 236; 296; 420(c); 485(n); 495; 502(c); 504; 505; 507; 517(n); 548(i); 549(n); 555(n); 564(i, r); 598(n)

Zigolo muciatto *Emberiza cia* Linnaeus, 1766
3(n); 9(i, r); 54; 79(n); 125(n); 131(n); 134(c); 178(n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 230; 236; 280(n); 296(n); 339; 420(c); 485; 495; 502(c); 517(n); 548(i); 555(a, c, n); 564(i, r); 598(n)

Ortolano *Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758
3(n); 9(i, r); 22; 44(i); 49(i); 62; 79(n); 83; 125(a, n); 131(c, n); 134(c); 159; 178(a, n); 179; 199; 227; 228(n); 229(n); 230(a); 265(a, c); 280(n); 296(n); 420(c); 485; 495; 502(c); 504(i); 505; 517(n); 524; 543(r); 548(i); 555(n); 564(i, r)

Ortolano grigio *Emberiza caesia* Cretzschmar, 1826
21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 38(c); 79; 83(c); 105; 125(c); 131(c); 142; 158(c); 179; 182(c); 226; 227(c); 228(c); 229; 231; 338(c); 445; 470(c); 471(c); 472; 483(c); 484(c); 517; 555(c)

Zigolo boschereccio *Emberiza rustica* Pallas, 1776
21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 38(c); 61; 79; 83; 105; 125(c); 179(c); 226; 227(c); 228(c); 229; 231; 445; 470(c); 471(c); 472; 483(c); 484(c); 517; 555(c)

Zigolo minore *Emberiza pusilla* Pallas, 1776
3(n); 9(i, r); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 61(c); 79; 83; 131(c); 162; 178(c, n); 179(c); 226; 227 (c); 228(c); 229; 471(c); 472; 484(c); 485; 502(c); 517; 555(c); 573(c)

Zigolo dal collare *Emberiza aureola* Pallas, 1773
7(c); 21(c); 22(c); 23(c); 26(c); 79(c); 83(c); 105; 131(c); 226(c); 227(c); 228(c); 229; 231; 338(c); 445; 470(c); 471(c); 472; 517; 555(c)

Migliarino di palude *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
3(n); 45(r); 49(r); 54; 61; 79(n); 125; 131(c, n); 134(c); 178; 179; 182(c); 214; 226(a, c); 227; 228(n); 229; 296; 392(r); 404(r); 406(r); 420(c); 483; 485; 495; 502(c); 507; 509; 517; 548(i); 549; 555(r)

Zigolo capinero *Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769
2(c); 21; 22; 26; 38; 79; 125; 131(c); 178(c); 179; 182(c); 226; 227; 228(c); 229(c); 231; 294; 445; 471(c); 472; 483(c); 485; 514(i); 517; 548(i); 555(c); 582(c)

Strillozzo *Miliaria calandra* (Linnaeus, 1758)

3(n); 9(i, r, n); 54; 79(n); 125(n); 131(c); 132; 134(c); 178(a, n); 179(n); 227; 228(n); 229(n); 236; 278;
296(n); 392(r); 420(c); 485(n); 495; 502(a, c); 507; 509; 517(n); 548(i); 549(n); 555(n); 564(i, r); 587; 598(n)

Indirizzo dell'Autore:

GIORGIO TRUFFI, Lungo Polcevera 6/6 - 16163 GENOVA