

ARTURO GARGIONI* e AGOSTINO PEDRALI*

RESOCONTO ORNITOLOGICO BRESCIANO 1998

RIASSUNTO - Prosegue nel 1998 la raccolta delle segnalazioni ornitologiche più interessanti per la provincia di Brescia. Sono esclusi i dati già pubblicati su riviste specializzate. Le specie segnalate sono 30.

SUMMARY - 1998 ornithological report for the province of Brescia (Northern Italy). This tenth report considers the more interesting ornithological record (30) of 1998, in the province of Brescia. The information already published in other scientific journal are not reported.

PREMESSA

I criteri adottati per vagliare le osservazioni sono i seguenti:

- specie accidentali, rare o comunque poco osservate nel territorio bresciano, anche solo in relazione a determinati periodi dell'anno;
- specie comuni, ma presenti in un dato momento in quantità non consueta;
- soggetti che presentano comportamenti poco noti o anomalie del piumaggio;
- soggetti inanellati;
- casi di nidificazione di specie rare o localizzate, rilevati successivamente all'Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Brescia (1980-1984) e relativo aggiornamento (1985-1991).

Non sono state prese in considerazione le notizie già pubblicate su riviste del settore.

Ricordiamo ai collaboratori di fare riferimento, per la valutazione dei propri dati, al lavoro sulla "Situazione dell'avifauna bresciana" (BRICHETTI, 1994). Inoltre, ai fini della pubblicazione, è utile fornire un'eventuale documentazione fotografica delle osservazioni più interessanti.

Dal presente resoconto verranno considerate in un'appendice, anche le specie esotiche (fuggite dalla cattività), osservate in provincia di Brescia. I nomi italiani delle specie descritte si rifanno al lavoro di MASSA *et al.*, 1993.

ELENCO DEI COLLABORATORI

Hanno contribuito a questo resoconto, comunicando le loro osservazioni: Manuel Allegri (Cremona), Mauro Bailo (Sulzano), Renzo Baratti (Boldeniga), Antonio Barisani (Cremona), Roberto Bertoli (Torbole Casaglia), Antonio Bozzetti (Cremona), Maurizio Elia Busetto (Concesio), Gianpaolo Cristini (), Arturo Gargioni (Gottolengo), Giancarlo Girelli (Verolavecchia), Marco Guerrini (Provaglio d'Iseo), Franco Mazzotti (Cologne), Sergio Mazzotti (Coccaglio), Renato Migliorati (Pavone del Mella), Attilio Mutti (Desenzano del Garda), Franca Orlini (Cellatica), Agostino Pedrali (Coccaglio), Dario Quaranta (Manerbio), Alessandro Rossi (Desenzano del Garda), Cesare Salandini (Castiglione della Stiviere, MN), Fulvio Vivenzi (Padenghe sul Garda).

* GRA, Gruppo Ricerche Avifauna

ELENCO SISTEMATICO DELLE SEGNALAZIONI

PODICIPEDIDAE

Svasso cornuto *Podiceps auritus*: un individuo segnalato il 14 novembre presso Sale Marasino sul lago d'Iseo (Busetto M.). Anche se negli ultimi anni viene contattata più regolarmente, questa specie rimane sempre di comparsa scarsa e irregolare per il Sebino. Per la provincia è migratore e svernante irregolare (BRICHETTI, 1994).

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*: dal 3 al 17 aprile vengono osservati in successione: 10, 25, 40, 10 e 6 individui presso la "scogliera" di Iseo. Un singolo individuo viene segnalato il 10 ottobre nella R. N. Torbiere del Sebino (Guerrini M.). Tali osservazioni confermano l'importanza della prima decade di aprile per la presenza della specie nelle acque del Sebino.

ARDEIDAE

Nitticora *Nycticorax nycticorax*: un sub-adulto osservato il 2 febbraio nella R. N. Bosco dell'Isola nel comune di Orzinuovi posato su Pioppo nero *Populus nigra* in un bosco ripariale (Bertoli R.). In relazione alle ultime acquisizioni fenologiche non è da escludere la possibilità di uno svernamento (FORNASARI *et al.*, 1992).

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*: tre adulti in sosta dal 26 agosto al 22 settembre nella R. N. Torbiere del Sebino (Busetto M.). Pur essendo in ambito provinciale migratore regolare (BRICHETTI, 1994), le osservazioni della specie per le acque del Sebino sono sempre scarse.

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*: un individuo osservato il 13 settembre insieme ad alcuni Aironi cenerini *Ardea cinerea*, in un incolto presso Isorella (Orlini F. e Busetto M.). È la seconda segnalazione accertata per la provincia di Brescia (cfr. Gargioni in GARGIONI e PEDRALI, 1998b).

Garzetta *Egretta garzetta*: un individuo osservato in atteggiamento trofico sul bagnasciuga l'11 gennaio presso Colombare di Sirmione. Secondo testimonianze raccolte in loco, tale soggetto era presente già da diversi giorni (Gargioni A.). La specie in Italia sverna ormai regolarmente in molte zone umide costiere e dell'interno. Per la provincia di Brescia si hanno solo pochi casi di presenze invernali, riferibili anche al lago di Garda (BRICHETTI e CAMBI, 1990).

Airone cenerino *Ardea cinerea*: il 30 novembre è stata censita la colonia di questo ardeide all'interno del raccordo autostradale di Brescia centro. La consistenza si è più che triplicata, passando dai 27 nidi dell'anno precedente (Barisani e Brichetti in GARGIONI e PEDRALI, 1999), agli attuali 85 (Barisani A., Bozzetti A. e Gargioni A.).

THRESKIORNITHIDAE

Mignattaio *Plegadis falcinellus*: due individui osservati il 28 settembre in una tesa per anatidi presso Dello (Baratti R.). Per la provincia di Brescia la specie è considerata di passo irregolare. A livello nazionale la migrazione post-nuziale è più consistente nelle regioni settentrionali e riguarda soprattutto giovani in dispersione.

Tab. 1 - Elenco sistematico degli uccelli acquatici (compresi *Phalacrocorax carbo* e *Ardea cinerea*) censiti nel gennaio 1998 nei maggiori bacini lacustri bresciani. I valori riportati per il lago di Garda comprendono anche quelli relativi agli individui censiti nelle province di Verona e Trento.

Specie	Lago di Garda	Lago d'Iseo	Torbiere d'Iseo	Specie	Lago di Garda	Lago d'Iseo	Torbiere d'Iseo
Strolaga mezzana <i>Gavia arctica</i>	6			Moriglione <i>Aythya ferina</i>	2		25
Tuffetto <i>Tachybaptus ruficollis</i>	62	14	19	Moretta <i>Aythya fuligula</i>	2	1	19
Svasso maggiore <i>Podiceps cristatus</i>	1520	850	63	Orchetto marino <i>Melanitta nigra</i>	1		
Svasso colorosso <i>Podiceps grisegena</i>	14			Orco marino <i>Melanitta fusca</i>	7		
Svasso piccolo <i>Podiceps nigricollis</i>	3385			Quattrocchi <i>Bucephala clangula</i>	1		
Cigno reale <i>Cygnus olor</i>	286	113		Pesciaiola <i>Mergellus albellus</i>			1
Canapiglia <i>Anas strepera</i>			11	Smergo minore <i>Mergus serrator</i>	2		
Germano reale <i>Anas platyrhynchos</i>	223	28	22	Folaga <i>Fulica atra</i>	10787	1631	143
Mestolone <i>Anas clypeata</i>			16	Cormorano <i>Phalacrocorax carbo</i>	627		278
Fistione turco <i>Netta rufina</i>	18			Airone cenerino <i>Ardea cinerea</i>	14		18

ANATIDAE

Oca lombardella *Anser albifrons*: tre individui osservati il 3 dicembre in una tesa per anatidi presso Bagnolo Mella (Baratti R.). Questa specie in Italia è migratrice regolare e svernante soprattutto nelle aree costiere dell'alto Adriatico. Per la provincia è considerata migratrice irregolare e svernante probabile (BRICHETTI, 1994).

Pesciaiola *Mergellus albellus*: due individui osservati il 17 dicembre in una tesa per anatidi a Bagnolo Mella (Baratti R.). Una femmina nella R. N. Torbiere del Sebino il 14 dicembre in uno specchio d'acqua parzialmente ghiacciato imbrancata con Canapiglia *Anas strepera*, Germano reale *Anas platyrhynchos* ed Alzavola *Anas crecca* (Bertoli R.). Nella stessa località viene osservata una femmina l'11 febbraio e il 26 dicembre, in entrambi i casi imbrancata con Morette *Aythya fuligula* (Guerrini M. e Busetto M.). Questa specie, svernante irregolare in provincia (BRICHETTI, 1994), è stata segnalata per due inverni consecutivi sul Sebino (cfr. Busetto in GARGIONI e PEDRALI, 1999).

ACCIPITRIDAE

Nibbio bruno *Milvus migrans*: riconfermata la nidificazione di una coppia nella R. N. Torbiere del Sebino con l'involto di due giovani nella seconda settimana di luglio (Mazzotti S.). La prima nidificazione accertata per le Torbiere è avvenuta nel 1997 con l'involto di un giovane (MAZZOTTI, 1998).

Nibbio reale *Milvus milvus*: un individuo osservato in volteggio il 12 dicembre in località Monterotondo di Passirano nel comune di Provaglio d'Iseo (Guerrini M.). I ripetuti avvistamenti degli ultimi anni avvenuti in luoghi e periodi diversi, fanno pensare al territorio bresciano come una regolare rotta di transito pre e post-nuziale. Per il futuro non sono da escludersi casi di regolari svernamenti.

FALCONIDAE

Smeriglio *Falco columbarius*: un individuo osservato il 15 gennaio nelle campagne di Rovato (47 IV SO) presso la frazione Duomo (Mazzotti S.). Una femmina in volo lungo il fiume Chiese fra Visano e Acquafredda il 23 gennaio, nello stesso luogo un maschio in caccia di una Ballerina bianca *Motacilla alba* il 10 novembre; singoli individui visti anche il 21 novembre, il 12 dicembre e il 23 gennaio 1999 (Gargioni A.). Il ripetersi degli avvistamenti nei mesi invernali fa ipotizzare un effettivo svernamento della specie.

GRUIDAE

Gru *Grus grus*: un individuo ha sostato dal 3 maggio per oltre una settimana in coltivi presso Acqualunga (Cristiani G.). Migratore irregolare nella nostra provincia, compare singolarmente o in piccoli gruppi soprattutto durante il transito pre-nuziale.

RECURVIROSTRIDAE

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*: a conferma di una sempre maggiore regolarità della specie in provincia, un giovane e un adulto hanno sostato dal 25 settembre all'8 agosto in un pantano e sul greto del fiume Chiese fra i comuni di Visano, Acquafredda e Calvisano (Gargioni A.). Verso la metà del mese di giugno in una tesa per anatidi in località cascina Campagna nel comune di Pavone del Mella, (61 I NO), è stata osservata una coppia con un pullo dall'apparente età di dieci-quindici giorni. Visite precedenti non hanno permesso di individuare il nido a causa dell'erba alta e si presume che gli altri pulli o le uova siano state predate (Migliorati R.). Questo rappresenta il primo caso di nidificazione per la provincia di Brescia.

SCOLOPACIDAE

Combattente *Philomachus pugnax*: un individuo il 18 febbraio in una tesa per anatidi in località Cascina Marocchina presso Comezzano-Cizzago (Bertoli R.) Trattasi verosimilmente di un individuo in migrazione precoce.

Voltapietre *Arenaria interpres*: un gruppo di sette individui ha sostato dal 10 al 20 settembre in una tesa per anatidi presso Bagnolo Mella (Baratti R.). In provincia la specie compare irregolarmente sul basso lago di Garda, mentre rari sono gli avvistamenti in pianura, soprattutto per gruppi così numerosi e con soste così prolungate. L'ultima segnalazione per la provincia risale al 1990 (Rossi in MICHELI e Busetto, 1992).

Tab. 2 - Risultati del censimento dei Laridi svernanti in provincia di Brescia effettuato il 18 gennaio 1998 (Per il lago di Garda i valori comprendono anche la provincia di Verona, mentre il lago d'Idro non è stato rilevato). Rilevatori lago d'Iseo: Mazzotti F., Mazzotti S. e Pedrali A.; lago di Garda: Allegri M., Gargioni, A., Mutti A., Rossi A., Salandini C. e Vivenzi F.

Specie	Località	Ind. stazionari	Ind. al rientro serale
Gabbiano comune <i>Larus ridibundus</i>	L. di Garda L. d'Iseo	3798	28210 24491
Gabbiano reale <i>Larus cachinnans</i>	L. di Garda L. d'Iseo	230	
Gavina <i>Larus canus</i>	L. di Garda L. d'Iseo	546	
Gabbianello <i>Larus minutus</i>	L. di Garda L. d'Iseo	2	
	Totale	4576	52701

LARIDAE

Zafferano *Larus fuscus*: un individuo osservato il 26 dicembre nella R. N. Torbiere del Sebino imbrancato con Gabbiano comune *Larus ridibundus*; Gabbiano reale *Larus cachinnans* e Gavina *Larus canus* (Guerrini M.). Dopo lo svernamento accertato per il 1994 (Mazzotti S. in GARGIONI e PEDRALI, 1998a), questa è la prima segnalazione per il Sebino. È specie migratrice e svernante regolare localizzata nella parte meridionale del lago di Garda dove viene regolarmente censita dalla fine degli anni '80 (BRICHETTI e CAMBI, 1990).

STRIGIDAE

Gufo comune *Asio otus*: nove individui osservati l'8 dicembre in un dormitorio all'interno di un boschetto ripariale lungo il fiume Oglio tra Pontevico e Verolanuova (Girelli G.). Per la bassa pianura bresciana si tratta del roost più numeroso fino ad ora noto.

APODIDAE

Rondone maggiore *Apus melba*: cinque individui osservati sorvolare ripetutamente le falesie della Rocca di Manerba del Garda il 3 e il 5 luglio (Mutti A.). Le date ricadono nel periodo di nidificazione, così come precedenti avvistamenti in periodo riproduttivo effettuati lungo la costiera rocciosa bresciana prospiciente il lago (DUSE e CAMBI, 1980). Indagini più approfondite potrebbero portare alla scoperta di nuovi siti riproduttivi di questa specie.

HIRUNDINIDAE

Rondine *Hirundo rustica*: il 9 giugno in località Valenca Alta, comune di Coccaglio, osservato un individuo completamente albino, successivamente il 13 giugno, nella stessa località osservati due individui completamente albini. Entrambi i soggetti utilizzano la stessa cascina come dormitorio. Secondo informazioni raccolte in loco il 3 giugno gli individui albini erano tre, probabilmente appartenenti alla stessa covata. Gli avvistamenti si sono protratti fino alla seconda settimana di luglio (Mazzotti S. e Pedrali A.).



Fig. 1 - Uno degli individui albinsi di Rondine *Hirundo rustica* osservati a Valenca Alta di Coccaglio (foto Mazzotti S.).

TURDIDAE

Pettiroso *Erithacus rubecula*: accertata la nidificazione il 25 aprile di una coppia in una pineta a 250 m s.l.m. nel territorio di Carzago (48 IV SO) (Mutti A.), dove precedentemente la nidificazione era considerata solo probabile (BRICHETTI e CAMBI, 1985).

Pettazzurro *Luscinia svecica*: un individuo della ssp. *cyaneacula* rinvenuto il 24 agosto a Castegnato. (Pedrali A.). Specie migratrice scarsa ma regolare.

SYLVIIDAE

Occhiocotto *Sylvia melanocephala*: terza segnalazione invernale della specie per la bassa pianura: un individuo osservato il 16 gennaio a Manerbio in un giardino urbano ricco di cespugli (Quaranta D.). In provincia questo silvide è sedentario e nidificante nelle oasi xerothermiche prealpine. Le precedenti osservazioni si riferiscono a singoli individui che frequentavano residue aree boscate (Caffi in MICHELI e Busetto, 1992; Caffi in GARGIONI e Busetto, 1996).

CORVIDAE

Gazza *Pica pica*: continua negli ultimi anni la progressiva espansione dell'areale, soprattutto nella parte nord-occidentale della provincia, a conferma di quanto riscontrato nell'ultima indagine sulla distribuzione della specie (BRICHETTI, 1995). Comuni come Palazzolo s. Oglio, Cologne, Coccaglio (Pedrali A.); Rovato e Bornato (Mazzotti S.), sono interessati da numerose osservazioni in periodo invernale e nel 1998 anche da casi di nidificazione probabile a Palazzolo s. Oglio, 46 I NE (Mazzotti S.) e Coccaglio 47 IV NO (Pedrali A.) I quadranti 46 I NE; 47 IV NO;



Fig. 2 - L'anatra fischiatrice indiana *Dendrocygna javanica* presente nel porto di Sirmione (foto A. Rossi).

47 IV SO e 47 IV SE sono interessati da svernamento certo anche se con pochi individui. Altri due individui in volo sono stati segnalati il 13 novembre a Gussago (Bailo M.).

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*: un individuo rinvenuto il 14 novembre sulle colline moreniche nell'entroterra benacense in comune di Pozzolengo, in ambiente termofilo con vigneti e boschetti di Roverella (Rossi A.). Presenze a quote così basse sono rare e conseguono le periodiche "invasioni". La maggior parte delle segnalazioni provinciali riguarda il settore occidentale (Mazzotti in MICHELI e Busetto, 1991; Pedrali in Busetto e Gargioni, 1994; Pedrali in Gargioni e Pedrali, 1999).

Taccola *Corvus monedula*: nuovo sito riproduttivo nel comune di Cologne (47 IV SE.) L'insediamento è avvenuto sul campanile della chiesa parrocchiale da parte di due coppie (Mazzotti S.). La segnalazione conferma l'ampliamento dell'areale in corso dall'inizio degli anni '90.

FRINGILLIDAE

Organetto *Carduelis flammea*: un individuo osservato il 17 febbraio nei pressi del ponte sul fiume Oglio a Quinzano d'Oglio in un coltivo (Bertoli R.). Le osservazioni in pianura o alle basse quote sono scarse ed irregolari.

APPENDICE

DENDROCYGNIDAE

Anatra fischiatrice indiana *Dendrocygna javanica*: un individuo di questa specie a distribuzione asiatica, in grado di volare perfettamente ma dal comportamento confidente, ha stazionato con altri anseriformi nel porto di Sirmione sul lago di Garda dall'11 novembre 1998 almeno a tutto dicembre (Rossi A.).

ANATIDAE

Codone guancebianche *Anas bahamensis*: un individuo di questa specie a distribuzione neotropicale, è stato osservato il 20 settembre in una tesa per anatidi presso Bagnolo Mella (Baratti R.).

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano il rag. Augusto Galli, direttore della Società Autostrade centro-padane, che ha concesso il permesso per effettuare il censimento della garzaia di Aironi cenerini, ed il sig. Roberto Romagnoli che ha gentilmente accompagnato i rilevatori.

BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P., 1994 - *Situazione dell'avifauna della provincia di Brescia (Lombardia). Aggiornamento 1993*. Natura Bresciana, 29: 221-249.
- BRICHETTI P., 1995 - *Espansione territoriale della Gazza Pica pica nella pianura bresciana (Lombardia)*. Pianura, 7: 97-102.
- BRICHETTI P. e CAMBI D., 1990 - *Atlante degli uccelli svernanti in provincia di Brescia*. Monografie di Natura Bresciana, 14: 1-111.
- BRICHETTI P., DE FRANCESCHI P. e BACETTI N., 1992 - *Fauna d'Italia. Aves I. Vol. XXIX*. Calderini, Bologna.
- BUSETTO M. e GARGIONI A., 1994 - *Resoconto ornitologico bresciano 1992*. Natura Bresciana, 29: 287-292.
- DUSE A. e CAMBI D., 1980 - *Avifauna benacense*. Nuova ed. Ateneo di Salò. Geroldi, Brescia.
- FORNASARI L., BOTTONI L., MASSA R., FASOLA M., BRICHETTI P. e VIGORITA V., 1992 - *Atlante degli uccelli svernanti in Lombardia*. Regione Lombardia e Univ. Studi Milano: 378 pp.
- GARGIONI A. e BUSETTO M., 1996 - *Resoconto ornitologico bresciano 1993*. Natura Bresciana, 30: 275-283.
- GARGIONI A. e PEDRALI A., 1998a - *Resoconto ornitologico bresciano 1994*. Natura Bresciana, 31: 249-258.
- GARGIONI A. e PEDRALI A., 1998b - *Resoconto ornitologico bresciano 1996*. Natura Bresciana, 31: 269-278.
- GARGIONI A. e PEDRALI A., 1999 - *Resoconto ornitologico bresciano 1997*. In questo stesso volume, pp. 233-240.
- MASSA R., BOTTONI L. e VIOLANI C., 1993 - *Lista in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo*. Università degli studi di Milano: 1-156.
- MAZZOTTI S., 1998 - *Prima nidificazione di Nibbio bruno Milvus migrans, nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia)*. Natura Bresciana, 31: 279-280.
- MICHELI A. e BUSETTO M., 1991 - *Resoconto ornitologico bresciano 1986-1988 e 1989*. Natura Bresciana, 26: 239-249.
- MICHELI A. e BUSETTO M., 1992 - *Resoconto ornitologico bresciano 1990*. Natura Bresciana, 27: 223-232.

Indirizzi degli Autori:

ARTURO GARGIONI, villaggio Incidella 50 - 25023 Gottolengo (Brescia).
AGOSTINO PEDRALI, via Don L. Sturzo 25 - 25030 Coccaglio (Brescia).