

BIOMETRIE DELL'AVIFAUNA PIEMONTESE E VALDOSTANA

SERGIO FASANO, GIOVANNI BOANO E GEROLAMO FERRO

Parole chiave – Biometria, Inanellamento, Uccelli, Piemonte e Valle d'Aosta.

Key words – Biometry, Birds, Piemonte Valle d'Aosta.

Riassunto – Gli autori hanno analizzato l'archivio del Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani che, per il periodo compreso tra il 1974 ed il 2001, raccoglie dati relativi a 281.121 individui appartenenti a 197 specie. Viene qui proposta, per le 106 specie con un campione di almeno 24 individui, l'analisi delle principali variabili morfometriche rilevate durante l'attività di inanellamento a scopo scientifico suddivise per classi di sesso ed età.

Summary – Biometric measurements of birds from Piedmont and Valle d'Aosta - The authors analysed the archives of the Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (Piedmont and Valle d'Aosta Ringers' Group), which includes data on 281,121 individual birds of 197 species, gathered between 1974 and 2001. For the 106 specie for which a sample of at least 24 individuals was available, we analyse the main morphometric variables recorded during ringing activities, broken down by sex and age classes.

Il presente lavoro vuole essere di integrazione ed approfondimento a quanto riportato nei "25 anni di inanellamento in Piemonte e Valle d'Aosta" (FASANO *et al.* 2005) a cui si rimanda. Esso è nato primariamente come supporto da campo per gli inanellatori a scopo scientifico, ma vorrebbe anche fornire un utile supporto per tutti coloro che, a qualunque titolo, necessitano di informazioni relative alle biometrie dei nostri uccelli.

MATERIALI E METODI

L'informatizzazione, non solo del singolo dato di inanellamento, ma anche di tutti i parametri rilevati per ogni individuo, promossa dal Museo Civico Craveri di Storia Naturale di Bra (CN), rende disponibile una mole di informazioni unica nella realtà ornitologica regionale italiana. Il campione di partenza è rappresentato da 281.121 individui appartenenti a 197 specie, inanellati in Piemonte e Valle d'Aosta nel periodo compreso tra il 1974 ed il 2001 dagli aderenti al Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani (sottogruppo specialistico del Gruppo Piemontese di Studi Ornitologici "F. A. Bonelli" onlus).

Per questo lavoro si è analizzato un campione di dati, relativo a 106 specie, scelto fra quelle di cui fosse stata raccolta una o più delle seguenti variabili morfometriche per almeno 24 individui:

- lunghezza della corda massima (C.Max, secondo

Svensson 1992);

- lunghezza della terza remigante primaria (3RM, secondo Jenny and Winkler 1989);
- lunghezza del tarso (secondo Svensson 1992);
- peso.

Su questa base sono sempre stati riportati la consistenza del campione (n) ed i valori minimi e massimi di ogni misura (min – max) e, per ogni classe in cui il campione fosse di almeno 3 individui, anche media e deviazione standard (media \pm d.s.). Le misure di lunghezza sono espresse in millimetri, quelle relative al peso in grammi.

Per le specie in cui è possibile la determinazione delle classi di sesso, l'analisi è stata effettuata per ognuna di esse: 0 = indeterminato; F = femmina; M = maschio; tot. = campione complessivo.

Si è inoltre proceduto, quando possibile, ad effettuare l'analisi per classi di età raggruppate secondo la codifica EURING (SPEEK *et al.* 2001):

- età 2/4: soggetto completamente sviluppato in grado di volare liberamente, la sua età non è però conosciuta o è nato prima dell'anno in corso;
- età 3/5: soggetto completamente sviluppato, nato nella stagione riproduttiva dell'anno in corso o nell'ultimo anno trascorso (primo o secondo anno di vita);
- età 6: soggetto nato prima dell'anno precedente (dopo il secondo anno di vita), l'anno di nascita non è però conosciuto.

L'ordine sistematico segue la codifica EURING

(SPEEK *et al.* 2001), mentre per la nomenclatura delle specie ci si è adeguati alla recente lista CISO – COI degli uccelli italiani (www.ciso-coi.org).

RISULTATI

L'analisi delle variabili morfometriche suddivise per classi di sesso ed età, relativa alle 106 specie trattate, viene riportata nelle tabelle allegate al presente articolo.

Ringraziamenti – Un grazie sentito e particolare ad Ettore Molinaro, direttore del Museo Craveri, per aver sempre sostenuto questa attività mettendo a disposizione personale, locali ed apparecchiature informatiche per l'inserimento, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati di inanellemento.

È inoltre opportuno e doveroso ringraziare i 39 inanellettori che hanno lavorato in questi anni fornendo il materiale essenziale l'analisi, e tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno collaborato all'attività di inanellemento. Senza il loro costante impegno non sarebbe stato possibile ottenere questi risultati (Tab. 1).

Accantelli Daniele	Oleggio Castello (NO)
Alberti Ivo	Ormea (CN)
Bandini Marco	Meina (NO)
Biddau Luca	Rivarossa (TO)
Boano Giovanni	Carmagnola (TO)
Bonicelli Gian Abele	Avigliana (TO)
Borghesio Luca	Torino
Cassone Pietro	Albano vercellese (VC)

Cucco Marco	Torino
D'Addio Linda	Giaveno (TO)
Fasano Sergio	Cherasco (CN)
Ferro Gerolamo	Bra (CN)
Fissore Mauro	Chiusa Pesio (CN)
Frache Bruno	Luserna San Giovanni (TO)
Garrone Beppe	Santena (TO)
Girauda Luca	Boves (CN)
Gola Laura	Serravalle Scrivia (AL)
Grillo Carlo	Bra (CN)
Grimaldi Paolo	Milano
Liberini Giovanni	Bellinzago novarese (NO)
Mangini Valentina	Condove (TO)
Mingozzi Toni	Piosasco (TO)
Molinaro Ettore	Bra (CN)
Panizza Gabriele	Bosio (AL)
Pavia Marco	Torino
Peano Aldo	Giaveno (TO)
Peila Paolo	Mondovi (CN)
Piacentini Dario	Muntebelluna (TV)
Pivani Francesca	Quittengo (BI)
Ribetto Gianfranco	Villar Perosa (TO)
Ribetto Renzo	Villar Perosa (TO)
Rosselli Domenico	Pinerolo (TO)
Rossi Ghigo	Aosta
Saracco Giorgio	Biella
Silvano Fabrizio	Stazzano (AL)
Tamietti Alberto	Carignano (TO)
Tibaldi Bruno	Cherasco (CN)
Vaschetti Bruno	Racconigi (CN)
Vaschetti Gabriella	Racconigi (CN)

BIBLIOGRAFIA

- FASANO S., BOANO G. E FERRO G., 2005 - 25 anni di inanellemento in Piemonte e Valle d'Aosta. Lab. Terr. di Educ. Amb., Museo Civico Craveri di Storia Naturale. Memorie dell'ANP vol. V, Bra. Pp. 224.
- JENNI L. AND WINKLER R., 1989 - The feather-length of small passerines: a measurement for wing-length in live birds and museum skins. *Bird Study* 36: 1-15.
- SPEEK G., CLARK J.A., ROHDE Z., WASSENAAR R.D. and Van

- Noordwijk A.J., 2001. The EURING exchange-code 2000. Heteren.
- SVENSSON L., 1992 - Identification Guide to European Passerines. 4th edn. Svensson, Stockholm.
- RISORSE INTERNET
Commissione Ornitologica Italiana, 2004. Lista CISO – COI degli uccelli italiani. www.ciso-coi.org.

Tab. 1 - Elenco degli inanellatori che hanno conferito i loro dati al Gruppo Inanellatori Piemontesi e Valdostani nel periodo 1974 – 2001.

Tarabusino *Ixobrychus minutus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0		152,0	1	150,7 ± 5,03	146,0 - 156,0	3				151,0 ± 4,16	146,0 - 156,0	4
	F	153,2 ± 5,91	145,0 - 158,0	4	150,0 ± 3,54	144,0 - 153,0	5	152,3 ± 6,66	145,0 - 158,0	3	151,7 ± 4,94	144,0 - 158,0	12
	M	159,0 ± 2,28	156,0 - 162,0	6		149,0 - 155,0	2	156,0 ± 2,72	152,0 - 160,0	11	156,5 ± 3,32	149,0 - 162,0	19
	Tot.	156,3 ± 4,80	145,0 - 162,0	11	150,6 ± 3,72	144,0 - 156,0	10	155,2 ± 3,87	145,0 - 160,0	14	154,2 ± 4,67	144,0 - 162,0	35
3RM	0					99,0	1					99,0	1
	F	103,1 ± 4,77	97,0 - 108,0	4	104,1 ± 1,75	102,0 - 106,0	5		104,5 - 111,0	2	104,4 ± 3,62	97,0 - 111,0	11
	M	107,5 ± 2,59	105,0 - 111,0	6		105,0 - 108,0	2	106,4 ± 5,19	101,5 - 115,5	6	106,9 ± 3,69	101,5 - 115,5	14
	Tot.	105,8 ± 4,05	97,0 - 111,0	10	104,1 ± 2,78	99,0 - 108,0	8	106,8 ± 4,76	101,5 - 115,5	8	105,5 ± 3,95	97,0 - 115,5	26
Tarso	0		47,0	1	45,5 ± 1,77	44,3 - 47,5	3				45,9 ± 1,63	44,3 - 47,5	4
	F	45,9 ± 1,79	44,0 - 48,2	4	44,3 ± 0,54	43,9 - 45,2	5	43,6 ± 1,99	42,0 - 46,3	4	44,6 ± 1,68	42,0 - 48,2	13
	M	47,1 ± 1,65	45,4 - 49,8	6		44,3 - 45,0	2	46,1 ± 0,96	44,9 - 47,9	9	46,3 ± 1,40	44,3 - 49,8	17
	Tot.	46,7 ± 1,65	44,0 - 49,8	11	44,7 ± 1,07	43,9 - 47,5	10	45,3 ± 1,76	42,0 - 47,9	13	45,6 ± 1,70	42,0 - 49,8	34
Peso	0		132,0	1		93,5 - 154,6	2				126,7 ± 30,89	93,5 - 154,6	3
	F		98,0 - 155,0	2	124,4 ± 21,67	94,2 - 151,8	5	120,8 ± 14,02	112,0 - 137,0	3	123,8 ± 20,92	94,2 - 155,0	10
	M	136,7 ± 23,25	105,0 - 160,0	5		128,0 - 135,6	2	125,5 ± 11,00	110,6 - 145,0	8	130,0 ± 15,66	105,0 - 160,0	15
	Tot.	133,5 ± 23,72	98,0 - 160,0	8	126,0 ± 21,97	93,5 - 154,6	9	124,2 ± 11,34	110,6 - 145,0	11	127,4 ± 18,77	93,5 - 160,0	28

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	293,6 ± 7,62	285,0 - 305,0	9	289,6 ± 10,32	265,0 - 310,0	78	290,0 ± 10,11	265,0 - 310,0	87
	F									
	M									
	Tot.	293,6 ± 7,62	285,0 - 305,0	9	289,6 ± 10,32	265,0 - 310,0	78	290,0 ± 10,11	265,0 - 310,0	87
3RM	0				194,3 ± 9,88	172,0 - 210,0	17	194,3 ± 9,88	172,0 - 210,0	17
	F									
	M									
	Tot.				194,3 ± 9,88	172,0 - 210,0	17	194,3 ± 9,88	172,0 - 210,0	17
Tarso	0	77,4 ± 1,81	75,0 - 80,5	9	77,1 ± 3,27	70,0 - 84,0	81	77,1 ± 3,15	70,0 - 84,0	90
	F									
	M									
	Tot.	77,4 ± 1,81	75,0 - 80,5	9	77,1 ± 3,27	70,0 - 84,0	81	77,1 ± 3,15	70,0 - 84,0	90
Peso	0	502,2 ± 59,01	425,0 - 600,0	9	535,2 ± 86,24	325,0 - 860,0	102	532,6 ± 84,64	325,0 - 860,0	111
	F									
	M									
	Tot.	502,2 ± 59,01	425,0 - 600,0	9	535,2 ± 86,24	325,0 - 860,0	102	532,6 ± 84,64	325,0 - 860,0	111

Alzavola *Anas crecca*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0		193,0	1					193,0	1
	F	178,4 ± 5,74	171,0 - 186,0	7	178,0 ± 5,24	170,0 - 184,0	5	178,2 ± 5,29	170,0 - 186,0	12
	M	186,3 ± 4,35	181,0 - 192,0	7	184,8 ± 2,39	181,0 - 187,0	5	185,7 ± 3,60	181,0 - 192,0	12
	Tot.	183,1 ± 6,72	171,0 - 193,0	15	181,4 ± 5,25	170,0 - 187,0	10	182,4 ± 6,12	170,0 - 193,0	25
3RM	0									
	F	116,1 ± 6,18	108,0 - 124,0	7	119,6 ± 2,56	117,0 - 123,0	4	117,4 ± 5,30	108,0 - 124,0	11
	M	122,4 ± 3,88	117,5 - 127,0	7	121,1 ± 2,53	118,0 - 124,0	4	121,9 ± 3,37	117,5 - 127,0	11
	Tot.	119,2 ± 5,93	108,0 - 127,0	14	120,4 ± 2,49	117,0 - 124,0	8	119,6 ± 4,92	108,0 - 127,0	22
Tarso	0									
	F	29,2 ± 1,04	28,0 - 30,0	3	28,9 ± 1,75	26,7 - 31,5	5	29,0 ± 1,44	26,7 - 31,5	8
	M	28,8 ± 1,41	27,8 - 29,8	2	30,0 ± 1,38	29,0 - 31,6	3	29,5 ± 1,38	27,8 - 31,6	5
	Tot.	29,0 ± 1,04	27,8 - 30,0	5	29,3 ± 1,62	26,7 - 31,6	8	29,2 ± 1,39	26,7 - 31,6	13
Peso	0		350,0	1					350,0	1
	F	276,5 ± 25,68	250,0 - 335,0	8	290,0 ± 22,64	265,0 - 315,0	5	281,7 ± 24,54	250,0 - 335,0	13
	M	319,0 ± 27,02	300,0 - 365,0	5	289,8 ± 34,28	250,0 - 335,0	5	304,4 ± 32,92	250,0 - 365,0	10
	Tot.	296,9 ± 35,22	250,0 - 365,0	14	289,9 ± 27,39	250,0 - 335,0	10	294,0 ± 31,74	250,0 - 365,0	24

Germano reale *Anas platyrhynchos*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo				
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.			n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n		
C.Max	0	253,5 ± 19,60	226,0 - 269,0	4			257,0 - 267,0			2	256,3 ± 16,12	226,0 - 269,0	6		
	F	265,2 ± 6,96	231,0 - 285,0	308	264,0 ± 7,37		227,0 - 283,0		262,0	1	264,5 ± 7,20	227,0 - 285,0	667		
	M	281,4 ± 7,27	245,0 - 302,0	365	279,6 ± 7,12		248,0 - 301,0		332	280,2 ± 10,43	265,0 - 290,0	5	280,5 ± 7,27	245,0 - 302,0	702
	Tot.	273,9 ± 10,94	226,0 - 302,0	677	271,5 ± 10,64		227,0 - 301,0		692	277,2 ± 11,92	262,0 - 290,0	6	272,7 ± 10,86	226,0 - 302,0	1375
3RM	0		139,0 - 158,0	2			166,0			1	154,3 ± 13,87	139,0 - 166,0	3		
	F	167,0 ± 6,31	143,0 - 182,5	104	166,4 ± 5,66		138,0 - 179,0		103		178,0	166,7 ± 6,03	138,0 - 182,5	208	
	M	178,4 ± 5,89	163,0 - 191,0	105	176,8 ± 6,27		159,0 - 192,0		93	183,0 ± 6,00	178,0 - 190,0	4	177,7 ± 6,14	159,0 - 192,0	202
	Tot.	172,5 ± 8,69	139,0 - 191,0	211	171,3 ± 7,89		138,0 - 192,0		197	182,0 ± 5,66	178,0 - 190,0	5	172,0 ± 8,37	138,0 - 192,0	413
Tarsio	0	48,1 ± 3,03	44,8 - 52,5	7	45,9 ± 3,32		41,8 - 51,0		5			47,2 ± 3,19	41,8 - 52,5	12	
	F	44,3 ± 1,70	40,5 - 50,0	199	43,7 ± 1,79		38,0 - 48,0		219			44,0 ± 1,78	38,0 - 50,0	418	
	M	46,1 ± 1,79	39,0 - 52,0	212	45,9 ± 1,51		42,1 - 51,0		203		48,0	46,0 ± 1,66	39,0 - 52,0	416	
	Tot.	45,3 ± 1,99	39,0 - 52,5	418	44,7 ± 2,01		38,0 - 51,0		427		48,0	45,0 ± 2,02	38,0 - 52,5	846	
Peso	0	1067,6 ± 110,01	840,0 - 1340,0	47	989,5 ± 154,93		680,0 - 1250,0		29			1037,8 ± 133,58	680,0 - 1340,0	76	
	F	989,4 ± 100,46	650,0 - 1300,0	570	949,6 ± 101,88		690,0 - 1270,0		460		1000,0 - 1140,0	971,8 ± 103,00	650,0 - 1300,0	1032	
	M	1110,5 ± 110,44	730,0 - 1470,0	716	1068,1 ± 114,16		740,0 - 1340,0		432	1118,2 ± 125,77	860,0 - 1260,0	14	1094,8 ± 113,79	730,0 - 1470,0	1162
	Tot.	1057,2 ± 121,55	650,0 - 1470,0	1333	1006,5 ± 124,20		680,0 - 1340,0		921	1112,2 ± 120,97	860,0 - 1260,0	16	1037,0 ± 125,23	650,0 - 1470,0	2270

Sparviere *Accipiter nisus*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo				
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.			n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n		
C.Max	0		240,0 - 244,0	2			205,0			1	229,7 ± 21,46	205,0 - 244,0	3		
	F	234,5 ± 11,27	200,0 - 250,0	15	235,1 ± 5,40		216,0 - 244,0		44	236,6 ± 2,70	234,0 - 240,0	5	235,1 ± 6,99	200,0 - 250,0	64
	M	199,2 ± 5,35	186,0 - 210,0	23	200,2 ± 6,08		185,0 - 225,0		77	199,5 ± 8,09	184,0 - 210,0	14	199,9 ± 6,17	184,0 - 225,0	114
	Tot.	214,6 ± 19,81	186,0 - 250,0	40	212,9 ± 17,79		185,0 - 244,0		122	209,3 ± 18,18	184,0 - 240,0	19	212,9 ± 18,24	184,0 - 250,0	181
3RM	0		142,0	1			144,0			1		142,0 - 144,0	2		
	F	166,1 ± 7,57	157,0 - 182,5	10	167,6 ± 6,96		149,5 - 182,0		30	170,2 ± 3,95	167,0 - 175,0	4	167,5 ± 6,85	149,5 - 182,5	44
	M	140,9 ± 4,86	131,0 - 148,0	21	143,3 ± 4,16		135,0 - 156,0		69	141,2 ± 4,85	134,0 - 150,0	12	142,6 ± 4,47	131,0 - 156,0	102
	Tot.	148,8 ± 13,11	131,0 - 182,5	32	150,6 ± 12,30		135,0 - 182,0		100	148,5 ± 13,73	134,0 - 175,0	16	150,0 ± 12,58	131,0 - 182,5	148
Tarsio	0														
	F	62,6 ± 2,15	59,0 - 65,0	6	62,2 ± 1,98		58,4 - 66,4		28	60,6 ± 1,27	59,1 - 61,4	3	62,1 ± 1,98	58,4 - 66,4	37
	M	54,5 ± 1,42	52,0 - 56,1	11	53,6 ± 2,38		47,5 - 58,5		31	53,2 ± 2,87	51,0 - 57,0	4	53,8 ± 2,22	47,5 - 58,5	46
	Tot.	57,4 ± 4,35	52,0 - 65,0	17	57,7 ± 4,84		47,5 - 66,4		59	56,4 ± 4,47	51,0 - 61,4	7	57,5 ± 4,68	47,5 - 66,4	83
Peso	0		165,0	1			135,0			1		135,0 - 165,0	2		
	F	242,1 ± 29,27	200,0 - 295,0	11	236,4 ± 18,14		195,0 - 272,0		32	252,2 ± 11,80	235,0 - 266,0	5	239,4 ± 20,89	195,0 - 295,0	48
	M	134,4 ± 10,91	114,0 - 150,0	26	133,1 ± 11,09		108,0 - 165,0		77	139,0 ± 10,93	122,0 - 151,3	13	134,1 ± 11,09	108,0 - 165,0	116
	Tot.	166,4 ± 52,32	114,0 - 295,0	38	163,2 ± 48,97		108,0 - 272,0		110	170,4 ± 53,29	122,0 - 266,0	18	164,7 ± 49,96	108,0 - 295,0	166

Poiana *Buteo buteo*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo				
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.			n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n		
C.Max	0	394,0 ± 18,76	360,0 - 421,0	10	388,3 ± 14,01		360,0 - 414,0		16		370,0 - 380,0	2	389,4 ± 15,92	360,0 - 421,0	28
	F				407,0 ± 6,08		400,0 - 411,0		3		394,0	1	403,8 ± 8,18	394,0 - 411,0	4
	M		362,0 - 387,0	2	384,2 ± 11,56		365,0 - 395,0		5				381,4 ± 12,79	362,0 - 395,0	7
	Tot.	390,8 ± 19,33	360,0 - 421,0	12	389,8 ± 14,25		360,0 - 414,0		24	381,3 ± 12,06	370,0 - 394,0	3	389,4 ± 15,64	360,0 - 421,0	39
3RM	0	278,2 ± 25,86	242,0 - 326,0	9	286,8 ± 15,80		269,0 - 312,0		5		270,0 - 270,0	2	279,8 ± 21,31	242,0 - 326,0	16
	F				279,7 ± 26,39		262,0 - 310,0		3				279,7 ± 26,39	262,0 - 310,0	3
	M	279,3 ± 28,99	247,0 - 303,0	3	285,4 ± 6,19		275,0 - 290,0		5		257,0	1	280,2 ± 17,71	247,0 - 303,0	9
	Tot.	278,5 ± 25,29	242,0 - 326,0	12	284,6 ± 14,85		262,0 - 312,0		13	265,7 ± 7,51	257,0 - 270,0	3	279,9 ± 19,92	242,0 - 326,0	28
Tarsio	0	79,6 ± 3,42	73,2 - 87,5	15	78,0 ± 2,99		69,5 - 82,8		25	82,1 ± 1,84	80,0 - 83,4	3	78,9 ± 3,24	69,5 - 87,5	43
	F				79,8 ± 1,52		77,8 - 81,5		4		79,5 - 82,0	2	80,1 ± 1,50	77,8 - 82,0	6
	M		73,8 - 74,0	2			74,2 - 80,3		2		75,7	1	75,6 ± 2,73	73,8 - 80,3	5
	Tot.	78,9 ± 3,72	73,2 - 87,5	17	78,2 ± 2,90		69,5 - 82,8		31	80,6 ± 2,85	75,7 - 83,4	6	78,7 ± 3,21	69,5 - 87,5	54
Peso	0	769,9 ± 143,21	580,0 - 1030,0	13	639,4 ± 74,28		540,0 - 735,0		5		860,0 - 968,0	2	751,7 ± 144,01	540,0 - 1030,0	20
	F						880,0 - 1100,0		2		980,0	1	986,7 ± 110,15	880,0 - 1100,0	3
	M	740,7 ± 136,24	600,0 - 872,0	3	670,4 ± 52,26		620,0 - 752,0		5			0	696,8 ± 90,48	600,0 - 872,0	8
	Tot.	764,4 ± 137,92	580,0 - 1030,0	16	710,8 ± 149,77		540,0 - 1100,0		12	936,0 ± 66,09	860,0 - 980,0	3	760,3 ± 148,68	540,0 - 1100,0	31

Fagiano di monte *Tetrao tetrix*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0												
	F		224,0	1	228,3 ± 4,13	224,0 - 235,0	6		222,0 - 223,0	2	226,6 ± 4,25	222,0 - 235,0	9
	M				252,9 ± 5,19	243,0 - 264,0	18	259,0 ± 4,83	251,0 - 266,0	19	256,0 ± 5,83	243,0 - 266,0	37
	Tot.		224,0	1	246,8 ± 11,90	224,0 - 264,0	24	255,5 ± 11,90	222,0 - 266,0	21	250,3 ± 13,04	222,0 - 266,0	46
3RM	0												
	F		157,0 - 157	1								157,0	1
	M				169,7 ± 2,55	166,0 - 173,0	9	178,0 ± 1,83	176,0 - 180,0	4	172,2 ± 4,60	166,0 - 180,0	13
	Tot.		157,0 - 157	1	169,7 ± 2,55	166,0 - 173,0	9	178,0 ± 1,83	176,0 - 180,0	4	171,1 ± 6,01	157,0 - 180,0	14
Tarsio	0												
	F												
	M					55,7	1					55,7 - 55,7	1
	Tot.					55,7	1					55,7 - 55,7	1
Peso	0												
	F		865,0 - 865	1	912,9 ± 86,35	800,0 - 1060,0	7		880,0 - 970,0	2	910,5 ± 75,51	800,0 - 1060,0	10
	M				1075,3 ± 106,11	680,0 - 1200,0	19	1226,0 ± 71,63	1080,0 - 1340,0	20	1152,6 ± 117,15	680,0 - 1340,0	39
	Tot.		865,0 - 865	1	1031,5 ± 123,67	680,0 - 1200,0	26	1198,6 ± 112,60	880,0 - 1340,0	22	1103,2 ± 147,14	680,0 - 1340,0	49

Quaglia comune *Coturnix coturnix*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	113,8 ± 2,59	110,0 - 117,0	5	110,9 ± 3,38	102,0 - 117,0	21	112,3 ± 1,53	111,0 - 114,0	3	111,5 ± 3,26	102,0 - 117,0	29
	F	110,5 ± 4,98	100,0 - 117,0	19	113,1 ± 2,64	105,0 - 120,0	186	113,2 ± 3,36	108,0 - 122,0	17	112,9 ± 3,03	100,0 - 122,0	222
	M	111,2 ± 2,95	100,0 - 122,0	165	111,1 ± 2,71	101,0 - 123,0	3038	111,6 ± 2,70	102,0 - 119,0	455	111,2 ± 2,73	100,0 - 123,0	3658
	Tot.	111,2 ± 3,22	100,0 - 122,0	189	111,2 ± 2,75	101,0 - 123,0	3245	111,7 ± 2,73	102,0 - 122,0	475	111,3 ± 2,78	100,0 - 123,0	3909
3RM	0	76,7 ± 2,39	73,0 - 79,0	5	76,5 ± 2,18	70,0 - 80,0	21	77,0 ± 1,41	76,0 - 78,0	2	76,5 ± 2,12	70,0 - 80,0	28
	F	76,4 ± 3,45	68,0 - 81,5	17	78,1 ± 2,43	71,5 - 91,0	186	78,5 ± 4,02	75,0 - 91,0	17	78,0 ± 2,70	68,0 - 91,0	220
	M	76,4 ± 2,84	67,0 - 87,5	165	76,7 ± 2,34	68,0 - 91,0	3017	77,0 ± 2,20	70,0 - 84,0	450	76,7 ± 2,35	67,0 - 91,0	3632
	Tot.	76,4 ± 2,88	67,0 - 87,5	187	76,8 ± 2,37	68,0 - 91,0	3224	77,0 ± 2,30	70,0 - 91,0	469	76,8 ± 2,39	67,0 - 91,0	3880
Tarsio	0				26,2 ± 1,50	24,2 - 27,7	5				26,2 ± 1,50	24,2 - 27,7	5
	F	27,3 ± 1,25	26,0 - 29,0	9	26,4 ± 1,19	23,7 - 28,5	61		26,9	1	26,6 ± 1,21	23,7 - 29,0	71
	M	27,1 ± 0,89	25,0 - 29,0	19	26,3 ± 1,09	23,2 - 29,0	486	26,4 ± 1,15	24,0 - 29,5	76	26,3 ± 1,10	23,2 - 29,5	581
	Tot.	27,2 ± 1,00	25,0 - 29,0	28	26,3 ± 1,10	23,2 - 29,0	552	26,4 ± 1,15	24,0 - 29,5	77	26,3 ± 1,12	23,2 - 29,5	657
Peso	0	94,6 ± 5,57	89,0 - 105,0	6	92,6 ± 9,44	76,0 - 107,0	22	90,7 ± 13,01	78,0 - 104,0	3	92,8 ± 8,94	76,0 - 107,0	31
	F	99,3 ± 11,62	81,0 - 120,0	18	92,7 ± 9,21	72,5 - 130,0	185	101,8 ± 13,20	83,0 - 130,0	17	93,9 ± 10,15	72,5 - 130,0	220
	M	92,5 ± 6,69	76,0 - 109,0	173	90,8 ± 6,96	68,0 - 118,0	3063	93,5 ± 6,65	77,0 - 113,0	459	91,2 ± 6,98	68,0 - 118,0	3695
	Tot.	93,2 ± 7,46	76,0 - 120,0	197	90,9 ± 7,14	68,0 - 130,0	3270	93,8 ± 7,17	77,0 - 130,0	479	91,4 ± 7,23	68,0 - 130,0	3946

Quaglia giapponese *Coturnix japonica*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0												
	F				114,0 ± 4,30	110,0 - 121,0	5				114,0 ± 4,30	110,0 - 121,0	5
	M	109,6 ± 2,97	106,0 - 113,0	5	111,0 ± 3,38	103,0 - 118,0	35	111,4 ± 2,61	108,0 - 114,0	5	110,9 ± 3,24	103,0 - 118,0	45
	Tot.	109,6 ± 2,97	106,0 - 113,0	5	111,4 ± 3,58	103,0 - 121,0	40	111,4 ± 2,61	108,0 - 114,0	5	111,2 ± 3,43	103,0 - 121,0	50
3RM	0												
	F				78,8 ± 4,65	75,0 - 84,0	3				78,8 ± 4,65	75,0 - 84,0	3
	M	75,3 ± 3,06	72,0 - 78,0	3	74,7 ± 2,63	69,0 - 79,0	26	73,5 ± 3,70	69,0 - 78,0	4	74,6 ± 2,73	69,0 - 79,0	33
	Tot.	75,3 ± 3,06	72,0 - 78,0	3	75,1 ± 3,06	69,0 - 84,0	29	73,5 ± 3,70	69,0 - 78,0	4	75,0 ± 3,08	69,0 - 84,0	36
Tarsio	0												
	F					27,2	1				27,2 ± #DIV/0!	27,2 - 27,2	1
	M					26,1 - 26,2	2		27,7	1	26,7 ± 0,90	26,1 - 27,7	3
	Tot.				26,5 ± 0,61	26,1 - 27,2	3		27,7	1	26,8 ± 0,78	26,1 - 27,7	4
Peso	0												
	F				96,0 ± 17,55	83,0 - 126,0	5				96,0 ± 17,55	83,0 - 126,0	5
	M	93,2 ± 8,04	80,0 - 106,0	16	98,2 ± 10,74	79,0 - 119,0	57	102,8 ± 9,31	92,0 - 113,0	5	97,5 ± 10,34	79,0 - 119,0	78
	Tot.	93,2 ± 8,04	80,0 - 106,0	16	98,1 ± 11,25	79,0 - 126,0	62	102,8 ± 9,31	92,0 - 113,0	5	97,4 ± 10,75	79,0 - 126,0	83

Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	174,7 ± 7,31	155,0 - 191,0	122	174,0 ± 6,48	156,0 - 192,0	206	176,1 ± 8,82	159,0 - 194,0	44	174,5 ± 7,08	155,0 - 194,0	372
	F	171,1 ± 5,87	161,0 - 185,0	30	170,3 ± 5,41	160,0 - 182,0	60	171,0 ± 4,30	167,0 - 177,0	5	170,6 ± 5,47	160,0 - 185,0	95
	M	182,7 ± 3,60	175,0 - 190,0	20	182,1 ± 3,86	174,0 - 188,0	17	183,7 ± 3,06	181,0 - 187,0	3	182,5 ± 3,62	174,0 - 190,0	40
	Tot.	175,0 ± 7,40	155,0 - 191,0	172	173,7 ± 6,65	156,0 - 192,0	283	176,0 ± 8,57	159,0 - 194,0	52	174,4 ± 7,15	155,0 - 194,0	507
3RM	0	123,9 ± 5,21	111,0 - 138,0	112	122,3 ± 5,01	110,0 - 134,0	190	123,8 ± 6,89	109,0 - 137,0	44	123,0 ± 5,38	109,0 - 138,0	346
	F	121,8 ± 5,72	111,0 - 135,0	31	121,4 ± 5,16	110,0 - 131,5	60	119,6 ± 3,65	116,0 - 124,0	5	121,4 ± 5,26	110,0 - 135,0	96
	M	130,2 ± 4,27	121,5 - 139,0	20	129,1 ± 5,19	118,0 - 136,5	17	127,7 ± 2,08	126,0 - 130,0	3	129,6 ± 4,55	118,0 - 139,0	40
	Tot.	124,3 ± 5,69	111,0 - 139,0	163	122,5 ± 5,34	110,0 - 136,5	267	123,6 ± 6,62	109,0 - 137,0	52	123,2 ± 5,65	109,0 - 139,0	482
Tarso	0	50,2 ± 3,31	44,2 - 58,8	111	50,3 ± 3,16	43,1 - 58,5	204	51,6 ± 3,66	44,0 - 58,0	37	50,4 ± 3,28	43,1 - 58,8	352
	F	49,9 ± 1,79	47,0 - 52,0	13	48,4 ± 2,23	42,9 - 54,0	59	49,6 ± 3,32	44,8 - 54,0	7	48,8 ± 2,33	42,9 - 54,0	79
	M	52,4 ± 1,86	49,3 - 55,0	8	51,8 ± 2,56	47,9 - 58,0	15		49,9	1	52,0 ± 2,30	47,9 - 58,0	24
	Tot.	50,3 ± 3,16	44,2 - 58,8	132	50,0 ± 3,07	42,9 - 58,5	278	51,2 ± 3,61	44,0 - 58,0	45	50,2 ± 3,17	42,9 - 58,8	455
Peso	0	303,5 ± 53,57	183,0 - 486,0	138	273,5 ± 56,71	129,0 - 463,0	299	293,0 ± 41,13	220,0 - 402,0	45	283,9 ± 56,13	129,0 - 486,0	482
	F	277,0 ± 38,87	170,0 - 340,0	32	259,1 ± 45,00	190,0 - 375,0	68	289,2 ± 40,67	230,0 - 370,0	9	266,9 ± 43,84	170,0 - 375,0	109
	M	322,4 ± 48,70	220,0 - 400,0	21	295,6 ± 35,30	255,0 - 385,0	17	291,0 ± 44,53	253,0 - 340,0	3	309,0 ± 44,47	220,0 - 400,0	41
	Tot.	301,1 ± 52,12	170,0 - 486,0	191	271,9 ± 54,45	129,0 - 463,0	384	292,3 ± 40,47	220,0 - 402,0	57	282,6 ± 54,27	129,0 - 486,0	632

Beccaccia *Scolopax rusticola*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	200,8 ± 4,07	192,0 - 210,0	17	200,6 ± 4,05	193,0 - 205,0	7	200,8 ± 3,97	192,0 - 210,0	24
	F									
	M									
	Tot.	200,8 ± 4,07	192,0 - 210,0	17	200,6 ± 4,05	193,0 - 205,0	7	200,8 ± 3,97	192,0 - 210,0	24
3RM	0	133,0 ± 3,72	127,0 - 141,0	14	133,2 ± 4,37	127,0 - 139,5	7	133,1 ± 3,83	127,0 - 141,0	21
	F									
	M									
	Tot.	133,0 ± 3,72	127,0 - 141,0	14	133,2 ± 4,37	127,0 - 139,5	7	133,1 ± 3,83	127,0 - 141,0	21
Tarso	0	37,6 ± 2,12	33,5 - 40,0	13	36,6 ± 2,06	34,9 - 39,5	4	37,3 ± 2,09	33,5 - 40,0	17
	F									
	M									
	Tot.	37,6 ± 2,12	33,5 - 40,0	13	36,6 ± 2,06	34,9 - 39,5	4	37,3 ± 2,09	33,5 - 40,0	17
Peso	0	301,4 ± 31,63	200,0 - 335,0	18	297,5 ± 22,61	270,0 - 335,0	7	300,3 ± 28,98	200,0 - 335,0	25
	F									
	M									
	Tot.	301,4 ± 31,63	200,0 - 335,0	18	297,5 ± 22,61	270,0 - 335,0	7	300,3 ± 28,98	200,0 - 335,0	25

Colombaccio *Columba palumbus*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	247,9 ± 6,72	236,0 - 262,0	16	238,6 ± 4,26	230,0 - 249,0	21	242,7 ± 7,12	230,0 - 262,0	37
	F	244,0 ± 3,61	240,0 - 247,0	3				244,0 ± 3,61	240,0 - 247,0	3
	M		238,0	1					238,0 - 238	1
	Tot.	246,8 ± 6,59	236,0 - 262,0	20	238,6 ± 4,26	230,0 - 249,0	21	242,6 ± 6,85	230,0 - 262,0	41
3RM	0	179,2 ± 5,04	170,0 - 188,0	16	167,9 ± 2,94	162,0 - 173,0	20	172,9 ± 6,96	162,0 - 188,0	36
	F	171,0 ± 5,57	166,0 - 177,0	3				171,0 ± 5,57	166,0 - 177,0	3
	M		171,0 - 171	1					171,0 - 171	1
	Tot.	177,6 ± 5,90	166,0 - 188,0	20	167,9 ± 2,94	162,0 - 173,0	20	172,7 ± 6,74	162,0 - 188,0	40
Tarso	0	29,5 ± 0,06	29,4 - 29,5	3		33,2	1	30,4 ± 1,87	29,4 - 33,2	4
	F									
	M									
	Tot.	29,5 ± 0,06	29,4 - 29,5	3		33,2	1	30,4 ± 1,87	29,4 - 33,2	4
Peso	0	478,8 ± 57,62	406,0 - 665,0	17	415,1 ± 48,80	325,0 - 496,0	21	443,6 ± 61,24	325,0 - 665,0	38
	F	452,0 ± 40,71	405,0 - 476,0	3				452,0 ± 40,71	405,0 - 476,0	3
	M		495,0 - 495	1					495,0 - 495	1
	Tot.	475,7 ± 54,16	405,0 - 665,0	21	415,1 ± 48,80	325,0 - 496,0	21	445,4 ± 59,43	325,0 - 665,0	42

Tortora dal collare *Streptopelia decaocto*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	181,6 ± 4,40	174,0 - 190,0	30	178,2 ± 5,79	170,0 - 185,0	11				180,7 ± 4,98	170,0 - 190,0	41
	F		178,0	1								178,0	1
	M		168,0 - 189,0	2					191,0	1	182,7 ± 12,74	168,0 - 191,0	3
	Tot.	181,3 ± 5,04	168,0 - 190,0	33	178,2 ± 5,79	170,0 - 185,0	11		191,0	1	180,8 ± 5,51	168,0 - 191,0	45
3RM	0	130,7 ± 4,28	122,0 - 140,0	28	129,5 ± 3,39	124,0 - 134,0	6			0	130,5 ± 4,12	122,0 - 140,0	34
	F		127,0 - 132,0	2						0		127,0 - 132,0	2
	M		124,0 - 140,0	2					135,0	1	133,0 ± 8,19	124,0 - 140,0	3
	Tot.	130,7 ± 4,55	122,0 - 140,0	32	129,5 ± 3,39	124,0 - 134,0	6		135,0 - 135	1	130,7 ± 4,37	122,0 - 140,0	39
Tarso	0	25,7 ± 0,40	25,0 - 26,0	11		23,2	1			0	25,5 ± 0,82	23,2 - 26,0	12
	F									0			
	M								26,6 - 26,6	1		26,6	1
	Tot.	25,7 ± 0,40	25,0 - 26,0	11		23,2	1		26,6 - 26,6	1	25,6 ± 0,84	23,2 - 26,6	13
Peso	0	190,3 ± 16,55	134,0 - 218,0	36	173,2 ± 22,42	130,0 - 203,0	12		197,0 - 198,0	2	186,5 ± 19,16	130,0 - 218,0	50
	F		160,0 - 191,0	2								160,0 - 191,0	2
	M		180,0 - 187,0	2					215,0	1	194,0 ± 18,52	180,0 - 215,0	3
	Tot.	189,2 ± 16,47	134,0 - 218,0	40	173,2 ± 22,42	130,0 - 203,0	12	203,3 ± 10,12	197,0 - 215,0	3	186,5 ± 19,03	130,0 - 218,0	55

Tortora *Streptopelia turtur*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	176,2 ± 5,30	166,0 - 185,0	41	169,4 ± 5,33	162,0 - 182,0	24				173,7 ± 6,24	162,0 - 185,0	65
	F	175,8 ± 3,58	171,0 - 181,0	8					175,0 - 180,0	2	176,1 ± 3,45	171,0 - 181,0	10
	M	177,7 ± 3,77	171,0 - 183,0	10		166,0 - 175,0	2		177,0	1	176,5 ± 4,61	166,0 - 183,0	13
	Tot.	176,4 ± 4,85	166,0 - 185,0	59	169,5 ± 5,28	162,0 - 182,0	26	177,3 ± 2,52	175,0 - 180,0	3	174,4 ± 5,85	162,0 - 185,0	88
3RM	0	125,6 ± 3,44	120,0 - 133,0	31	122,1 ± 4,68	114,0 - 131,0	23				124,1 ± 4,35	114,0 - 133,0	54
	F	124,2 ± 2,05	122,0 - 127,0	8					125,0 - 130,0	2	124,9 ± 2,56	122,0 - 130,0	10
	M	127,1 ± 3,62	122,0 - 135,0	11		120,0 - 125,0	2		129,0	1	126,6 ± 3,78	120,0 - 135,0	14
	Tot.	125,8 ± 3,37	120,0 - 135,0	50	122,1 ± 4,54	114,0 - 131,0	25	128,0 ± 2,65	125,0 - 130,0	3	124,7 ± 4,14	114,0 - 135,0	78
Tarso	0	22,9 ± 1,41	21,0 - 25,2	26	23,4 ± 1,22	21,4 - 25,5	17				23,1 ± 1,34	21,0 - 25,5	43
	F		21,8 - 23,5	2					23,0 - 23,7	2	23,0 ± 0,85	21,8 - 23,7	4
	M	21,8 ± 1,04	21,0 - 23,0	3					23,5	1	22,2 ± 1,19	21,0 - 23,5	4
	Tot.	22,8 ± 1,37	21,0 - 25,2	31	23,4 ± 1,22	21,4 - 25,5	17	23,4 ± 0,36	23,0 - 23,7	3	23,0 ± 1,30	21,0 - 25,5	51
Peso	0	142,1 ± 15,95	116,0 - 191,0	41	125,4 ± 23,37	84,0 - 194,0	31				134,9 ± 21,04	84,0 - 194,0	72
	F	133,6 ± 7,57	120,0 - 144,0	7					141,1 - 146,0	2	135,8 ± 7,99	120,0 - 146,0	9
	M	143,0 ± 15,58	120,0 - 169,0	11		136,0 - 153,0	2		144,0	1	143,3 ± 14,08	120,0 - 169,0	14
	Tot.	141,2 ± 15,21	116,0 - 191,0	59	126,6 ± 23,19	84,0 - 194,0	33	143,7 ± 2,46	141,1 - 146,0	3	136,2 ± 19,39	84,0 - 194,0	95

Cuculo *Cuculus canorus*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0		211,0	1	200,5 ± 10,71	187,0 - 219,0	15				201,1 ± 10,68	187,0 - 219,0	16
	F	210,0 ± 6,32	200,0 - 218,0	6	212,5 ± 10,29	199,0 - 227,0	6				211,2 ± 8,25	199,0 - 227,0	12
	M	222,3 ± 4,73	217,0 - 226,0	3	218,0 ± 8,72	212,0 - 228,0	3		221,0	1	220,3 ± 6,13	212,0 - 228,0	7
	Tot.	213,8 ± 7,87	200,0 - 226,0	10	205,7 ± 12,21	187,0 - 228,0	24		221,0	1	208,4 ± 11,65	187,0 - 228,0	35
3RM	0		172,0	1	158,2 ± 7,12	148,0 - 169,0	14				159,1 ± 7,73	148,0 - 172,0	15
	F	167,7 ± 6,59	160,0 - 177,0	6	172,1 ± 2,46	168,5 - 174,0	4				169,4 ± 5,61	160,0 - 177,0	10
	M		175,0 - 175,0	2		173,0 - 173,0	2		179,0 - 79	1	175,0 ± 2,45	173,0 - 179,0	5
	Tot.	169,8 ± 6,16	160,0 - 177,0	9	162,5 ± 8,96	148,0 - 174,0	20		179,0 - 79	1	165,2 ± 9,01	148,0 - 179,0	30
Tarso	0		19,4 - 21,3	2	21,7 ± 1,12	19,8 - 23,0	9				21,4 ± 1,21	19,4 - 23,0	11
	F		20,0 - 21,5	2	22,9 ± 2,65	20,0 - 25,2	3				22,0 ± 2,28	20,0 - 25,2	5
	M	22,5 ± 2,41	20,2 - 25,0	3		22,0	1		22,0 - 22	1	22,3 ± 1,72	20,2 - 25,0	5
	Tot.	21,4 ± 1,87	19,4 - 25,0	7	22,0 ± 1,52	19,8 - 25,2	13		22,0 - 22	1	21,8 ± 1,59	19,4 - 25,2	21
Peso	0	93,0 ± 13,92	77,0 - 102,0	3	86,4 ± 9,19	71,0 - 102,0	16				87,4 ± 9,90	71,0 - 102,0	19
	F	99,1 ± 10,78	86,0 - 116,0	7	96,1 ± 12,54	82,0 - 116,8	6				97,8 ± 11,23	82,0 - 116,8	13
	M	122,3 ± 7,02	115,0 - 129,0	3	113,7 ± 9,81	108,0 - 125,0	3		119,0 - 119	1	118,1 ± 8,21	108,0 - 129,0	7
	Tot.	103,1 ± 15,02	77,0 - 129,0	13	92,0 ± 13,33	71,0 - 125,0	25		119,0 - 119	1	96,4 ± 15,00	71,0 - 129,0	39

Civetta Athene noctua

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	161,5 ± 3,80	155,0 - 169,0	14	160,3 ± 4,21	154,5 - 168,0	22	160,3 ± 2,52	158,0 - 163,0	3	160,7 ± 3,93	154,5 - 169,0	39
	F		167,0	1							167,0	1	
	M	157,2 ± 1,71	155,0 - 159,0	4							157,2 ± 1,71	155,0 - 159,0	4
	Tot.	160,9 ± 4,03	155,0 - 169,0	19	160,3 ± 4,21	154,5 - 168,0	22	160,3 ± 2,52	158,0 - 163,0	3	160,6 ± 3,98	154,5 - 169,0	44
3RM	0	114,8 ± 4,65	109,0 - 122,0	8	117,5 ± 5,18	110,0 - 124,5	6				115,9 ± 4,89	109,0 - 124,5	14
	F		114,0 - 115,0	2							114,0 - 115,0	2	
	M	109,2 ± 2,63	107,0 - 113,0	4							109,2 ± 2,63	107,0 - 113,0	4
	Tot.	113,1 ± 4,45	107,0 - 122,0	14	117,5 ± 5,18	110,0 - 124,5	6				114,5 ± 4,98	107,0 - 124,5	20
Tarso	0	34,5 ± 1,19	32,7 - 36,0	9	34,3 ± 1,15	32,6 - 36,5	26				34,3 ± 1,15	32,6 - 36,5	35
	F		32,5	1							32,5	1	
	M		35,0 - 35,0	2		33,7	1				34,6 ± 0,75	33,7 - 35,0	3
	Tot.	34,4 ± 1,19	32,5 - 36,0	12	34,3 ± 1,14	32,6 - 36,5	27				34,3 ± 1,14	32,5 - 36,5	39
Peso	0	157,4 ± 18,82	117,0 - 176,0	8	152,6 ± 20,24	121,0 - 186,0	11				154,6 ± 19,27	117,0 - 186,0	19
	F		138,0 - 160,0	2							138,0 - 160,0	2	
	M	143,2 ± 14,68	125,0 - 160,0	4							143,2 ± 14,68	125,0 - 160,0	4
	Tot.	152,1 ± 17,37	117,0 - 176,0	14	152,6 ± 20,24	121,0 - 186,0	11				152,4 ± 18,28	117,0 - 186,0	25

Allocco Strix aluco

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	272,9 ± 9,45	257,0 - 291,0	25	271,4 ± 7,25	261,0 - 285,0	17				272,3 ± 8,57	257,0 - 291,0	42
	F	276,1 ± 6,57	265,0 - 290,0	17	279,3 ± 7,54	271,0 - 290,0	7	279,7 ± 8,39	270,0 - 285,0	3	277,3 ± 6,91	265,0 - 290,0	27
	M	265,0 ± 7,07	255,0 - 270,0	4		258,0 - 265,0	2		259,0 - 262,0	2	263,0 ± 5,50	255,0 - 270,0	8
	Tot.	273,4 ± 8,69	255,0 - 291,0	46	272,7 ± 8,46	258,0 - 290,0	26	272,0 ± 12,10	259,0 - 285,0	5	273,1 ± 8,73	255,0 - 291,0	77
3RM	0	197,2 ± 7,96	181,0 - 210,0	22	197,1 ± 6,56	185,0 - 204,0	8				197,2 ± 7,50	181,0 - 210,0	30
	F	196,7 ± 7,68	180,0 - 210,0	16	201,5 ± 3,11	198,0 - 205,0	4	200,6 ± 5,31	196,5 - 208,0	4	198,1 ± 6,93	180,0 - 210,0	24
	M	184,5 ± 10,38	170,0 - 192,0	4		192,0	1		176,0 - 192,0	2	185,4 ± 9,14	170,0 - 192,0	7
	Tot.	195,8 ± 8,70	170,0 - 210,0	42	198,1 ± 5,92	185,0 - 205,0	13	195,1 ± 10,78	176,0 - 208,0	6	196,2 ± 8,33	170,0 - 210,0	61
Tarso	0	49,6 ± 3,86	47,0 - 54,0	3	48,5 ± 2,98	44,4 - 52,5	18				48,7 ± 3,03	44,4 - 54,0	21
	F	45,7 ± 0,75	45,0 - 46,5	3	50,7 ± 2,43	47,9 - 52,2	3		53,0	1	48,9 ± 3,42	45,0 - 53,0	7
	M		44,0	1					47,9	1	44,0 - 47,9	2	
	Tot.	47,1 ± 3,28	44,0 - 54,0	7	48,8 ± 2,96	44,4 - 52,5	21		47,9 - 53,0	2	48,5 ± 3,08	44,0 - 54,0	30
Peso	0	430,1 ± 56,00	350,0 - 585,0	22	432,9 ± 34,14	375,0 - 485,0	12				431,1 ± 48,84	350,0 - 585,0	34
	F	490,3 ± 55,68	385,0 - 615,0	13	491,9 ± 44,05	430,0 - 540,0	7	510,8 ± 63,57	439,0 - 580,0	4	494,1 ± 52,05	385,0 - 615,0	24
	M	411,2 ± 36,02	375,0 - 447,0	4		370,0 - 400,0	2		345,0 - 382,0	2	392,8 ± 34,28	345,0 - 447,0	8
	Tot.	448,2 ± 61,26	350,0 - 615,0	39	448,0 ± 49,52	370,0 - 540,0	21	461,7 ± 91,34	345,0 - 580,0	6	449,4 ± 60,05	345,0 - 615,0	66

Gufo comune Asio otus

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	301,1 ± 6,07	294,0 - 316,0	14	294,1 ± 6,69	285,0 - 305,0	8				298,5 ± 7,03	285,0 - 316,0	22
	F	300,4 ± 7,83	281,0 - 316,0	27	305,0 ± 6,13	300,0 - 317,0	6		287,0 - 301,0	2	300,9 ± 7,82	281,0 - 317,0	35
	M	291,6 ± 8,25	277,0 - 313,0	28	292,8 ± 12,07	280,0 - 308,0	5	292,7 ± 11,24	283,0 - 305,0	3	291,9 ± 8,75	277,0 - 313,0	36
	Tot.	297,0 ± 8,80	277,0 - 316,0	69	297,2 ± 9,49	280,0 - 317,0	19	293,2 ± 9,39	283,0 - 305,0	5	296,8 ± 8,91	277,0 - 317,0	93
3RM	0	227,5 ± 3,39	222,0 - 233,0	13	221,7 ± 5,32	211,0 - 225,0	6				225,6 ± 4,81	211,0 - 233,0	19
	F	227,3 ± 5,70	218,0 - 238,0	38	224,2 ± 7,04	214,0 - 230,0	4		228,0 - 229,0	2	227,1 ± 5,69	214,0 - 238,0	44
	M	222,7 ± 5,13	212,0 - 234,0	31	221,5 ± 7,05	217,0 - 232,0	4		213,0 - 227,0	2	222,4 ± 5,41	212,0 - 234,0	37
	Tot.	225,6 ± 5,62	212,0 - 238,0	82	222,4 ± 5,94	211,0 - 232,0	14	224,2 ± 7,54	213,0 - 229,0	4	225,1 ± 5,78	211,0 - 238,0	100
Tarso	0	40,7 ± 2,48	38,0 - 43,1	5	39,6 ± 1,12	38,6 - 41,0	4				40,2 ± 1,97	38,0 - 43,1	9
	F	39,9 ± 2,04	37,5 - 43,6	9		39,2	1				39,8 ± 1,94	37,5 - 43,6	10
	M	38,5 ± 1,04	37,0 - 39,9	5		41,6 - 43,0	2		39,6 - 40,8	2	39,7 ± 1,83	37,0 - 43,0	9
	Tot.	39,7 ± 2,03	37,0 - 43,6	19	40,3 ± 1,63	38,6 - 43,0	7		39,6 - 40,8	2	39,9 ± 1,85	37,0 - 43,6	28
Peso	0	269,3 ± 26,58	238,0 - 325,0	13	250,7 ± 39,45	200,0 - 302,0	6				263,4 ± 31,35	200,0 - 325,0	19
	F	266,8 ± 31,85	202,0 - 350,0	49	267,0 ± 14,93	250,0 - 278,0	3		268,5 - 310,0	2	267,7 ± 31,01	202,0 - 350,0	54
	M	244,4 ± 22,94	208,0 - 310,0	40	219,2 ± 16,45	195,0 - 240,0	5		212,3 - 232,0	2	240,8 ± 23,47	195,0 - 310,0	47
	Tot.	258,4 ± 29,94	202,0 - 350,0	102	242,9 ± 33,08	195,0 - 302,0	14	255,7 ± 43,04	212,3 - 310,0	4	256,5 ± 30,85	195,0 - 350,0	120

Succiacapre *Caprimulgus europaeus*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.			n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	185,0 - 191,0	2	181,4 ± 6,24	171,0 - 193,0		21				182,0 ± 6,31	171,0 - 193,0	23
	F	189,3 ± 5,36	178,0 - 198,0	20	190,2 ± 2,17	187,0 - 193,0	5	195,7 ± 6,51	189,0 - 202,0	3	190,1 ± 5,29	178,0 - 202,0	28
	M	191,1 ± 5,01	175,0 - 195,0	15	186,6 ± 6,40	176,0 - 198,0	15	195,4 ± 6,15	190,0 - 205,0	5	189,8 ± 6,44	175,0 - 205,0	35
	Tot.	189,9 ± 5,14	175,0 - 198,0	37	184,4 ± 6,70	171,0 - 198,0	41	195,5 ± 5,81	189,0 - 205,0	8	187,8 ± 6,95	171,0 - 205,0	86
3RM	0	134,0 - 140,0	2	131,5 ± 5,31	124,0 - 142,0		21				132,0 ± 5,38	124,0 - 142,0	23
	F	137,4 ± 3,92	131,5 - 143,0	20	137,2 ± 5,25	127,0 - 142,0	6	142,0 ± 6,56	136,0 - 149,0	3	137,9 ± 4,52	127,0 - 149,0	29
	M	139,8 ± 4,15	129,0 - 145,0	15	137,5 ± 4,09	130,0 - 144,0	14	145,0 ± 4,69	137,0 - 149,0	5	139,6 ± 4,78	129,0 - 149,0	34
	Tot.	138,4 ± 4,09	129,0 - 145,0	37	134,4 ± 5,65	124,0 - 144,0	41	143,9 ± 5,22	136,0 - 149,0	8	137,0 ± 5,74	124,0 - 149,0	86
Tarsolo	0	19,0	1	16,2 ± 1,06	15,0 - 18,5		16				16,4 ± 1,23	15,0 - 19,0	17
	F	17,6 ± 1,10	16,0 - 19,5	14	17,0 ± 0,00	17,0 - 17,0	3		17,0 - 18,5	2	17,6 ± 1,00	16,0 - 19,5	19
	M	17,2 ± 0,84	16,0 - 18,0	5	16,5 ± 1,22	15,0 - 19,0	12		16,5 - 16,5	2	16,7 ± 1,07	15,0 - 19,0	19
	Tot.	17,6 ± 1,06	16,0 - 19,5	20	16,4 ± 1,08	15,0 - 19,0	31	17,1 ± 0,95	16,5 - 18,5	4	16,9 ± 1,20	15,0 - 19,5	55
Peso	0	60,0 - 70,0	2	59,9 ± 8,09	44,0 - 80,0		23				60,3 ± 8,01	44,0 - 80,0	25
	F	70,1 ± 9,22	57,0 - 92,0	18	66,2 ± 6,05	58,0 - 76,0	6	75,0 ± 3,00	72,0 - 78,0	3	69,8 ± 8,34	57,0 - 92,0	27
	M	66,1 ± 10,03	56,0 - 91,0	15	62,5 ± 6,68	50,0 - 74,0	14	70,6 ± 9,58	60,0 - 85,0	5	65,3 ± 8,90	50,0 - 91,0	34
	Tot.	68,1 ± 9,47	56,0 - 92,0	35	61,6 ± 7,57	44,0 - 80,0	43	72,2 ± 7,76	60,0 - 85,0	8	65,2 ± 9,16	44,0 - 92,0	86

Rondone comune *Apus apus*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.			n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	176,3 ± 4,46	168,0 - 190,0	21	170,3 ± 5,86	162,0 - 181,0	11	177,2 ± 1,64	176,0 - 180,0	5	174,6 ± 5,42	162,0 - 190,0	37
	F							176,3 ± 3,14	172,0 - 181,0	6	176,3 ± 3,14	172,0 - 181,0	6
	M							177,1 ± 2,54	173,0 - 181,0	7	177,1 ± 2,54	173,0 - 181,0	7
	Tot.	176,3 ± 4,46	168,0 - 190,0	21	170,3 ± 5,86	162,0 - 181,0	11	176,9 ± 2,45	172,0 - 181,0	18	175,2 ± 4,93	162,0 - 190,0	50
3RM	0	129,0 ± 4,71	123,5 - 136,0	13	127,4 ± 4,93	122,5 - 138,0	9	128,8 ± 2,50	126,0 - 132,0	4	128,4 ± 4,44	122,5 - 138,0	26
	F							128,2 ± 2,14	126,0 - 131,0	6	128,2 ± 2,14	126,0 - 131,0	6
	M							128,8 ± 2,55	124,0 - 132,0	8	128,8 ± 2,55	124,0 - 132,0	8
	Tot.	129,0 ± 4,71	123,5 - 136,0	13	127,4 ± 4,93	122,5 - 138,0	9	128,6 ± 2,28	124,0 - 132,0	18	128,5 ± 3,80	122,5 - 138,0	40
Tarsolo	0	11,6 ± 0,80	11,0 - 12,7	4	11,4 ± 0,98	10,0 - 13,0	8				11,5 ± 0,89	10,0 - 13,0	12
	F												
	M												
	Tot.	11,6 ± 0,80	11,0 - 12,7	4	11,4 ± 0,98	10,0 - 13,0	8				11,5 ± 0,89	10,0 - 13,0	12
Peso	0	41,3 ± 3,90	34,0 - 49,5	19	34,4 ± 3,80	30,0 - 44,0	13		41,8	1	38,6 ± 5,08	30,0 - 49,5	33
	F												
	M												
	Tot.	41,3 ± 3,90	34,0 - 49,5	19	34,4 ± 3,80	30,0 - 44,0	13		41,8	1	38,6 ± 5,08	30,0 - 49,5	33

Rondone pallido *Apus pallidus*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.			n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	174,7 ± 3,55	166,0 - 183,0	93		166,5	1	174,6 ± 3,63	166,0 - 183,0	94
	F	173,9 ± 3,03	170,0 - 180,0	15				173,9 ± 3,03	170,0 - 180,0	15
	M	176,3 ± 4,01	171,0 - 183,0	13				176,3 ± 4,01	171,0 - 183,0	13
	Tot.	174,8 ± 3,56	166,0 - 183,0	121		166,5	1	174,7 ± 3,63	166,0 - 183,0	122
3RM	0	124,8 ± 3,30	117,0 - 132,0	74		125,5 - 125,5	1	124,8 ± 3,28	117,0 - 132,0	75
	F	125,0 ± 2,61	121,0 - 128,0	6				125,0 ± 2,61	121,0 - 128,0	6
	M	130,7 ± 2,08	129,0 - 133,0	3				130,7 ± 2,08	129,0 - 133,0	3
	Tot.	125,1 ± 3,38	117,0 - 133,0	83		125,5 - 125,5	1	125,1 ± 3,36	117,0 - 133,0	84
Tarsolo	0		15,0	1		11,3 - 12,2	2	12,8 ± 1,93	11,3 - 15,0	3
	F									
	M									
	Tot.		15,0	1		11,3 - 12,2	2	12,8 ± 1,93	11,3 - 15,0	3
Peso	0	39,9 ± 3,29	33,8 - 47,0	119	44,6 ± 6,91	28,0 - 62,0	82	41,8 ± 5,57	28,0 - 62,0	201
	F	38,6 ± 2,81	34,2 - 46,2	19				38,6 ± 2,81	34,2 - 46,2	19
	M	39,2 ± 2,20	35,5 - 43,1	15				39,2 ± 2,20	35,5 - 43,1	15
	Tot.	39,7 ± 3,16	33,8 - 47,0	153	44,6 ± 6,91	28,0 - 62,0	82	41,4 ± 5,34	28,0 - 62,0	235

Martin pescatore *Alcedo atthis*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	76,9 ± 2,50	73,0 - 80,0	13	76,3 ± 2,27	71,0 - 83,5	231				76,4 ± 2,28	71,0 - 83,5	244
	F	76,7 ± 2,11	71,0 - 81,0	41	77,1 ± 2,46	72,0 - 81,0	60	77,2 ± 2,09	73,0 - 79,0	9	77,0 ± 2,30	71,0 - 81,0	110
	M	76,0 ± 1,90	73,0 - 81,0	38	77,0 ± 1,91	73,0 - 81,0	37	76,9 ± 1,78	75,0 - 80,5	8	76,6 ± 1,94	73,0 - 81,0	83
	Tot.	76,5 ± 2,01	71,0 - 81,0	92	76,6 ± 2,29	71,0 - 83,5	328	77,1 ± 1,90	73,0 - 80,5	17	76,6 ± 2,23	71,0 - 83,5	437
3RM	0	54,1 ± 1,47	52,0 - 56,0	8	53,9 ± 1,21	51,0 - 57,0	220				53,9 ± 1,21	51,0 - 57,0	228
	F	53,8 ± 1,34	52,0 - 57,0	40	54,2 ± 1,29	52,0 - 57,0	52	55,1 ± 1,64	53,0 - 57,0	9	54,1 ± 1,38	52,0 - 57,0	101
	M	53,6 ± 1,29	51,0 - 58,0	35	54,1 ± 1,62	50,5 - 58,0	37	53,7 ± 1,32	52,5 - 56,5	7	53,9 ± 1,46	50,5 - 58,0	79
	Tot.	53,7 ± 1,32	51,0 - 58,0	83	54,0 ± 1,28	50,5 - 58,0	309	54,5 ± 1,62	52,5 - 57,0	16	53,9 ± 1,31	50,5 - 58,0	408
Tarso	0	10,6 ± 0,70	9,8 - 11,5	9	10,9 ± 0,92	9,5 - 13,1	138				10,9 ± 0,91	9,5 - 13,1	147
	F	11,0 ± 0,87	10,0 - 13,0	20	10,8 ± 0,82	10,0 - 13,0	38		10,8	1	10,9 ± 0,83	10,0 - 13,0	59
	M	10,8 ± 0,91	9,7 - 12,7	22	11,2 ± 1,05	10,0 - 13,1	17	11,1 ± 1,31	10,0 - 13,0	4	11,0 ± 0,99	9,7 - 13,1	43
	Tot.	10,8 ± 0,86	9,7 - 13,0	51	10,9 ± 0,92	9,5 - 13,1	193	11,1 ± 1,15	10,0 - 13,0	5	10,9 ± 0,91	9,5 - 13,1	249
Peso	0	34,7 ± 3,55	26,4 - 40,0	11	32,4 ± 2,43	26,5 - 39,3	228				32,5 ± 2,53	26,4 - 40,0	239
	F	37,0 ± 3,22	32,0 - 44,7	40	33,9 ± 3,48	28,5 - 41,8	60	38,6 ± 3,28	33,7 - 43,0	9	35,4 ± 3,77	28,5 - 44,7	109
	M	34,4 ± 2,29	30,5 - 38,6	38	34,2 ± 2,83	29,5 - 42,2	37	35,9 ± 1,34	34,0 - 38,0	7	34,4 ± 2,51	29,5 - 42,2	82
	Tot.	35,6 ± 3,15	26,4 - 44,7	89	32,9 ± 2,80	26,5 - 42,2	325	37,4 ± 2,89	33,7 - 43,0	16	33,6 ± 3,17	26,4 - 44,7	430

Gruccione *Merops apiaster*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	149,0 ± 4,30	136,0 - 159,0	170	137,9 ± 6,01	125,0 - 151,0	133		151,0	1	144,1 ± 7,51	125,0 - 159,0	304
	F	146,0 ± 3,57	137,0 - 154,0	103	146,0 ± 3,08	140,0 - 155,0	91	147,6 ± 2,33	142,0 - 152,0	42	146,3 ± 3,24	137,0 - 155,0	236
	M	150,9 ± 3,13	141,0 - 158,0	103	150,8 ± 3,06	138,0 - 157,0	68	151,9 ± 2,77	145,0 - 157,0	76	151,2 ± 3,03	138,0 - 158,0	247
	Tot.	148,7 ± 4,23	136,0 - 159,0	376	143,4 ± 7,09	125,0 - 157,0	292	150,4 ± 3,32	142,0 - 157,0	119	147,0 ± 6,05	125,0 - 159,0	787
3RM	0	111,1 ± 3,83	100,0 - 123,0	170	101,1 ± 4,94	91,0 - 117,0	133		117,0 - 117	1	106,8 ± 6,62	91,0 - 123,0	304
	F	109,7 ± 2,99	103,0 - 117,0	100	110,0 ± 2,77	103,0 - 117,0	91	109,5 ± 2,67	101,0 - 114,0	42	109,8 ± 2,85	101,0 - 117,0	233
	M	112,4 ± 2,77	104,0 - 118,0	103	112,8 ± 2,60	105,0 - 117,0	67	113,3 ± 2,54	102,0 - 119,0	76	112,8 ± 2,67	102,0 - 119,0	246
	Tot.	111,1 ± 3,49	100,0 - 123,0	373	106,6 ± 6,43	91,0 - 117,0	291	112,0 ± 3,17	101,0 - 119,0	119	109,6 ± 5,29	91,0 - 123,0	783
Tarso	0	14,0 ± 1,05	11,9 - 16,5	135	13,8 ± 0,86	12,0 - 16,0	131		13,0 - 13	1	13,9 ± 0,96	11,9 - 16,5	267
	F	13,2 ± 0,75	12,0 - 15,0	93	13,3 ± 0,74	12,0 - 15,0	86	13,8 ± 0,93	11,5 - 16,0	36	13,4 ± 0,81	11,5 - 16,0	215
	M	13,5 ± 0,79	12,0 - 15,0	101	13,4 ± 0,72	11,6 - 16,0	66	13,8 ± 0,95	12,0 - 16,0	74	13,6 ± 0,84	11,6 - 16,0	241
	Tot.	13,6 ± 0,95	11,9 - 16,5	329	13,6 ± 0,83	11,6 - 16,0	283	13,8 ± 0,94	11,5 - 16,0	111	13,6 ± 0,90	11,5 - 16,5	723
Peso	0	55,5 ± 4,14	47,0 - 70,0	168	51,1 ± 3,54	41,0 - 61,0	134		54,0 - 54	1	53,5 ± 4,44	41,0 - 70,0	303
	F	53,5 ± 5,51	44,0 - 68,0	102	56,3 ± 6,26	44,0 - 71,0	91	54,6 ± 4,32	44,0 - 63,0	42	54,8 ± 5,75	44,0 - 71,0	235
	M	53,0 ± 3,26	45,0 - 64,0	103	54,1 ± 3,72	47,0 - 64,0	68	53,5 ± 3,32	43,0 - 62,0	76	53,4 ± 3,43	43,0 - 64,0	247
	Tot.	54,2 ± 4,49	44,0 - 70,0	373	53,4 ± 5,11	41,0 - 71,0	293	53,9 ± 3,72	43,0 - 63,0	119	53,9 ± 4,64	41,0 - 71,0	785

Upupa *Upupa epops*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	144,7 ± 4,90	134,0 - 152,0	26	142,8 ± 5,20	136,0 - 151,0	8				144,2 ± 4,96	134,0 - 152,0	34
	F	146,3 ± 7,23	138,0 - 151,0	3					141,0	1	145,0 ± 6,48	138,0 - 151,0	4
	M	147,7 ± 0,58	147,0 - 148,0	3					153,0	1	149,0 ± 2,71	147,0 - 153,0	4
	Tot.	145,1 ± 4,86	134,0 - 152,0	32	142,8 ± 5,20	136,0 - 151,0	8		141,0 - 153,0	2	144,8 ± 5,04	134,0 - 153,0	42
3RM	0	109,9 ± 4,70	101,0 - 117,0	23	109,4 ± 4,78	102,0 - 116,0	7				109,8 ± 4,64	101,0 - 117,0	30
	F	111,7 ± 6,21	104,5 - 115,5	3							111,7 ± 6,21	104,5 - 115,5	3
	M	113,2 ± 1,04	112,0 - 114,0	3					112,0	1	112,9 ± 1,03	112,0 - 114,0	4
	Tot.	110,4 ± 4,62	101,0 - 117,0	29	109,4 ± 4,78	102,0 - 116,0	7		112,0	1	110,3 ± 4,55	101,0 - 117,0	37
Tarso	0	22,9 ± 1,16	20,0 - 25,0	23	22,2 ± 0,44	21,5 - 23,0	8				22,7 ± 1,06	20,0 - 25,0	31
	F	23,3 ± 0,58	23,0 - 24,0	3					22,7	1	23,2 ± 0,57	22,7 - 24,0	4
	M	23,2 ± 1,04	22,0 - 24,0	3							23,2 ± 1,04	22,0 - 24,0	3
	Tot.	23,0 ± 1,09	20,0 - 25,0	29	22,2 ± 0,44	21,5 - 23,0	8		22,7	1	22,8 ± 1,01	20,0 - 25,0	38
Peso	0	61,6 ± 4,22	54,0 - 69,0	23	56,7 ± 4,68	51,0 - 64,5	8				60,3 ± 4,79	51,0 - 69,0	31
	F	63,2 ± 8,04	54,0 - 69,0	3					60,0 - 60	1	62,4 ± 6,75	54,0 - 69,0	4
	M	63,0 ± 2,00	61,0 - 65,0	3					68,0 - 68	1	64,2 ± 2,99	61,0 - 68,0	4
	Tot.	61,9 ± 4,39	54,0 - 69,0	29	56,7 ± 4,68	51,0 - 64,5	8		60,0 - 68,0	2	60,9 ± 4,91	51,0 - 69,0	39

Torcicollo *Jynx torquilla*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	83,9 ± 4,52	71,0 - 94,0	111	79,3 ± 7,53	71,0 - 95,0	49	86,4 ± 3,83	82,0 - 94,0	8	82,6 ± 5,95	71,0 - 95,0	168
	F	85,7 ± 1,45	83,0 - 88,0	11					86,0 - 91,0	2	86,1 ± 1,98	83,0 - 91,0	13
	M	86,3 ± 4,16	83,0 - 91,0	3							86,3 ± 4,16	83,0 - 91,0	3
	Tot.	84,1 ± 4,36	71,0 - 94,0	125	79,3 ± 7,53	71,0 - 95,0	49	86,8 ± 3,68	82,0 - 94,0	10	83,0 ± 5,81	71,0 - 95,0	184
3RM	0	63,1 ± 3,76	51,0 - 71,0	93	58,1 ± 5,82	51,0 - 70,0	44	65,0 ± 3,02	61,0 - 71,0	8	61,7 ± 5,03	51,0 - 71,0	145
	F	64,3 ± 1,81	60,0 - 67,0	11					64,5 - 70,0	2	64,8 ± 2,28	60,0 - 70,0	13
	M		64,5 - 66,0	2								64,5 - 66,0	2
	Tot.	63,2 ± 3,59	51,0 - 71,0	106	58,1 ± 5,82	51,0 - 70,0	44	65,5 ± 3,11	61,0 - 71,0	10	62,0 ± 4,92	51,0 - 71,0	160
Tarsio	0	19,8 ± 0,78	18,4 - 21,5	77	19,7 ± 0,75	18,4 - 21,5	50	20,0 ± 0,84	19,1 - 21,5	7	19,8 ± 0,77	18,4 - 21,5	134
	F	19,8 ± 0,69	19,0 - 21,2	10					19,3 - 19,5	2	19,7 ± 0,64	19,0 - 21,2	12
	M	20,2 ± 0,93	19,2 - 21,0	3							20,2 ± 0,93	19,2 - 21,0	3
	Tot.	19,8 ± 0,77	18,4 - 21,5	90	19,7 ± 0,75	18,4 - 21,5	50	19,8 ± 0,77	19,1 - 21,5	9	19,8 ± 0,76	18,4 - 21,5	149
Peso	0	34,0 ± 5,26	22,2 - 53,0	106	30,9 ± 4,01	22,5 - 40,9	53	32,6 ± 6,70	20,6 - 40,2	7	33,0 ± 5,17	20,6 - 53,0	166
	F	36,2 ± 5,08	31,5 - 48,0	10					35,6 - 39,9	2	36,5 ± 4,73	31,5 - 48,0	12
	M	34,2 ± 2,48	32,4 - 37,0	3							34,2 ± 2,48	32,4 - 37,0	3
	Tot.	34,2 ± 5,20	22,2 - 53,0	119	30,9 ± 4,01	22,5 - 40,9	53	33,7 ± 6,33	20,6 - 40,2	9	33,2 ± 5,16	20,6 - 53,0	181

Picchio verde *Picus viridis*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	160,2 ± 3,06	156,0 - 165,0	6	156,8 ± 4,04	150,0 - 166,0	64				157,1 ± 4,06	150,0 - 166,0	70
	F	161,1 ± 3,12	155,0 - 170,0	48	159,8 ± 3,28	152,0 - 166,0	92	163,1 ± 2,47	159,0 - 167,0	9	160,4 ± 3,30	152,0 - 170,0	149
	M	160,4 ± 3,18	155,0 - 168,0	61	158,9 ± 3,37	150,0 - 166,0	97	162,8 ± 2,30	160,0 - 169,0	12	159,7 ± 3,41	150,0 - 169,0	170
	Tot.	160,7 ± 3,14	155,0 - 170,0	115	158,7 ± 3,69	150,0 - 166,0	253	162,9 ± 2,32	159,0 - 169,0	21	159,5 ± 3,68	150,0 - 170,0	389
3RM	0		122,0 - 123,0	2	117,2 ± 3,40	110,9 - 127,0	53				117,4 ± 3,49	110,9 - 127,0	55
	F	119,2 ± 2,87	114,0 - 127,0	45	118,9 ± 3,09	111,0 - 126,0	80	119,6 ± 2,84	115,0 - 122,5	8	119,1 ± 2,99	111,0 - 127,0	133
	M	117,8 ± 3,08	110,0 - 125,5	49	117,6 ± 2,92	108,0 - 126,0	87	119,4 ± 3,51	115,0 - 127,0	11	117,8 ± 3,03	108,0 - 127,0	147
	Tot.	118,5 ± 3,07	110,0 - 127,0	96	118,0 ± 3,17	108,0 - 127,0	220	119,5 ± 3,16	115,0 - 127,0	19	118,2 ± 3,16	108,0 - 127,0	335
Tarsio	0	30,1 ± 0,82	29,2 - 31,0	4	30,4 ± 1,04	27,5 - 32,2	46				30,4 ± 1,02	27,5 - 32,2	50
	F	30,3 ± 1,01	28,0 - 32,0	27	30,6 ± 1,01	28,4 - 32,5	44	30,4 ± 0,45	29,7 - 30,9	6	30,5 ± 0,98	28,0 - 32,5	77
	M	30,4 ± 1,28	27,0 - 32,5	31	30,7 ± 1,26	27,0 - 32,5	52	30,6 ± 0,96	29,0 - 32,0	8	30,6 ± 1,24	27,0 - 32,5	91
	Tot.	30,3 ± 1,13	27,0 - 32,5	62	30,6 ± 1,11	27,0 - 32,5	142	30,5 ± 0,77	29,0 - 32,0	14	30,5 ± 1,10	27,0 - 32,5	218
Peso	0	177,9 ± 7,34	165,0 - 186,0	6	158,5 ± 13,67	129,0 - 190,5	66				160,1 ± 14,29	129,0 - 190,5	72
	F	174,5 ± 9,34	156,0 - 197,0	46	166,9 ± 10,24	135,0 - 189,0	91	180,2 ± 13,04	159,0 - 203,5	9	170,1 ± 10,96	135,0 - 203,5	146
	M	172,3 ± 8,96	145,0 - 187,0	53	166,7 ± 11,16	130,0 - 189,0	94	181,2 ± 13,56	157,0 - 209,0	13	169,7 ± 11,46	130,0 - 209,0	160
	Tot.	173,6 ± 9,01	145,0 - 197,0	105	164,6 ± 12,09	129,0 - 190,5	251	180,8 ± 13,04	157,0 - 209,0	22	168,0 ± 12,45	129,0 - 209,0	378

Picchio rosso maggiore *Dendrocopos major*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0		130,0	1	128,7 ± 3,48	121,0 - 140,0	177				128,7 ± 3,47	121,0 - 140,0	178
	F	130,2 ± 3,49	125,0 - 143,0	69	130,8 ± 3,18	123,0 - 140,0	96	130,9 ± 2,69	127,0 - 135,0	21	130,6 ± 3,24	123,0 - 143,0	186
	M	130,4 ± 2,83	122,0 - 138,0	89	131,2 ± 2,51	126,0 - 138,0	103	130,8 ± 2,92	123,0 - 137,0	39	130,8 ± 2,72	122,0 - 138,0	231
	Tot.	130,3 ± 3,12	122,0 - 143,0	159	129,9 ± 3,36	121,0 - 140,0	376	130,8 ± 2,82	123,0 - 137,0	60	130,1 ± 3,25	121,0 - 143,0	595
3RM	0				96,7 ± 3,65	85,0 - 107,5	162				96,7 ± 3,65	85,0 - 107,5	162
	F	98,2 ± 2,90	93,0 - 105,0	45	98,6 ± 2,75	92,0 - 108,0	94	99,1 ± 2,51	95,0 - 106,0	21	98,5 ± 2,76	92,0 - 108,0	160
	M	98,0 ± 2,56	93,0 - 106,5	65	98,2 ± 2,79	86,5 - 105,0	91	97,9 ± 2,80	92,0 - 104,0	38	98,1 ± 2,71	86,5 - 106,5	194
	Tot.	98,1 ± 2,70	93,0 - 106,5	110	97,6 ± 3,31	85,0 - 108,0	347	98,3 ± 2,73	92,0 - 106,0	59	97,8 ± 3,13	85,0 - 108,0	516
Tarsio	0		24,0	1	23,8 ± 1,02	21,5 - 25,5	73				23,8 ± 1,01	21,5 - 25,5	74
	F	23,1 ± 0,99	20,3 - 25,0	37	23,5 ± 1,06	21,3 - 25,4	29	23,1 ± 0,92	21,5 - 25,0	10	23,3 ± 1,02	20,3 - 25,4	76
	M	23,4 ± 1,18	20,5 - 25,3	51	23,4 ± 0,92	21,7 - 25,5	30	23,6 ± 0,63	22,7 - 25,2	14	23,4 ± 1,03	20,5 - 25,5	95
	Tot.	23,3 ± 1,11	20,3 - 25,3	89	23,7 ± 1,02	21,3 - 25,5	132	23,4 ± 0,79	21,5 - 25,2	24	23,5 ± 1,04	20,3 - 25,5	245
Peso	0		75,0 - 78,0	2	67,9 ± 4,74	57,0 - 78,0	182				68,0 ± 4,80	57,0 - 78,0	184
	F	69,4 ± 4,24	60,0 - 83,0	67	69,6 ± 3,43	60,5 - 77,2	97	71,6 ± 4,55	66,0 - 84,0	22	69,8 ± 3,91	60,0 - 84,0	186
	M	72,9 ± 4,66	63,0 - 84,0	81	72,3 ± 4,45	58,0 - 84,0	103	71,6 ± 5,55	60,0 - 85,0	40	72,4 ± 4,74	58,0 - 85,0	224
	Tot.	71,4 ± 4,80	60,0 - 84,0	150	69,5 ± 4,72	57,0 - 84,0	382	71,6 ± 5,18	60,0 - 85,0	62	70,2 ± 4,87	57,0 - 85,0	594

Picchio rosso minore *Dendrocopos minor*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Comlessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0				85,4 ± 1,69	84,0 - 88,0	8	85,4 ± 1,69	84,0 - 88,0	8
	F	87,0 ± 1,00	86,0 - 89,0	7		90,0	1	87,4 ± 1,41	86,0 - 90,0	8
	M	87,2 ± 1,48	85,0 - 89,0	5	85,7 ± 2,08	84,0 - 88,0	3	86,6 ± 1,77	84,0 - 89,0	8
	Tot.	87,1 ± 1,16	85,0 - 89,0	12	85,8 ± 2,08	84,0 - 90,0	12	86,5 ± 1,77	84,0 - 90,0	24
3RM	0				66,1 ± 1,66	64,0 - 69,0	8	66,1 ± 1,66	64,0 - 69,0	8
	F	66,6 ± 0,45	66,0 - 67,0	7		69,0	1	66,9 ± 0,95	66,0 - 69,0	8
	M	67,2 ± 0,93	66,0 - 68,5	6	65,7 ± 2,08	64,0 - 68,0	3	66,7 ± 1,48	64,0 - 68,5	9
	Tot.	66,8 ± 0,75	66,0 - 68,5	13	66,2 ± 1,83	64,0 - 69,0	12	66,6 ± 1,38	64,0 - 69,0	25
Tarso	0				15,4 ± 0,97	14,0 - 16,4	5	15,4 ± 0,97	14,0 - 16,4	5
	F	14,9 ± 0,76	14,0 - 16,3	6		14,0	1	14,8 ± 0,77	14,0 - 16,3	7
	M	15,1 ± 0,96	14,3 - 16,8	6		15,0	1	15,0 ± 0,88	14,3 - 16,8	7
	Tot.	15,0 ± 0,83	14,0 - 16,8	12	15,2 ± 0,96	14,0 - 16,4	7	15,1 ± 0,86	14,0 - 16,8	19
Peso	0				18,3 ± 1,08	16,3 - 19,8	8	18,3 ± 1,08	16,3 - 19,8	8
	F	19,5 ± 1,00	18,4 - 21,0	8		18,5	1	19,4 ± 0,99	18,4 - 21,0	9
	M	18,4 ± 0,70	17,3 - 19,4	7	19,0 ± 0,40	18,6 - 19,4	3	18,6 ± 0,67	17,3 - 19,4	10
	Tot.	19,0 ± 1,00	17,3 - 21,0	15	18,5 ± 0,93	16,3 - 19,8	12	18,8 ± 0,98	16,3 - 21,0	27

Topino *Riparia riparia*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Comlessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	106,4 ± 3,12	98,5 - 113,5	150	103,1 ± 3,14	94,0 - 114,0	380				104,0 ± 3,48	94,0 - 114,0	530
	F	107,0 ± 2,86	100,0 - 114,0	169					110,0	1	107,0 ± 2,86	100,0 - 114,0	170
	M	107,4 ± 2,56	100,0 - 114,0	95	105,0 ± DIV/0!	105,0 - 105,0	1	106,0 ± 2,65	104,0 - 109,0	3	107,4 ± 2,56	100,0 - 114,0	99
	Tot.	106,9 ± 2,91	98,5 - 114,0	414	103,1 ± 3,14	94,0 - 114,0	381	107,0 ± 2,94	104,0 - 110,0	4	105,1 ± 3,57	94,0 - 114,0	799
3RM	0	83,5 ± 2,51	77,0 - 89,0	145	80,2 ± 2,89	70,5 - 87,0	352				81,1 ± 3,16	70,5 - 89,0	497
	F	82,9 ± 2,24	77,5 - 88,0	142					85,5	1	82,9 ± 2,24	77,5 - 88,0	143
	M	83,3 ± 1,85	80,0 - 89,0	73	80,5 ± DIV/0!	80,5	1	82,0 ± 0,00	82,0 - 82,0	3	83,2 ± 1,84	80,0 - 89,0	77
	Tot.	83,2 ± 2,29	77,0 - 89,0	360	80,2 ± 2,88	70,5 - 87,0	353	82,9 ± 1,75	82,0 - 85,5	4	81,7 ± 3,01	70,5 - 89,0	717
Tarso	0	10,5 ± 0,35	10,2 - 10,9	3		10,3 - 11,0	2				10,6 ± 0,36	10,2 - 11,0	5
	F	0,0 ± 0,00	0,0 - 0,0	0					11,0	1	11,0 ± DIV/0!	11,0 - 11,0	1
	M	0,0 ± 0,00	0,0 - 0,0	0					10,8 - 10,8	2	10,8 ± 0,00	10,8 - 10,8	2
	Tot.	10,5 ± 0,35	10,2 - 10,9	3		10,3 - 11,0	2	10,9 ± 0,12	10,8 - 11,0	3	10,7 ± 0,31	10,2 - 11,0	8
Peso	0	14,1 ± 1,26	11,2 - 17,8	148	13,6 ± 1,31	9,8 - 17,8	397				13,7 ± 1,31	9,8 - 17,8	545
	F	13,5 ± 1,30	10,7 - 17,7	149					13,2	1	13,5 ± 1,29	10,7 - 17,7	150
	M	12,9 ± 0,90	11,0 - 15,3	80		13,6	1	13,3 ± 2,96	11,5 - 17,7	4	13,0 ± 1,04	11,0 - 17,7	85
	Tot.	13,6 ± 1,28	10,7 - 17,8	377	13,6 ± 1,31	9,8 - 17,8	398	13,3 ± 2,56	11,5 - 17,7	5	13,6 ± 1,30	9,8 - 17,8	780

Rondine *Hirundo rustica*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Comlessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	124,3 ± 3,05	116,0 - 135,0	286	121,9 ± 2,95	113,0 - 135,0	1832				122,2 ± 3,07	113,0 - 135,0	2118
	F	123,6 ± 3,04	114,5 - 133,0	891	122,1 ± 2,55	115,0 - 130,0	672	124,1 ± 3,33	119,0 - 130,0	17	123,0 ± 2,94	114,5 - 133,0	1580
	M	125,9 ± 2,99	116,0 - 135,0	738	123,7 ± 2,83	116,0 - 133,0	634	125,2 ± 2,59	120,0 - 129,0	13	124,9 ± 3,12	116,0 - 135,0	1385
	Tot.	124,6 ± 3,20	114,5 - 135,0	1915	122,3 ± 2,92	113,0 - 135,0	3138	124,6 ± 3,04	119,0 - 130,0	30	123,2 ± 3,23	113,0 - 135,0	5083
3RM	0	96,4 ± 2,61	88,5 - 111,5	583	93,8 ± 2,34	84,5 - 104,5	6010				94,0 ± 2,47	84,5 - 111,5	6593
	F	95,6 ± 2,49	88,5 - 105,0	1273	93,2 ± 2,29	86,0 - 100,5	1670	96,4 ± 2,26	91,5 - 101,0	16	94,2 ± 2,65	86,0 - 105,0	2959
	M	97,1 ± 2,45	88,0 - 110,5	974	94,3 ± 2,26	88,0 - 102,0	1611	98,0 ± 2,30	94,0 - 102,0	12	95,4 ± 2,70	88,0 - 110,5	2597
	Tot.	96,3 ± 2,59	88,0 - 111,5	2830	93,8 ± 2,34	84,5 - 104,5	9291	97,1 ± 2,36	91,5 - 102,0	28	94,4 ± 2,62	84,5 - 111,5	2149
Tarso	0	11,3 ± 0,64	10,5 - 13,0	24	11,7 ± 0,78	10,2 - 13,5	137				11,7 ± 0,77	10,2 - 13,5	161
	F	11,6 ± 0,70	10,5 - 13,5	63	11,3 ± 0,70	10,5 - 12,5	7		11,9	1	11,6 ± 0,69	10,5 - 13,5	71
	M	11,6 ± 0,72	10,7 - 13,5	52	10,8 ± 0,30	10,4 - 11,0	5	11,3 ± 0,65	10,5 - 12,0	4	11,5 ± 0,72	10,4 - 13,5	61
	Tot.	11,6 ± 0,70	10,5 - 13,5	139	11,7 ± 0,78	10,2 - 13,5	149	11,4 ± 0,63	10,5 - 12,0	5	11,6 ± 0,74	10,2 - 13,5	293
Peso	0	20,9 ± 2,18	15,0 - 27,5	596	19,3 ± 2,09	11,9 - 28,4	6018				19,4 ± 2,15	11,9 - 28,4	6614
	F	20,0 ± 2,22	12,3 - 28,1	1253	18,3 ± 1,24	13,4 - 25,1	1607	19,7 ± 1,19	17,0 - 22,0	16	19,1 ± 1,94	12,3 - 28,1	2876
	M	20,3 ± 2,18	13,5 - 28,9	963	18,5 ± 1,22	14,9 - 26,7	1552	18,7 ± 0,70	17,6 - 19,7	12	19,2 ± 1,87	13,5 - 28,9	2527
	Tot.	20,3 ± 2,22	12,3 - 28,9	2812	19,0 ± 1,89	11,9 - 28,4	9177	19,3 ± 1,11	17,0 - 22,0	28	19,3 ± 2,05	11,9 - 28,9	2017

Prispolone *Anthus trivialis*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	88,9 ± 2,68	82,0 - 97,0	195	89,0 ± 2,36	82,0 - 97,0	670		90,0 - 90,5	2	89,0 ± 2,43	82,0 - 97,0	867
	F	86,3 ± 0,58	86,0 - 87,0	3		85,0	1	85,0 ± 1,73	83,0 - 86,0	3	85,6 ± 1,27	83,0 - 87,0	7
	M	91,2 ± 2,06	89,0 - 93,0	4	88,0 ± 1,41	87,0 - 89,0	2				90,2 ± 2,40	87,0 - 93,0	6
	Tot.	88,9 ± 2,69	82,0 - 97,0	202	89,0 ± 2,36	82,0 - 97,0	673	87,1 ± 3,13	83,0 - 90,5	5	89,0 ± 2,44	82,0 - 97,0	880
3RM	0	67,4 ± 2,53	60,0 - 75,0	190	67,7 ± 2,18	60,0 - 74,5	720		69,0 - 69,0	2	67,6 ± 2,26	60,0 - 75,0	912
	F	65,3 ± 2,08	63,0 - 67,0	3		64,5	1	64,0 ± 1,73	62,0 - 65,0	3	64,6 ± 1,70	62,0 - 67,0	7
	M	70,0 ± 0,50	69,5 - 70,5	3		67,5 - 68,0	2				69,1 ± 1,29	67,5 - 70,5	5
	Tot.	67,4 ± 2,53	60,0 - 75,0	196	67,7 ± 2,18	60,0 - 74,5	723	66,0 ± 3,00	62,0 - 69,0	5	67,6 ± 2,27	60,0 - 75,0	924
Tarso	0	21,6 ± 0,67	20,2 - 23,5	76	21,7 ± 0,66	20,2 - 23,9	231		21,5 - 22,4	2	21,7 ± 0,66	20,2 - 23,9	309
	F	21,1 ± 0,46	20,6 - 21,5	3		21,5	1	20,9 ± 0,40	20,5 - 21,3	3	21,1 ± 0,41	20,5 - 21,5	7
	M		21,5	1		21,6	1				21,6 ± 0,07	21,5 - 21,6	2
	Tot.	21,5 ± 0,66	20,2 - 23,5	80	21,7 ± 0,66	20,2 - 23,9	233	21,3 ± 0,70	20,5 - 22,4	5	21,7 ± 0,66	20,2 - 23,9	318
Peso	0	23,2 ± 3,02	17,4 - 37,7	208	22,4 ± 2,85	16,0 - 36,2	731		19,6 - 28,4	2	22,6 ± 2,91	16,0 - 37,7	941
	F		20,2 - 22,0	2		22,0	1	21,8 ± 0,58	21,5 - 22,5	3	21,6 ± 0,79	20,2 - 22,5	6
	M	21,6 ± 1,03	20,4 - 22,6	5		21,5 - 22,3	2				21,7 ± 0,88	20,4 - 22,6	7
	Tot.	23,1 ± 2,99	17,4 - 37,7	215	22,4 ± 2,85	16,0 - 36,2	734	22,7 ± 3,35	19,6 - 28,4	5	22,6 ± 2,90	16,0 - 37,7	954

Pispola *Anthus pratensis*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	81,4 ± 2,83	75,0 - 86,0	65	81,0 ± 2,60	74,0 - 88,0	194	81,1 ± 2,66	74,0 - 88,0	259
	F									
	M									
	Tot.	81,4 ± 2,83	75,0 - 86,0	65	81,0 ± 2,60	74,0 - 88,0	194	81,1 ± 2,66	74,0 - 88,0	259
3RM	0	61,7 ± 2,66	55,0 - 67,0	62	61,3 ± 2,24	55,0 - 67,0	193	61,4 ± 2,35	55,0 - 67,0	255
	F									
	M									
	Tot.	61,7 ± 2,66	55,0 - 67,0	62	61,3 ± 2,24	55,0 - 67,0	193	61,4 ± 2,35	55,0 - 67,0	255
Tarso	0	21,5 ± 0,71	21,0 - 22,5	4	21,0 ± 0,78	20,0 - 21,8	5	21,2 ± 0,75	20,0 - 22,5	9
	F									
	M									
	Tot.	21,5 ± 0,71	21,0 - 22,5	4	21,0 ± 0,78	20,0 - 21,8	5	21,2 ± 0,75	20,0 - 22,5	9
Peso	0	17,9 ± 1,62	14,0 - 22,6	65	17,8 ± 1,49	14,5 - 24,6	192	17,9 ± 1,52	14,0 - 24,6	257
	F									
	M									
	Tot.	17,9 ± 1,62	14,0 - 22,6	65	17,8 ± 1,49	14,5 - 24,6	192	17,9 ± 1,52	14,0 - 24,6	257

Spioncello *Anthus spinoletta*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	89,8 ± 3,33	80,0 - 97,0	182	90,2 ± 3,38	82,0 - 97,0	195	91,1 ± 2,49	87,0 - 95,0	21	90,0 ± 3,33	80,0 - 97,0	398
	F	86,5 ± 1,13	83,0 - 89,0	109	86,3 ± 1,27	83,0 - 89,0	122	87,0 ± 1,00	86,0 - 88,0	5	86,4 ± 1,20	83,0 - 89,0	236
	M	94,5 ± 1,69	87,0 - 99,0	200	93,7 ± 1,60	90,5 - 98,0	191	95,1 ± 1,84	91,0 - 99,0	51	94,2 ± 1,74	87,0 - 99,0	442
	Tot.	91,0 ± 3,93	80,0 - 99,0	491	90,6 ± 3,71	82,0 - 98,0	508	93,5 ± 3,17	86,0 - 99,0	77	91,0 ± 3,84	80,0 - 99,0	1076
3RM	0	68,7 ± 3,01	61,5 - 74,5	85	69,1 ± 2,98	61,0 - 75,0	126	69,8 ± 2,74	66,0 - 74,0	9	69,0 ± 2,98	61,0 - 75,0	220
	F	65,6 ± 1,24	62,0 - 69,5	60	65,2 ± 1,26	62,0 - 67,5	53				65,4 ± 1,25	62,0 - 69,5	113
	M	71,9 ± 1,54	68,5 - 76,0	85	71,2 ± 1,64	67,5 - 77,0	118	73,1 ± 2,13	70,0 - 77,0	10	71,5 ± 1,69	67,5 - 77,0	213
	Tot.	69,1 ± 3,28	61,5 - 76,0	230	69,2 ± 3,08	61,0 - 77,0	297	71,5 ± 2,90	66,0 - 77,0	19	69,2 ± 3,18	61,0 - 77,0	546
Tarso	0	24,2 ± 0,70	22,5 - 26,0	65	24,3 ± 0,75	22,4 - 25,8	93		24,6 - 25,5	2	24,3 ± 0,73	22,4 - 26,0	160
	F	23,5 ± 0,70	22,5 - 24,5	6	23,5 ± 0,75	22,2 - 24,8	15				23,5 ± 0,72	22,2 - 24,8	21
	M	24,3 ± 0,79	23,0 - 25,2	10	24,3 ± 0,87	22,2 - 26,0	33				24,3 ± 0,84	22,2 - 26,0	43
	Tot.	24,2 ± 0,73	22,5 - 26,0	81	24,2 ± 0,81	22,2 - 26,0	141		24,6 - 25,5	2	24,2 ± 0,78	22,2 - 26,0	224
Peso	0	23,7 ± 1,66	19,6 - 28,0	172	23,5 ± 1,91	19,0 - 29,0	178	23,9 ± 1,19	21,4 - 26,3	15	23,6 ± 1,77	19,0 - 29,0	365
	F	22,4 ± 1,30	18,9 - 25,9	104	22,2 ± 1,46	19,2 - 26,2	115	22,6 ± 1,92	20,0 - 25,2	5	22,3 ± 1,40	18,9 - 26,2	224
	M	25,3 ± 1,68	22,2 - 31,9	189	25,1 ± 1,91	17,6 - 29,9	173	25,5 ± 1,52	21,7 - 28,8	48	25,2 ± 1,77	17,6 - 31,9	410
	Tot.	24,1 ± 1,96	18,9 - 31,9	465	23,8 ± 2,12	17,6 - 29,9	466	24,9 ± 1,73	20,0 - 28,8	68	24,0 ± 2,04	17,6 - 31,9	999

Cutrettola *Motacilla flava*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	
C.Max	0	81,0 ± 2,84	73,0 - 85,0	34	81,1 ± 2,31	75,0 - 88,0	564	81,1 ± 2,34	73,0 - 88,0	598
	F	79,4 ± 2,04	73,0 - 82,0	38	79,1 ± 3,20	74,5 - 82,0	7	79,3 ± 2,21	73,0 - 82,0	45
	M	83,2 ± 2,71	76,0 - 87,0	44	83,1 ± 1,74	81,0 - 85,0	7	83,2 ± 2,59	76,0 - 87,0	51
	Tot.	81,3 ± 3,01	73,0 - 87,0	116	81,1 ± 2,34	74,5 - 88,0	578	81,2 ± 2,46	73,0 - 88,0	694
3RM	0	61,4 ± 2,22	56,5 - 65,0	27	61,3 ± 2,04	56,0 - 66,0	332	61,3 ± 2,06	56,0 - 66,0	359
	F	59,9 ± 1,38	57,0 - 62,0	27	60,7 ± 2,71	56,0 - 63,5	6	60,1 ± 1,67	56,0 - 63,5	33
	M	63,1 ± 2,23	59,0 - 67,5	36	62,9 ± 1,72	60,5 - 65,0	7	63,1 ± 2,14	59,0 - 67,5	43
	Tot.	61,6 ± 2,39	56,5 - 67,5	90	61,3 ± 2,06	56,0 - 66,0	345	61,4 ± 2,13	56,0 - 67,5	435
Tarsolo	0		24,4 - 25,2	2	23,5 ± 0,68	22,3 - 25,0	46	23,6 ± 0,72	22,3 - 25,2	48
	F	23,7 ± 0,72	22,8 - 25,0	14	23,5 ± 0,71	22,2 - 24,2	6	23,6 ± 0,71	22,2 - 25,0	20
	M	23,7 ± 0,53	22,5 - 24,3	14	23,5 ± 0,75	22,4 - 24,6	6	23,6 ± 0,59	22,4 - 24,6	20
	Tot.	23,8 ± 0,67	22,5 - 25,2	30	23,5 ± 0,68	22,2 - 25,0	58	23,6 ± 0,68	22,2 - 25,2	88
Peso	0	16,5 ± 1,33	14,0 - 19,8	34	16,3 ± 1,20	13,4 - 21,5	587	16,3 ± 1,21	13,4 - 21,5	621
	F	16,7 ± 1,79	13,0 - 21,6	48	16,9 ± 0,81	15,5 - 17,8	6	16,7 ± 1,71	13,0 - 21,6	54
	M	16,9 ± 1,33	14,8 - 21,6	48	17,2 ± 1,21	15,5 - 18,8	7	17,0 ± 1,31	14,8 - 21,6	55
	Tot.	16,7 ± 1,52	13,0 - 21,6	130	16,3 ± 1,20	13,4 - 21,5	600	16,4 ± 1,28	13,0 - 21,6	730

Ballerina gialla *Motacilla cinerea*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n	
C.Max	0	84,5 ± 1,87	82,0 - 88,0	19	84,1 ± 2,07	80,0 - 89,0	110		87,0	1	84,2 ± 2,05	80,0 - 89,0	130
	F	82,3 ± 2,33	79,0 - 86,0	11	82,7 ± 1,66	80,0 - 86,0	9	82,8 ± 0,96	82,0 - 84,0	4	82,5 ± 1,87	79,0 - 86,0	24
	M	84,6 ± 2,13	81,0 - 90,0	30	84,6 ± 2,25	81,0 - 89,0	11	85,0 ± 1,41	84,0 - 87,0	4	84,6 ± 2,07	81,0 - 90,0	45
	Tot.	84,1 ± 2,24	79,0 - 90,0	60	84,0 ± 2,08	80,0 - 89,0	130	84,2 ± 1,86	82,0 - 87,0	9	84,1 ± 2,11	79,0 - 90,0	199
3RM	0	64,3 ± 1,86	60,0 - 67,0	13	64,0 ± 1,64	60,5 - 68,0	119		66,5 - 66,5	1	64,1 ± 1,67	60,0 - 68,0	133
	F	63,5 ± 1,13	62,0 - 66,0	8	63,4 ± 1,79	60,5 - 66,0	8	63,9 ± 0,85	63,0 - 65,0	4	63,5 ± 1,34	60,5 - 66,0	20
	M	64,3 ± 2,07	60,5 - 68,5	24	64,2 ± 1,89	61,5 - 66,5	9	66,6 ± 1,31	65,5 - 68,0	4	64,6 ± 2,05	60,5 - 68,5	37
	Tot.	64,2 ± 1,87	60,0 - 68,5	45	64,0 ± 1,66	60,5 - 68,0	136	65,4 ± 1,73	63,0 - 68,0	9	64,1 ± 1,73	60,0 - 68,5	190
Tarsolo	0	20,8 ± 0,98	19,3 - 22,0	5	20,9 ± 0,69	19,0 - 22,5	66				20,9 ± 0,71	19,0 - 22,5	71
	F	21,4 ± 0,72	20,0 - 22,3	9	21,3 ± 0,56	20,5 - 22,0	7	20,8 ± 0,53	20,2 - 21,4	4	21,2 ± 0,65	20,0 - 22,3	20
	M	21,0 ± 0,64	20,0 - 22,1	14	21,3 ± 0,61	20,3 - 22,0	10	20,8 ± 0,65	20,0 - 21,5	4	21,1 ± 0,63	20,0 - 22,1	28
	Tot.	21,1 ± 0,74	19,3 - 22,3	28	21,0 ± 0,68	19,0 - 22,5	83	20,8 ± 0,55	20,0 - 21,5	8	21,0 ± 0,69	19,0 - 22,5	119
Peso	0	17,7 ± 0,86	16,0 - 19,5	19	16,9 ± 1,19	14,4 - 21,2	122		19,1	1	17,1 ± 1,19	14,4 - 21,2	142
	F	17,1 ± 1,29	15,0 - 19,2	13	17,6 ± 0,84	17,0 - 19,4	8	17,1 ± 1,17	15,8 - 18,6	4	17,3 ± 1,12	15,0 - 19,4	25
	M	17,6 ± 0,97	15,8 - 20,4	31	17,2 ± 1,18	15,5 - 19,1	11	17,7 ± 1,39	16,2 - 19,4	4	17,5 ± 1,05	15,5 - 20,4	46
	Tot.	17,5 ± 1,02	15,0 - 20,4	63	17,0 ± 1,18	14,4 - 21,2	141	17,6 ± 1,27	15,8 - 19,4	9	17,2 ± 1,16	14,4 - 21,2	213

Ballerina bianca *Motacilla alba*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n	
C.Max	0	86,2 ± 2,68	82,0 - 89,0	5	88,9 ± 4,43	79,0 - 96,0	30				88,5 ± 4,31	79,0 - 96,0	35
	F	84,5 ± 2,65	82,0 - 88,0	4	87,3 ± 1,15	86,0 - 88,0	3		89,0	1	86,1 ± 2,59	82,0 - 89,0	8
	M	91,3 ± 2,26	87,0 - 96,0	15	91,2 ± 3,10	87,0 - 95,0	11	91,6 ± 1,80	90,0 - 95,0	6	91,3 ± 2,44	87,0 - 96,0	32
	Tot.	89,1 ± 3,72	82,0 - 96,0	24	89,4 ± 4,10	79,0 - 96,0	44	91,2 ± 1,91	89,0 - 95,0	7	89,5 ± 3,84	79,0 - 96,0	75
3RM	0	64,5 ± 5,66	60,5 - 68,5	2	67,3 ± 3,63	59,5 - 74,0	29				67,1 ± 3,72	59,5 - 74,0	31
	F		65,0	1		66,0 - 67,5	2		69,0 - 69	1	66,9 ± 1,75	65,0 - 69,0	4
	M	70,2 ± 1,85	66,5 - 72,0	9	70,3 ± 2,16	67,0 - 74,5	10	69,8 ± 1,44	68,0 - 72,0	6	70,2 ± 1,84	66,5 - 74,5	25
	Tot.	68,8 ± 3,41	60,5 - 72,0	12	68,0 ± 3,49	59,5 - 74,5	41	69,7 ± 1,35	68,0 - 72,0	7	68,4 ± 3,31	59,5 - 74,5	60
Tarsolo	0	23,1 ± 1,04	21,7 - 24,0	4	23,7 ± 0,67	22,5 - 24,8	22				23,6 ± 0,74	21,7 - 24,8	26
	F	23,3 ± 1,31	21,5 - 24,5	4		22,0 - 23,5	2		25,0 - 25	1	23,4 ± 1,27	21,5 - 25,0	7
	M	24,0 ± 0,64	23,0 - 25,0	13	23,1 ± 0,86	21,5 - 24,4	10	23,9 ± 0,63	23,5 - 25,0	5	23,7 ± 0,83	21,5 - 25,0	28
	Tot.	23,7 ± 0,91	21,5 - 25,0	21	23,4 ± 0,80	21,5 - 24,8	34	24,1 ± 0,73	23,5 - 25,0	6	23,6 ± 0,84	21,5 - 25,0	61
Peso	0	20,2 ± 1,54	17,6 - 21,4	5	21,0 ± 2,42	15,6 - 25,0	31				20,9 ± 2,32	15,6 - 25,0	36
	F	23,6 ± 2,78	21,0 - 27,3	4	20,8 ± 0,15	20,6 - 20,9	3		21,0 - 21	1	22,2 ± 2,34	20,6 - 27,3	8
	M	22,5 ± 1,72	19,7 - 26,0	15	22,4 ± 2,92	16,6 - 26,9	10	23,0 ± 2,55	20,6 - 27,2	6	22,6 ± 2,25	16,6 - 27,2	31
	Tot.	22,2 ± 2,11	17,6 - 27,3	24	21,3 ± 2,50	15,6 - 26,9	44	22,7 ± 2,45	20,6 - 27,2	7	21,7 ± 2,40	15,6 - 27,3	75

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	95,7 ± 3,83	89,0 - 102,0	10	93,8 ± 4,62	84,0 - 101,0	55		95,0	1	94,1 ± 4,50	84,0 - 102,0	66
	F		89,0	1	87,2 ± 2,23	85,0 - 91,0	6		88,0 - 89,0	2	87,7 ± 1,92	85,0 - 91,0	9
	M	95,5 ± 0,50	95,0 - 96,0	3	95,6 ± 2,19	91,0 - 97,5	8		95,5 - 100,0	2	95,9 ± 2,09	91,0 - 100,0	13
	Tot.	95,2 ± 3,66	89,0 - 102,0	14	93,4 ± 4,67	84,0 - 101,0	69	93,5 ± 4,97	88,0 - 100,0	5	93,7 ± 4,54	84,0 - 102,0	88
3RM	0	67,9 ± 2,53	65,0 - 72,0	7	65,7 ± 3,24	60,5 - 72,0	57		67,0	1	66,0 ± 3,20	60,5 - 72,0	65
	F		63,0	1	62,8 ± 2,21	60,5 - 66,0	6		62,0 - 64,5	2	62,9 ± 1,87	60,5 - 66,0	9
	M	68,8 ± 0,76	68,0 - 69,5	3	68,4 ± 0,84	67,0 - 69,5	7		71,5 - 72,0	2	69,1 ± 1,44	67,0 - 72,0	12
	Tot.	67,7 ± 2,56	63,0 - 72,0	11	65,8 ± 3,23	60,5 - 72,0	70	67,4 ± 4,35	62,0 - 72,0	5	66,1 ± 3,27	60,5 - 72,0	86
Tarsio	0	31,0 ± 0,41	30,5 - 31,5	4	29,7 ± 1,35	27,5 - 31,8	41		30,7	1	29,8 ± 1,34	27,5 - 31,8	46
	F		27,9	1	26,9 ± 0,47	26,4 - 27,5	5		27,8	1	27,2 ± 0,59	26,4 - 27,9	7
	M	29,7 ± 1,93	28,0 - 31,8	3	30,2 ± 0,84	29,2 - 31,4	6		29,3 - 30,0	2	29,9 ± 1,09	28,0 - 31,8	11
	Tot.	30,1 ± 1,54	27,9 - 31,8	8	29,5 ± 1,50	26,4 - 31,8	52	29,4 ± 1,24	27,8 - 30,7	4	29,6 ± 1,48	26,4 - 31,8	64
Peso	0	62,9 ± 5,74	50,0 - 71,0	14	57,9 ± 7,43	43,0 - 75,0	59		61,0	1	58,9 ± 7,32	43,0 - 75,0	74
	F		51,0	1	50,7 ± 4,61	44,8 - 56,0	6		51,3 - 52,0	2	51,0 ± 3,67	44,8 - 56,0	9
	M	62,7 ± 4,16	58,0 - 66,0	3	61,4 ± 6,77	52,5 - 71,0	8		67,2 - 68,0	2	62,7 ± 5,89	52,5 - 71,0	13
	Tot.	62,2 ± 5,93	50,0 - 71,0	18	57,7 ± 7,48	43,0 - 75,0	73	59,9 ± 8,01	51,3 - 68,0	5	58,7 ± 7,39	43,0 - 75,0	96

Scricciolo *Troglodytes troglodytes*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	48,0 ± 2,23	41,0 - 54,0	545	48,0 ± 2,30	41,0 - 54,0	536	48,1 ± 2,03	45,0 - 51,0	24	48,0 ± 2,26	41,0 - 54,0	1105
	F	47,3 ± 1,81	45,0 - 51,0	18	47,0 ± 1,00	46,0 - 48,0	3		46,0 - 50,0	2	47,3 ± 1,75	45,0 - 51,0	23
	M	49,2 ± 1,58	46,0 - 52,0	33	49,7 ± 1,50	48,0 - 52,0	7				49,3 ± 1,56	46,0 - 52,0	40
	Tot.	48,1 ± 2,21	41,0 - 54,0	596	48,0 ± 2,29	41,0 - 54,0	546	48,1 ± 2,02	45,0 - 51,0	26	48,0 ± 2,24	41,0 - 54,0	1168
3RM	0	35,8 ± 1,74	30,0 - 41,0	558	35,9 ± 1,75	30,5 - 40,0	610	36,2 ± 1,65	33,5 - 39,0	22	35,9 ± 1,74	30,0 - 41,0	1190
	F	35,3 ± 1,52	33,0 - 39,0	19	34,9 ± 2,96	30,0 - 39,0	6		34,5 - 37,5	2	35,3 ± 1,88	30,0 - 39,0	27
	M	37,0 ± 1,18	34,0 - 40,5	34	37,3 ± 1,07	36,0 - 38,5	7				37,0 ± 1,15	34,0 - 40,5	41
	Tot.	35,9 ± 1,73	30,0 - 41,0	611	35,9 ± 1,76	30,0 - 40,0	623	36,2 ± 1,63	33,5 - 39,0	24	35,9 ± 1,74	30,0 - 41,0	1258
Tarsio	0	17,1 ± 0,73	15,2 - 19,2	270	17,2 ± 0,71	15,2 - 19,2	317	17,1 ± 0,62	16,3 - 18,2	14	17,1 ± 0,72	15,2 - 19,2	601
	F	17,1 ± 0,46	16,5 - 18,0	8	17,2 ± 0,83	16,5 - 18,1	3		17,2 - 17,5	2	17,2 ± 0,50	16,5 - 18,1	13
	M	17,2 ± 0,64	16,5 - 19,0	14		17,0 - 17,3	2				17,2 ± 0,60	16,5 - 19,0	16
	Tot.	17,1 ± 0,72	15,2 - 19,2	292	17,2 ± 0,70	15,2 - 19,2	322	17,2 ± 0,58	16,3 - 18,2	16	17,1 ± 0,71	15,2 - 19,2	630
Peso	0	8,9 ± 0,92	6,5 - 12,0	560	8,8 ± 0,90	6,2 - 12,8	606	9,1 ± 0,91	7,7 - 11,0	25	8,8 ± 0,91	6,2 - 12,8	1191
	F	9,3 ± 1,18	7,5 - 12,0	20	8,9 ± 0,63	7,7 - 9,5	6		9,5 - 11,3	2	9,3 ± 1,12	7,5 - 12,0	28
	M	9,8 ± 0,68	8,0 - 11,0	33	9,7 ± 0,38	9,1 - 10,1	8				9,8 ± 0,63	8,0 - 11,0	41
	Tot.	8,9 ± 0,94	6,5 - 12,0	613	8,8 ± 0,90	6,2 - 12,8	620	9,2 ± 0,98	7,7 - 11,3	27	8,9 ± 0,93	6,2 - 12,8	1260

Passera scopaiola *Prunella modularis*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	71,0 ± 2,15	65,0 - 77,5	631	70,4 ± 1,96	65,0 - 77,5	2198	70,5 ± 2,36	65,0 - 75,0	27	70,5 ± 2,02	65,0 - 77,5	2856
	F	70,9 ± 1,46	69,0 - 73,0	7	68,9 ± 2,17	66,0 - 71,0	7				69,9 ± 2,04	66,0 - 73,0	14
	M	71,5 ± 1,33	70,0 - 74,0	13	70,6 ± 1,44	68,5 - 73,0	12		72,0	1	71,1 ± 1,42	68,5 - 74,0	26
	Tot.	71,0 ± 2,13	65,0 - 77,5	651	70,4 ± 1,96	65,0 - 77,5	2217	70,5 ± 2,34	65,0 - 75,0	28	70,5 ± 2,02	65,0 - 77,5	2896
3RM	0	53,4 ± 1,68	48,0 - 58,0	660	52,9 ± 1,61	47,0 - 58,0	2570	53,2 ± 1,53	50,5 - 57,5	28	53,0 ± 1,64	47,0 - 58,0	3258
	F	53,7 ± 1,44	51,5 - 55,5	7	52,1 ± 1,67	49,0 - 53,5	7				52,9 ± 1,72	49,0 - 55,5	14
	M	54,0 ± 1,60	52,0 - 56,5	11	53,0 ± 1,30	51,0 - 55,5	12		55,5 - 55,5	1	53,6 ± 1,52	51,0 - 56,5	24
	Tot.	53,4 ± 1,68	48,0 - 58,0	678	52,9 ± 1,61	47,0 - 58,0	2589	53,2 ± 1,57	50,5 - 57,5	29	53,0 ± 1,64	47,0 - 58,0	3296
Tarsio	0	20,8 ± 0,73	19,2 - 22,5	147	20,6 ± 0,67	18,9 - 22,6	406	20,5 ± 0,65	19,5 - 21,8	18	20,7 ± 0,70	18,9 - 22,6	571
	F	20,6 ± 0,69	20,0 - 21,5	4	19,9 ± 0,83	18,8 - 20,6	4				20,3 ± 0,80	18,8 - 21,5	8
	M	21,0 ± 0,88	20,0 - 22,4	7	20,5 ± 0,62	19,9 - 21,7	8				20,7 ± 0,77	19,9 - 22,4	15
	Tot.	20,9 ± 0,73	19,2 - 22,5	158	20,6 ± 0,68	18,8 - 22,6	418	20,5 ± 0,65	19,5 - 21,8	18	20,6 ± 0,70	18,8 - 22,6	594
Peso	0	19,2 ± 1,58	12,5 - 25,2	728	19,2 ± 1,54	12,7 - 26,2	2630	19,8 ± 1,34	17,0 - 24,0	29	19,2 ± 1,55	12,5 - 26,2	3387
	F	18,6 ± 1,79	16,5 - 22,8	10	18,9 ± 2,16	16,5 - 21,7	8		18,6 - 18,6	1	18,7 ± 1,91	16,5 - 22,8	18
	M	18,9 ± 1,86	15,0 - 22,0	13	17,7 ± 1,60	14,3 - 20,6	13				18,3 ± 1,76	14,3 - 22,0	27
	Tot.	19,2 ± 1,58	12,5 - 25,2	751	19,2 ± 1,54	12,7 - 26,2	2651	19,8 ± 1,34	17,0 - 24,0	30	19,2 ± 1,55	12,5 - 26,2	3432

Pettirosso Erithacus rubecula

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	73,1 ± 2,25	65,0 - 80,0	1612	73,0 ± 2,06	65,0 - 80,0	7027	72,8 ± 2,17	65,0 - 78,0	411	73,0 ± 2,01	65,0 - 80,0	9050
	F	71,9 ± 1,89	67,0 - 76,5	79	72,1 ± 2,02	68,0 - 80,0	104	72,3 ± 1,74	69,0 - 77,0	33	72,0 ± 1,93	67,0 - 80,0	216
	M	74,0 ± 2,23	69,0 - 78,0	53	74,1 ± 2,02	69,0 - 78,0	139	74,9 ± 2,12	71,0 - 80,0	60	74,3 ± 2,11	69,0 - 80,0	252
	Tot.	73,0 ± 2,25	65,0 - 80,0	1744	73,0 ± 2,07	65,0 - 80,0	7270	73,1 ± 2,24	65,0 - 80,0	504	73,0 ± 2,11	65,0 - 80,0	9518
3RM	0	54,5 ± 1,79	48,0 - 61,0	1509	54,5 ± 1,68	48,0 - 61,5	7828	54,3 ± 1,67	49,5 - 58,5	402	54,5 ± 1,70	48,0 - 61,5	9739
	F	53,7 ± 1,47	49,5 - 57,0	79	54,0 ± 1,69	50,5 - 59,5	101	53,8 ± 1,34	51,3 - 57,0	34	53,8 ± 1,56	49,5 - 59,5	214
	M	55,0 ± 1,66	51,0 - 60,0	54	55,2 ± 1,59	51,0 - 60,0	138	55,8 ± 1,60	51,5 - 59,0	58	55,3 ± 1,63	51,0 - 60,0	250
	Tot.	54,4 ± 1,78	48,0 - 61,0	1642	54,5 ± 1,68	48,0 - 61,5	8067	54,5 ± 1,71	49,5 - 59,0	494	54,5 ± 1,70	48,0 - 61,5	10203
Tarso	0	25,3 ± 0,92	22,0 - 27,8	799	25,3 ± 0,84	21,9 - 27,7	2863	25,4 ± 0,88	23,4 - 27,8	199	25,3 ± 0,86	21,9 - 27,8	3861
	F	25,4 ± 0,93	22,5 - 27,0	54	25,5 ± 0,98	22,0 - 27,2	52	25,4 ± 0,60	24,8 - 26,6	7	25,4 ± 0,93	22,0 - 27,2	113
	M	25,3 ± 1,18	21,9 - 27,7	30	25,7 ± 0,71	23,9 - 27,0	56	25,4 ± 1,01	23,9 - 27,8	21	25,6 ± 0,94	21,9 - 27,8	107
	Tot.	25,3 ± 0,93	21,9 - 27,8	883	25,3 ± 0,84	21,9 - 27,7	2971	25,4 ± 0,89	23,4 - 27,8	227	25,3 ± 0,86	21,9 - 27,8	4081
Peso	0	16,6 ± 1,65	9,6 - 25,0	1780	16,4 ± 1,46	10,0 - 24,0	8143	16,2 ± 1,40	12,2 - 22,9	435	16,4 ± 1,50	9,6 - 25,0	10358
	F	17,2 ± 2,11	11,6 - 25,0	85	17,0 ± 2,38	13,2 - 26,0	105	17,3 ± 1,85	14,4 - 22,5	34	17,1 ± 2,20	11,6 - 26,0	224
	M	16,6 ± 1,54	11,0 - 20,6	63	16,3 ± 1,26	13,5 - 23,0	141	16,2 ± 1,23	14,0 - 20,2	61	16,3 ± 1,33	11,0 - 23,0	265
	Tot.	16,6 ± 1,67	9,6 - 25,0	1928	16,4 ± 1,48	10,0 - 26,0	8389	16,3 ± 1,43	12,2 - 22,9	530	16,4 ± 1,51	9,6 - 26,0	10847

Usignolo Luscinia megarhynchos

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	85,0 ± 2,51	76,0 - 91,0	351	84,2 ± 2,34	76,0 - 91,0	743	85,7 ± 2,34	81,0 - 91,0	113	84,6 ± 2,44	76,0 - 91,0	1207
	F	84,2 ± 2,13	79,0 - 88,0	147	83,5 ± 2,23	78,0 - 88,0	98	84,5 ± 2,03	80,0 - 89,0	61	84,0 ± 2,18	78,0 - 89,0	306
	M	86,2 ± 2,38	80,0 - 92,0	221	85,5 ± 2,13	80,0 - 91,0	140	86,9 ± 2,15	81,0 - 91,0	78	86,1 ± 2,31	80,0 - 92,0	439
	Tot.	85,2 ± 2,50	76,0 - 92,0	719	84,3 ± 2,36	76,0 - 91,0	981	85,8 ± 2,38	80,0 - 91,0	252	84,8 ± 2,47	76,0 - 92,0	1952
3RM	0	64,9 ± 2,08	58,0 - 71,0	273	64,4 ± 2,01	58,0 - 70,0	752	65,6 ± 1,90	60,5 - 70,0	103	64,6 ± 2,05	58,0 - 71,0	1128
	F	64,4 ± 1,69	57,0 - 68,0	147	63,4 ± 1,95	58,0 - 68,0	98	64,4 ± 1,51	60,0 - 67,5	60	64,1 ± 1,80	57,0 - 68,0	305
	M	65,9 ± 1,90	61,0 - 70,0	217	65,1 ± 1,72	60,5 - 70,0	138	66,8 ± 1,66	60,5 - 71,0	69	65,8 ± 1,88	60,5 - 71,0	424
	Tot.	65,1 ± 2,03	57,0 - 71,0	637	64,4 ± 2,01	58,0 - 70,0	988	65,6 ± 1,95	60,0 - 71,0	232	64,8 ± 2,06	57,0 - 71,0	1857
Tarso	0	27,3 ± 0,94	25,0 - 29,5	206	26,9 ± 0,88	24,0 - 29,8	438	27,4 ± 0,90	25,3 - 29,7	48	27,0 ± 0,92	24,0 - 29,8	692
	F	26,7 ± 0,89	24,0 - 29,0	91	26,8 ± 0,81	25,0 - 28,5	63	27,1 ± 0,96	25,5 - 29,1	31	26,8 ± 0,88	24,0 - 29,1	185
	M	26,9 ± 0,91	24,0 - 29,5	141	27,1 ± 0,81	25,5 - 29,3	75	27,2 ± 0,78	25,5 - 29,0	51	27,0 ± 0,86	24,0 - 29,5	267
	Tot.	27,0 ± 0,94	24,0 - 29,5	438	26,9 ± 0,87	24,0 - 29,8	576	27,2 ± 0,87	25,3 - 29,7	130	27,0 ± 0,90	24,0 - 29,8	1144
Peso	0	22,6 ± 3,45	16,3 - 37,8	361	21,4 ± 2,62	15,1 - 35,5	820	21,3 ± 2,57	17,0 - 34,0	106	21,8 ± 2,92	15,1 - 37,8	1287
	F	22,0 ± 2,71	16,5 - 30,6	151	21,8 ± 2,59	17,5 - 28,0	99	22,3 ± 2,27	17,5 - 27,2	61	22,0 ± 2,59	16,5 - 30,6	311
	M	21,7 ± 1,46	17,7 - 27,5	235	21,1 ± 1,31	18,2 - 24,5	143	21,7 ± 1,71	19,2 - 29,0	76	21,5 ± 1,49	17,7 - 29,0	454
	Tot.	22,2 ± 2,84	16,3 - 37,8	747	21,4 ± 2,49	15,1 - 35,5	1062	21,7 ± 2,28	17,0 - 34,0	243	21,7 ± 2,62	15,1 - 37,8	2052

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	85,8 ± 2,79	80,0 - 92,0	65	86,1 ± 2,36	78,0 - 91,0	906	85,3 ± 1,53	84,0 - 87,0	3	86,1 ± 2,39	78,0 - 92,0	974
	F	84,4 ± 2,48	78,0 - 89,0	72	84,2 ± 2,25	79,0 - 87,0	34				84,3 ± 2,40	78,0 - 89,0	106
	M	87,4 ± 2,32	81,0 - 92,0	65	87,7 ± 2,72	80,0 - 92,0	33	88,9 ± 1,14	87,0 - 90,0	11	87,6 ± 2,39	80,0 - 92,0	109
	Tot.	85,8 ± 2,81	78,0 - 92,0	202	86,1 ± 2,41	78,0 - 92,0	973	88,1 ± 1,92	84,0 - 90,0	14	86,1 ± 2,49	78,0 - 92,0	1189
3RM	0	65,4 ± 2,59	59,5 - 71,0	64	66,0 ± 2,12	58,0 - 71,0	857	65,3 ± 1,53	64,0 - 67,0	3	66,0 ± 2,16	58,0 - 71,0	924
	F	64,8 ± 2,02	59,0 - 69,0	63	64,8 ± 2,01	59,0 - 67,5	36				64,8 ± 2,01	59,0 - 69,0	99
	M	67,1 ± 1,48	64,0 - 70,5	58	67,1 ± 2,41	60,5 - 72,0	33	68,1 ± 1,34	66,0 - 70,5	11	67,2 ± 1,83	60,5 - 72,0	102
	Tot.	65,7 ± 2,30	59,0 - 71,0	185	66,0 ± 2,15	58,0 - 72,0	926	67,5 ± 1,78	64,0 - 70,5	14	66,0 ± 2,18	58,0 - 72,0	1125
Tarso	0	23,5 ± 0,97	21,9 - 25,0	23	23,4 ± 0,86	21,1 - 25,5	331		23,0	1	23,4 ± 0,86	21,1 - 25,5	355
	F	23,2 ± 0,79	21,5 - 24,5	33	23,3 ± 0,65	21,5 - 24,4	25				23,2 ± 0,73	21,5 - 24,5	58
	M	23,8 ± 1,11	21,1 - 25,6	29	23,8 ± 0,80	23,0 - 25,5	16	23,6 ± 0,63	22,5 - 24,5	8	23,8 ± 0,95	21,1 - 25,6	53
	Tot.	23,5 ± 0,98	21,1 - 25,6	85	23,4 ± 0,84	21,1 - 25,5	372	23,5 ± 0,62	22,5 - 24,5	9	23,4 ± 0,87	21,1 - 25,6	466
Peso	0	16,6 ± 1,39	13,0 - 20,6	68	16,6 ± 1,28	11,2 - 24,0	924	15,7 ± 1,39	14,5 - 17,2	3	16,6 ± 1,28	11,2 - 24,0	995
	F	16,2 ± 1,33	13,9 - 19,6	75	16,1 ± 1,75	13,3 - 20,5	36				16,2 ± 1,47	13,3 - 20,5	111
	M	17,3 ± 1,36	14,8 - 23,7	69	16,3 ± 1,03	14,5 - 18,5	32	17,3 ± 1,22	15,7 - 19,7	11	17,0 ± 1,32	14,5 - 23,7	112
	Tot.	16,7 ± 1,42	13,0 - 23,7	212	16,6 ± 1,29	11,2 - 24,0	992	16,9 ± 1,38	14,5 - 19,7	14	16,6 ± 1,32	11,2 - 24,0	1218

Codirosso comune *Phoenicurus phoenicurus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	79,5 ± 2,52	76,0 - 82,0	4	79,1 ± 2,18	75,0 - 85,0	67				79,2 ± 2,18	75,0 - 85,0	71
	F	79,2 ± 2,35	74,0 - 84,0	42	79,5 ± 1,90	75,0 - 84,0	63	82,2 ± 3,03	77,0 - 84,0	5	79,5 ± 2,19	74,0 - 84,0	110
	M	81,5 ± 1,75	77,0 - 85,0	32	81,0 ± 1,79	76,0 - 85,0	136		83,0	1	81,1 ± 1,79	76,0 - 85,0	169
	Tot.	80,2 ± 2,37	74,0 - 85,0	78	80,2 ± 2,01	75,0 - 85,0	266	82,3 ± 2,73	77,0 - 84,0	6	80,2 ± 2,18	74,0 - 85,0	350
3RM	0	60,5 ± 1,55	58,0 - 62,5	6	61,0 ± 1,65	58,0 - 66,0	68				61,0 ± 1,64	58,0 - 66,0	74
	F	60,6 ± 1,57	57,0 - 65,0	38	60,4 ± 1,65	57,0 - 64,4	66	61,8 ± 2,46	59,5 - 65,5	6	60,5 ± 1,68	57,0 - 65,5	110
	M	62,1 ± 1,53	59,0 - 66,0	29	62,0 ± 1,54	58,0 - 65,5	141		63,0	1	62,0 ± 1,53	58,0 - 66,0	171
	Tot.	61,2 ± 1,70	57,0 - 66,0	73	61,4 ± 1,73	57,0 - 66,0	275	61,9 ± 2,30	59,5 - 65,5	7	61,3 ± 1,73	57,0 - 66,0	355
Tarsio	0		21,2 - 22,6	2	22,0 ± 0,78	20,1 - 23,8	37				22,0 ± 0,78	20,1 - 23,8	39
	F	21,9 ± 0,70	20,5 - 23,0	22	22,1 ± 0,76	20,6 - 24,0	24	22,8 ± 0,39	22,5 - 23,3	4	22,1 ± 0,74	20,5 - 24,0	50
	M	22,2 ± 0,80	21,0 - 23,7	18	22,1 ± 0,65	20,5 - 24,1	67				22,1 ± 0,68	20,5 - 24,1	85
	Tot.	22,0 ± 0,74	20,5 - 23,7	42	22,1 ± 0,71	20,1 - 24,1	128	22,8 ± 0,39	22,5 - 23,3	4	22,1 ± 0,72	20,1 - 24,1	174
Peso	0	14,6 ± 2,05	12,0 - 18,7	7	14,8 ± 1,37	12,2 - 18,4	71				14,8 ± 1,43	12,0 - 18,7	78
	F	15,1 ± 1,72	12,0 - 21,2	44	15,2 ± 1,58	12,5 - 19,9	66	14,6 ± 1,15	13,4 - 15,8	6	15,1 ± 1,61	12,0 - 21,2	116
	M	15,9 ± 2,35	12,5 - 20,8	31	15,1 ± 1,63	12,2 - 21,5	141		16,6	1	15,2 ± 1,80	12,2 - 21,5	173
	Tot.	15,4 ± 2,03	12,0 - 21,2	82	15,0 ± 1,55	12,2 - 21,5	278	14,9 ± 1,29	13,4 - 16,6	7	15,1 ± 1,67	12,0 - 21,5	367

Stiaccino *Saxicola rubetra*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	74,9 ± 3,30	70,0 - 78,0	9	76,5 ± 2,17	69,0 - 81,5	126				76,4 ± 2,28	69,0 - 81,5	135
	F	75,7 ± 2,46	70,0 - 80,0	23	76,3 ± 2,06	71,5 - 80,0	59		73,0	1	76,1 ± 2,20	70,0 - 80,0	83
	M	76,4 ± 2,24	72,0 - 79,0	9	77,7 ± 2,04	72,0 - 83,5	77		78,0	1	77,6 ± 2,08	72,0 - 83,5	87
	Tot.	75,7 ± 2,60	70,0 - 80,0	41	76,8 ± 2,18	69,0 - 83,5	262		73,0 - 78,0	2	76,6 ± 2,28	69,0 - 83,5	305
3RM	0	56,3 ± 2,08	54,0 - 58,0	3	57,3 ± 1,77	51,0 - 61,5	120				57,2 ± 1,77	51,0 - 61,5	123
	F	56,7 ± 1,86	53,0 - 60,0	18	56,9 ± 1,57	53,5 - 60,0	58		55,0 - 55	1	56,8 ± 1,63	53,0 - 60,0	77
	M	57,8 ± 1,30	56,0 - 59,0	5	58,0 ± 1,61	54,5 - 62,5	79		58,0 - 58	1	57,9 ± 1,57	54,5 - 62,5	85
	Tot.	56,9 ± 1,78	53,0 - 60,0	26	57,4 ± 1,72	51,0 - 62,5	257		55,0 - 58,0	2	57,3 ± 1,73	51,0 - 62,5	285
Tarsio	0	21,8 ± 0,75	21,0 - 23,0	5	22,1 ± 0,82	19,4 - 23,9	92				22,1 ± 0,81	19,4 - 23,9	97
	F	22,0 ± 0,78	20,6 - 23,4	19	21,8 ± 1,02	19,6 - 24,0	39		22,9 - 22,9	1	21,9 ± 0,95	19,6 - 24,0	59
	M	23,1 ± 0,57	22,5 - 24,0	10	22,1 ± 0,78	20,4 - 24,2	61		23,1 - 23,1	1	22,2 ± 0,83	20,4 - 24,2	72
	Tot.	22,3 ± 0,89	20,6 - 24,0	34	22,1 ± 0,85	19,4 - 24,2	192		22,9 - 23,1	2	22,1 ± 0,86	19,4 - 24,2	228
Peso	0	15,7 ± 1,28	13,5 - 17,0	7	16,6 ± 1,79	13,4 - 22,7	132				16,6 ± 1,77	13,4 - 22,7	139
	F	16,9 ± 1,86	13,2 - 22,9	33	16,4 ± 2,22	12,6 - 22,5	57		15,4 - 15,4	1	16,5 ± 2,09	12,6 - 22,9	91
	M	16,5 ± 1,52	14,3 - 20,0	15	16,2 ± 1,30	13,7 - 19,8	78		13,8 - 13,8	1	16,2 ± 1,35	13,7 - 20,0	94
	Tot.	16,7 ± 1,73	13,2 - 22,9	55	16,5 ± 1,77	12,6 - 22,7	267		13,8 - 15,4	2	16,5 ± 1,77	12,6 - 22,9	324

Saltimpalo *Saxicola torquatus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0				64,3 ± 1,78	62,0 - 67,5	12		63,0	1	64,2 ± 1,74	62,0 - 67,5	13
	F	65,5 ± 1,22	64,0 - 67,0	6	65,0 ± 1,25	64,0 - 68,0	10	63,5 ± 1,00	63,0 - 65,0	4	64,8 ± 1,35	63,0 - 68,0	20
	M	66,0 ± 2,08	64,0 - 70,0	7	66,0 ± 1,28	64,0 - 69,0	18	66,6 ± 2,38	64,0 - 69,0	5	66,1 ± 1,64	64,0 - 70,0	30
	Tot.	65,8 ± 1,69	64,0 - 70,0	13	65,2 ± 1,58	62,0 - 69,0	40	65,0 ± 2,39	63,0 - 69,0	10	65,3 ± 1,74	62,0 - 70,0	63
3RM	0				48,6 ± 1,29	46,5 - 51,0	10		48,0	1	48,5 ± 1,23	46,5 - 51,0	11
	F	48,8 ± 1,04	47,0 - 49,5	5	49,4 ± 0,46	49,0 - 50,0	9	48,2 ± 0,87	47,5 - 49,5	4	49,0 ± 0,86	47,0 - 50,0	18
	M	50,1 ± 0,66	49,0 - 51,0	6	49,7 ± 0,66	49,0 - 51,0	17	50,2 ± 1,64	49,0 - 52,0	5	49,9 ± 0,89	49,0 - 52,0	28
	Tot.	49,5 ± 1,05	47,0 - 51,0	11	49,3 ± 0,95	46,5 - 51,0	36	49,2 ± 1,60	47,5 - 52,0	10	49,4 ± 1,09	46,5 - 52,0	57
Tarsio	0				22,6 ± 0,78	21,3 - 24,0	14		22,0	1	22,6 ± 0,77	21,3 - 24,0	15
	F	22,1 ± 1,01	21,0 - 23,0	3	22,5 ± 0,46	22,0 - 23,1	8	22,2 ± 0,74	21,2 - 23,0	5	22,3 ± 0,64	21,0 - 23,1	16
	M	22,4 ± 0,85	21,6 - 23,9	6	22,6 ± 0,76	20,8 - 23,8	14	22,2 ± 0,64	21,8 - 22,9	3	22,5 ± 0,75	20,8 - 23,9	23
	Tot.	22,3 ± 0,86	21,0 - 23,9	9	22,6 ± 0,70	20,8 - 24,0	36	22,2 ± 0,61	21,2 - 23,0	9	22,5 ± 0,72	20,8 - 24,0	54
Peso	0				13,7 ± 1,12	12,1 - 16,0	14		13,8	1	13,7 ± 1,08	12,1 - 16,0	15
	F	14,4 ± 1,48	12,5 - 16,4	6	13,8 ± 1,55	12,4 - 16,9	7	13,2 ± 0,88	12,4 - 14,3	5	13,8 ± 1,38	12,4 - 16,9	18
	M	13,4 ± 1,15	12,5 - 15,9	8	14,2 ± 1,04	11,9 - 15,6	18	14,8 ± 1,28	13,2 - 16,0	5	14,1 ± 1,17	11,9 - 16,0	31
	Tot.	13,8 ± 1,36	12,5 - 16,4	14	13,9 ± 1,17	11,9 - 16,9	39	14,0 ± 1,27	12,4 - 16,0	11	13,9 ± 1,21	11,9 - 16,9	64

Culbianco *Oenanthe oenanthe*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.			n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	93,0	1	95,4 ± 2,16	91,0 - 101,0		35				95,3 ± 2,17	91,0 - 101,0	36
	F	93,1 ± 2,35	7	96,2 ± 3,01	93,0 - 99,0		3				94,0 ± 2,82	90,0 - 99,0	10
	M	97,7 ± 1,51	6	96,6 ± 1,95	94,0 - 99,0		5		97,0 - 103,0	2	97,6 ± 2,26	94,0 - 103,0	13
	Tot.	95,0 ± 3,00	14	95,6 ± 2,18	91,0 - 101,0		43		97,0 - 103,0	2	95,6 ± 2,55	90,0 - 103,0	59
3RM	0	69,0 - 69	1	72,1 ± 1,89	68,5 - 76,0		35				72,0 ± 1,94	68,5 - 76,0	36
	F	70,8 ± 1,92	5	70,8 ± 3,30	67,0 - 74,0		4				70,8 ± 2,44	67,0 - 74,0	9
	M	73,2 ± 1,94	6	71,8 ± 1,78	70,0 - 74,0		6		72,5 - 77,0	2	72,8 ± 2,15	70,0 - 77,0	14
	Tot.	71,9 ± 2,32	12	71,9 ± 2,01	67,0 - 76,0		45		72,5 - 77,0	2	72,0 ± 2,13	67,0 - 77,0	59
Tarso	0	27,5 - 27,5	1	27,0 ± 0,97	25,3 - 28,5		15				27,0 ± 0,95	25,3 - 28,5	16
	F	27,2 ± 0,99	2		26,3 - 27,0		2				26,9 ± 0,71	26,3 - 27,9	4
	M	27,0 ± 0,45	3	27,8 ± 0,66	27,1 - 28,4		3		26,8 - 27,0	2	27,3 ± 0,62	26,5 - 28,4	8
	Tot.	27,1 ± 0,57	6	27,1 ± 0,93	25,3 - 28,5		20		26,8 - 27,0	2	27,1 ± 0,82	25,3 - 28,5	28
Peso	0	24,5 - 24,5	1	25,6 ± 1,85	22,2 - 29,8		37				25,6 ± 1,84	22,2 - 29,8	38
	F	24,2 ± 3,21	9	23,6 ± 6,63	16,7 - 29,4		4				24,0 ± 4,24	16,7 - 30,0	13
	M	26,0 ± 2,91	7	24,6 ± 4,35	20,3 - 32,7		6		22,0 - 25,2	2	25,2 ± 3,41	20,3 - 32,7	15
	Tot.	25,0 ± 3,03	17	25,3 ± 2,83	16,7 - 32,7		47		22,0 - 25,2	2	25,2 ± 2,84	16,7 - 32,7	66

Merlo *Turdus merula*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.			n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	123,8 ± 4,99	28	123,3 ± 3,53	110,0 - 133,0		1151	127,2 ± 2,93	123,0 - 130,0	6	123,3 ± 3,58	110,0 - 133,5	1185
	F	123,0 ± 4,39	680	122,5 ± 3,45	110,0 - 136,0		1367	123,0 ± 3,19	114,0 - 133,0	557	122,8 ± 3,67	110,0 - 138,0	2604
	M	128,0 ± 4,66	557	126,0 ± 3,49	113,0 - 137,0		2022	128,0 ± 3,29	117,0 - 138,5	739	126,7 ± 3,80	113,0 - 141,0	3318
	Tot.	125,2 ± 5,15	1265	124,3 ± 3,81	110,0 - 137,0		4540	125,8 ± 4,06	114,0 - 138,5	1302	124,7 ± 4,18	110,0 - 141,0	7107
3RM	0	92,5 ± 4,97	15	92,3 ± 2,93	81,5 - 101,0		1087		91,0 - 97,0	2	92,3 ± 2,97	81,5 - 101,0	1104
	F	93,0 ± 3,20	462	91,6 ± 2,94	82,0 - 105,0		1338	92,2 ± 2,66	83,0 - 100,0	549	92,0 ± 2,98	82,0 - 105,0	2349
	M	96,9 ± 3,64	404	94,3 ± 2,83	85,0 - 111,0		1876	96,0 ± 2,73	85,0 - 111,0	689	95,0 ± 3,01	85,0 - 111,0	2969
	Tot.	94,8 ± 3,96	881	92,9 ± 3,14	81,5 - 111,0		4301	94,3 ± 3,30	83,0 - 111,0	1240	93,5 ± 3,38	81,5 - 111,0	6422
Tarso	0	33,3 ± 1,77	19	33,0 ± 1,17	29,5 - 37,5		814		31,6 - 33,4	2	33,0 ± 1,19	29,5 - 37,5	835
	F	33,1 ± 1,19	360	32,9 ± 1,12	29,5 - 37,5		643	33,0 ± 1,17	29,5 - 37,0	367	33,0 ± 1,16	29,5 - 37,5	1370
	M	33,2 ± 1,11	294	33,2 ± 1,13	29,5 - 37,4		951	33,2 ± 1,12	29,5 - 37,5	459	33,2 ± 1,12	29,5 - 37,5	1704
	Tot.	33,1 ± 1,18	673	33,0 ± 1,15	29,5 - 37,5		2408	33,1 ± 1,14	29,5 - 37,5	828	33,1 ± 1,15	29,5 - 37,5	3909
Peso	0	82,3 ± 8,78	30	79,2 ± 5,73	62,5 - 99,8		1245	86,6 ± 7,80	77,0 - 97,0	5	79,3 ± 5,86	62,5 - 114,6	1280
	F	84,0 ± 6,89	675	82,9 ± 6,28	64,5 - 107,0		1455	83,8 ± 6,47	67,0 - 115,0	572	83,4 ± 6,49	64,5 - 115,0	2702
	M	84,9 ± 6,52	607	83,5 ± 6,01	64,0 - 110,0		2070	81,3 ± 5,43	69,0 - 110,0	741	83,2 ± 6,09	64,0 - 110,0	3418
	Tot.	84,4 ± 6,79	1312	82,2 ± 6,28	62,5 - 110,0		4770	82,4 ± 6,04	67,0 - 115,0	1318	82,6 ± 6,38	62,5 - 115,0	7400

Cesena *Turdus pilaris*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.			n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	149,2 ± 4,17	11		145,0 - 149,0		2				148,8 ± 3,98	142,0 - 155,0	13
	F	147,0 ± 3,89	31	146,4 ± 3,42	138,0 - 154,0		77	146,7 ± 2,52	141,0 - 150,0	18	146,6 ± 3,42	138,0 - 155,0	126
	M	150,9 ± 3,18	49	148,5 ± 3,15	141,0 - 156,0		62	151,3 ± 2,23	146,0 - 155,0	19	149,8 ± 3,28	141,0 - 156,0	130
	Tot.	149,4 ± 3,95	91	147,3 ± 3,44	138,0 - 156,0		141	149,0 ± 3,30	141,0 - 155,0	37	148,3 ± 3,72	138,0 - 156,0	269
3RM	0	112,0 ± 4,26	8		111,0 - 113,5		2				112,0 ± 3,81	104,0 - 116,0	10
	F	110,1 ± 3,50	29	109,9 ± 3,47	101,5 - 119,0		74	110,0 ± 2,51	105,0 - 113,0	18	110,0 ± 3,33	101,5 - 119,0	121
	M	113,6 ± 3,50	48	111,8 ± 2,85	104,0 - 118,0		59	114,0 ± 3,99	102,0 - 119,5	20	112,8 ± 3,41	102,0 - 120,0	127
	Tot.	112,3 ± 3,88	85	110,8 ± 3,32	101,5 - 119,0		135	112,1 ± 3,88	102,0 - 119,5	38	111,5 ± 3,66	101,5 - 120,0	258
Tarso	0	32,9 ± 1,23	6		33,0		1				32,9 ± 1,13	30,7 - 34,2	7
	F				32,5 - 33,0		2					32,5 - 33,0	2
	M		34,3	1		34,0		1				34,0 - 34,3	2
	Tot.	33,1 ± 1,25	7	33,1 ± 0,63	32,5 - 34,0		4				33,1 ± 1,03	30,7 - 34,3	11
Peso	0	102,1 ± 10,08	10		96,0 - 105,0		2				101,8 ± 9,34	89,0 - 117,0	12
	F	100,1 ± 6,42	31	99,6 ± 6,32	76,0 - 117,0		77	102,1 ± 4,08	96,1 - 114,0	18	100,1 ± 6,01	76,0 - 117,0	126
	M	101,8 ± 5,66	51	100,3 ± 5,82	83,0 - 112,0		62	105,9 ± 5,33	99,0 - 116,0	20	101,7 ± 5,95	83,0 - 116,0	133
	Tot.	101,3 ± 6,47	92	99,9 ± 6,07	76,0 - 117,0		141	104,1 ± 5,10	96,1 - 116,0	38	101,0 ± 6,23	76,0 - 117,0	271

Tordo bottaccio *Turdus philomelos*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	119,2 ± 3,08	110,0 - 128,0	624	119,0 ± 2,74	110,0 - 128,0	1942	120,2 ± 2,76	115,0 - 127,0	53	119,1 ± 2,83	110,0 - 128,0	2619
	F	116,3 ± 5,13	112,0 - 122,0	3	118,8 ± 4,50	115,0 - 125,0	4		121,0	1	118,1 ± 4,36	112,0 - 125,0	8
	M	116,7 ± 4,93	111,0 - 120,0	3	117,3 ± 3,93	111,0 - 122,0	6				118,0 ± 4,45	111,0 - 126,0	11
	Tot.	119,2 ± 3,10	110,0 - 128,0	630	119,0 ± 2,75	110,0 - 128,0	1952	120,2 ± 2,81	115,0 - 127,0	56	119,1 ± 2,84	110,0 - 128,0	2638
3RM	0	89,8 ± 2,50	82,5 - 98,0	533	89,1 ± 2,35	81,5 - 98,5	2277	89,8 ± 2,45	85,0 - 95,0	54	89,2 ± 2,39	81,5 - 98,5	2864
	F		87,0 - 91,0	2	89,8 ± 1,50	88,0 - 91,0	4		92,0	1	89,9 ± 1,86	87,0 - 92,0	7
	M		88,0	1	88,7 ± 2,86	85,0 - 93,5	7		96,0	1	89,4 ± 3,50	85,0 - 96,0	9
	Tot.	89,8 ± 2,50	82,5 - 98,0	536	89,1 ± 2,35	81,5 - 98,5	2288	89,9 ± 2,56	85,0 - 96,0	56	89,2 ± 2,40	81,5 - 98,5	2880
Tarsio	0	32,3 ± 1,16	29,0 - 35,0	111	32,4 ± 1,13	28,5 - 36,0	359	31,9 ± 1,25	30,0 - 34,4	12	32,4 ± 1,14	28,5 - 36,0	482
	F		33,0 - 33,5	2		31,0 - 33,2	2				32,7 ± 1,14	31,0 - 33,5	4
	M		33,0 - 33,6	2	32,0 ± 1,01	30,7 - 32,9	4		33,5	1	32,6 ± 1,03	30,7 - 33,6	7
	Tot.	32,4 ± 1,15	29,0 - 35,0	115	32,4 ± 1,13	28,5 - 36,0	365	32,1 ± 1,27	30,0 - 34,4	13	32,4 ± 1,14	28,5 - 36,0	493
Peso	0	67,3 ± 5,41	55,0 - 87,0	698	67,1 ± 5,25	49,0 - 88,0	2329	68,3 ± 5,40	58,0 - 77,5	54	67,1 ± 5,29	49,0 - 88,0	3081
	F	72,5 ± 4,77	69,5 - 78,0	3	76,5 ± 5,45	72,0 - 84,0	4		63,0	1	73,3 ± 6,36	63,0 - 84,0	8
	M		67,0 - 74,0	2	66,1 ± 3,64	61,0 - 72,0	7		61,0 - 64,5	2	66,3 ± 4,13	61,0 - 74,0	11
	Tot.	67,3 ± 5,41	55,0 - 87,0	703	67,1 ± 5,26	49,0 - 88,0	2340	68,0 ± 5,41	58,0 - 77,5	57	67,1 ± 5,30	49,0 - 88,0	3100

Tordo sassello *Turdus iliacus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	119,7 ± 3,29	110,0 - 128,0	304	119,2 ± 2,78	111,0 - 128,0	980	119,6 ± 2,93	114,0 - 124,0	13	119,3 ± 2,91	110,0 - 128,0	1297
	F												
	M												
	Tot.	119,7 ± 3,29	110,0 - 128,0	304	119,2 ± 2,78	111,0 - 128,0	980	119,6 ± 2,93	114,0 - 124,0	13	119,3 ± 2,91	110,0 - 128,0	1297
3RM	0	90,4 ± 2,62	82,0 - 98,0	296	89,4 ± 2,43	80,0 - 96,5	1019	89,0 ± 2,61	84,0 - 93,0	14	89,6 ± 2,51	80,0 - 98,0	1329
	F												
	M		89,5	1								89,5	1
	Tot.	90,4 ± 2,62	82,0 - 98,0	297	89,4 ± 2,43	80,0 - 96,5	1019	89,0 ± 2,61	84,0 - 93,0	14	89,6 ± 2,51	80,0 - 98,0	1330
Tarsio	0	29,0 ± 0,91	27,3 - 31,0	26	29,0 ± 1,13	26,0 - 31,0	50				29,0 ± 1,06	26,0 - 31,0	76
	F												
	M												
	Tot.	29,0 ± 0,91	27,3 - 31,0	26	29,0 ± 1,13	26,0 - 31,0	50				29,0 ± 1,06	26,0 - 31,0	76
Peso	0	60,5 ± 4,46	51,0 - 80,0	363	60,0 ± 4,12	48,8 - 79,0	1049	63,0 ± 5,68	54,0 - 72,5	14	60,1 ± 4,24	48,8 - 80,0	1426
	F												
	M		59,5	1								59,5	1
	Tot.	60,5 ± 4,45	51,0 - 80,0	364	60,0 ± 4,12	48,8 - 79,0	1049	63,0 ± 5,68	54,0 - 72,5	14	60,1 ± 4,24	48,8 - 80,0	1427

Tordela *Turdus viscivorus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	152,9 ± 4,17	146,0 - 161,0	15	154,8 ± 4,31	147,0 - 163,0	50	153,5 ± 0,71	153,0 - 154,0	2	154,4 ± 4,25	146,0 - 163,0	67
	F		153,0 - 153,0	2		153,0 - 156,0	2		159,0	1	154,8 ± 2,68	153,0 - 159,0	5
	M								155,0 - 161,0	2		155,0 - 161,0	2
	Tot.	152,9 ± 3,90	146,0 - 161,0	17	154,8 ± 4,23	147,0 - 163,0	52	156,4 ± 3,44	153,0 - 161,0	5	154,5 ± 4,17	146,0 - 163,0	74
3RM	0	117,7 ± 3,06	114,0 - 122,0	14	116,6 ± 3,99	110,0 - 123,0	51		114,5 - 116,0	2	116,8 ± 3,77	110,0 - 123,0	67
	F		115,0 - 115,0	2		113,5 - 116,0	2		121,5	1	116,2 ± 3,09	113,5 - 121,5	5
	M								117,0 - 124,0	2		117,0 - 124,0	2
	Tot.	117,4 ± 2,99	114,0 - 122,0	16	116,5 ± 3,93	110,0 - 123,0	53	118,6 ± 3,99	114,5 - 124,0	5	116,8 ± 3,75	110,0 - 124,0	74
Tarsio	0	33,9 ± 0,73	33,0 - 35,0	6	33,6 ± 0,97	32,0 - 35,4	37		32,1	1	33,6 ± 0,96	32,0 - 35,4	44
	F								34,2	1		34,2	1
	M												
	Tot.	33,9 ± 0,73	33,0 - 35,0	6	33,6 ± 0,97	32,0 - 35,4	37	33,1 ± 1,48	32,1 - 34,2	2	33,7 ± 0,95	32,0 - 35,4	45
Peso	0	110,6 ± 8,98	102,0 - 136,0	17	108,5 ± 9,39	91,0 - 134,0	57		101,0 - 110,0	2	108,9 ± 9,20	91,0 - 136,0	76
	F		98,0 - 114,0	2		130,0	1		115,0	1	114,2 ± 13,07	98,0 - 130,0	4
	M								108,0 - 131,0	2		108,0 - 131,0	2
	Tot.	110,1 ± 9,00	98,0 - 136,0	19	108,9 ± 9,73	91,0 - 134,0	58	113,0 ± 11,25	101,0 - 131,0	5	109,4 ± 9,59	91,0 - 136,0	82

Usignolo di fiume *Cettia cetti*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	59,2 ± 3,10	54,0 - 67,5	89	60,2 ± 3,27	54,0 - 67,5	29				59,5 ± 3,16	54,0 - 67,5	118
	F	55,3 ± 1,13	51,0 - 57,0	85	55,7 ± 1,39	52,0 - 57,0	30		56,0 - 57,0	2	55,4 ± 1,22	51,0 - 57,0	117
	M	63,0 ± 1,66	60,0 - 67,0	99	62,9 ± 1,20	60,0 - 66,0	55		63,0	1	63,0 ± 1,51	60,0 - 67,0	155
	Tot.	59,4 ± 3,82	51,0 - 67,5	273	60,3 ± 3,58	52,0 - 67,5	114	58,7 ± 3,79	56,0 - 63,0	3	59,6 ± 3,77	51,0 - 67,5	390
3RM	0	44,0 ± 2,63	40,0 - 51,0	84	45,2 ± 2,95	40,5 - 51,5	28				44,3 ± 2,75	40,0 - 51,5	112
	F	41,3 ± 1,11	38,5 - 43,5	81	41,3 ± 0,84	40,0 - 43,0	27		42,0 - 42,5	2	41,3 ± 1,05	38,5 - 43,5	110
	M	47,1 ± 1,32	45,0 - 50,0	93	46,7 ± 1,10	44,5 - 49,0	55		47,0	1	47,0 ± 1,26	44,5 - 50,0	149
	Tot.	44,3 ± 2,99	38,5 - 51,0	258	45,0 ± 2,81	40,0 - 51,5	110	43,8 ± 2,75	42,0 - 47,0	3	44,5 ± 2,95	38,5 - 51,5	371
Tarso	0	20,9 ± 1,18	19,4 - 23,7	58	21,0 ± 1,03	19,4 - 22,8	27				20,9 ± 1,13	19,4 - 23,7	85
	F	20,2 ± 0,66	18,6 - 21,8	76	20,2 ± 0,41	19,3 - 20,9	27				20,2 ± 0,60	18,6 - 21,8	103
	M	21,9 ± 0,65	19,9 - 23,9	75	21,9 ± 0,61	19,0 - 23,0	53		21,6	1	21,9 ± 0,63	19,0 - 23,9	129
	Tot.	21,0 ± 1,13	18,6 - 23,9	209	21,2 ± 1,01	19,0 - 23,0	107		21,6	1	21,1 ± 1,09	18,6 - 23,9	317
Peso	0	12,7 ± 1,91	9,5 - 16,4	83	13,5 ± 2,85	10,0 - 22,0	32				13,0 ± 2,22	9,5 - 22,0	115
	F	11,3 ± 0,84	8,8 - 14,5	87	11,2 ± 0,77	9,8 - 12,4	29		12,2 - 13,8	2	11,3 ± 0,86	8,8 - 14,5	118
	M	14,9 ± 1,02	12,3 - 17,6	97	14,8 ± 1,55	12,6 - 21,5	56		14,5	1	14,8 ± 1,23	12,3 - 21,5	154
	Tot.	13,1 ± 1,97	8,8 - 17,6	267	13,6 ± 2,38	9,8 - 22,0	117	13,5 ± 1,18	12,2 - 14,5	3	13,2 ± 2,11	8,8 - 22,0	387

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	66,1 ± 1,45	64,0 - 68,0	8	65,3 ± 1,81	62,0 - 68,5	20	65,5 ± 1,73	62,0 - 68,5	28
	F		63,0	1					63,0 - 63	1
	M		67,0	1					67,0 - 67	1
	Tot.	65,8 ± 1,65	63,0 - 68,0	10	65,3 ± 1,81	62,0 - 68,5	20	65,5 ± 1,75	62,0 - 68,5	30
3RM	0	49,2 ± 2,10	47,3 - 53,0	8	48,5 ± 1,68	44,0 - 51,5	21	48,7 ± 1,80	44,0 - 53,0	29
	F		46,5 - 46,5	1					46,5 - 46,5	1
	M		45,0 - 45	1					45,0 - 45	1
	Tot.	48,5 ± 2,39	45,0 - 53,0	10	48,5 ± 1,68	44,0 - 51,5	21	48,5 ± 1,90	44,0 - 53,0	31
Tarso	0	20,4 ± 0,95	19,2 - 22,0	7	19,7 ± 0,75	18,2 - 20,8	18	19,9 ± 0,85	18,2 - 22,0	25
	F		18,8 - 18,8	1					18,8 - 18,8	1
	M		20,3 - 20,3	1					20,3 - 20,3	1
	Tot.	20,2 ± 0,97	18,8 - 22,0	9	19,7 ± 0,75	18,2 - 20,8	18	19,8 ± 0,85	18,2 - 22,0	27
Peso	0	13,3 ± 1,88	10,0 - 15,4	8	13,7 ± 1,22	11,5 - 15,9	20	13,6 ± 1,42	10,0 - 15,9	28
	F		12,0 - 12	1					12,0 - 12	1
	M		11,9 - 11,9	1					11,9 - 11,9	1
	Tot.	13,0 ± 1,75	10,0 - 15,4	10	13,7 ± 1,22	11,5 - 15,9	20	13,5 ± 1,43	10,0 - 15,9	30

Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	67,3 ± 1,75	65,0 - 71,0	21	66,4 ± 2,31	60,5 - 73,0	59	66,6 ± 2,20	60,5 - 73,0	80
	F									
	M									
	Tot.	67,3 ± 1,75	65,0 - 71,0	21	66,4 ± 2,31	60,5 - 73,0	59	66,6 ± 2,20	60,5 - 73,0	80
3RM	0	51,5 ± 1,43	49,0 - 55,5	33	50,6 ± 1,89	47,0 - 55,5	61	50,9 ± 1,78	47,0 - 55,5	94
	F									
	M									
	Tot.	51,5 ± 1,43	49,0 - 55,5	33	50,6 ± 1,89	47,0 - 55,5	61	50,9 ± 1,78	47,0 - 55,5	94
Tarso	0	21,0 ± 0,51	19,8 - 22,0	31	20,9 ± 0,47	20,0 - 22,4	55	20,9 ± 0,49	19,8 - 22,4	86
	F									
	M									
	Tot.	21,0 ± 0,51	19,8 - 22,0	31	20,9 ± 0,47	20,0 - 22,4	55	20,9 ± 0,49	19,8 - 22,4	86
Peso	0	11,9 ± 1,38	9,5 - 15,5	31	11,6 ± 1,44	9,4 - 16,8	59	11,7 ± 1,41	9,4 - 16,8	90
	F									
	M									
	Tot.	11,9 ± 1,38	9,5 - 15,5	31	11,6 ± 1,44	9,4 - 16,8	59	11,7 ± 1,41	9,4 - 16,8	90

Cannaiola verdognola *Acrocephalus palustris*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	70,4 ± 1,95	64,0 - 76,0	371	67,8 ± 2,21	62,5 - 74,5	231	70,2 ± 0,96	69,0 - 71,0	4	69,4 ± 2,39	62,5 - 76,0	606
	F	69,2 ± 1,65	64,0 - 74,0	184					69,0 - 72,0	2	69,2 ± 1,66	64,0 - 74,0	186
	M	70,8 ± 1,67	64,5 - 76,0	179				70,0 ± 2,00	67,0 - 71,0	4	70,8 ± 1,68	64,5 - 76,0	183
	Tot.	70,2 ± 1,91	64,0 - 76,0	734	67,8 ± 2,21	62,5 - 74,5	231	70,2 ± 1,48	67,0 - 72,0	10	69,6 ± 2,21	62,5 - 76,0	975
3RM	0	53,9 ± 1,81	47,5 - 59,0	331	52,2 ± 2,22	47,0 - 59,0	223	53,6 ± 0,95	53,0 - 55,0	4	53,2 ± 2,15	47,0 - 59,0	558
	F	53,3 ± 1,44	50,0 - 57,0	176					52,0 - 52,0	2	53,3 ± 1,44	50,0 - 57,0	178
	M	54,4 ± 1,54	50,5 - 59,0	166				53,1 ± 1,44	51,5 - 55,0	4	54,4 ± 1,55	50,5 - 59,0	170
	Tot.	53,9 ± 1,70	47,5 - 59,0	673	52,2 ± 2,22	47,0 - 59,0	223	53,1 ± 1,17	51,5 - 55,0	10	53,4 ± 1,97	47,0 - 59,0	906
Tarsio	0	22,5 ± 0,85	19,8 - 25,0	266	22,0 ± 0,72	19,8 - 24,0	172	22,6 ± 0,31	22,1 - 22,8	4	22,3 ± 0,84	19,8 - 25,0	442
	F	22,0 ± 0,70	20,4 - 24,6	94					20,0 - 23,0	2	22,0 ± 0,73	20,0 - 24,6	96
	M	22,4 ± 0,74	20,7 - 24,6	95				22,4 ± 0,35	22,0 - 22,7	4	22,4 ± 0,73	20,7 - 24,6	99
	Tot.	22,4 ± 0,82	19,8 - 25,0	455	22,0 ± 0,72	19,8 - 24,0	172	22,3 ± 0,86	20,0 - 23,0	10	22,3 ± 0,81	19,8 - 25,0	637
Peso	0	12,4 ± 1,32	10,0 - 22,0	384	12,0 ± 1,09	10,0 - 16,4	257	14,8 ± 4,84	12,0 - 22,0	4	12,2 ± 1,30	10,0 - 22,0	645
	F	13,0 ± 1,43	9,0 - 19,0	183					12,4 - 14,0	2	13,0 ± 1,42	9,0 - 19,0	185
	M	12,3 ± 1,06	10,0 - 21,5	178				11,5 ± 0,45	11,0 - 11,9	3	12,3 ± 1,06	10,0 - 21,5	181
	Tot.	12,5 ± 1,32	9,0 - 22,0	745	12,0 ± 1,09	10,0 - 16,4	257	13,3 ± 3,37	11,0 - 22,0	9	12,4 ± 1,32	9,0 - 22,0	1011

Cannaiola comune *Acrocephalus scirpaceus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	67,1 ± 2,25	60,5 - 72,0	201	65,8 ± 1,98	60,5 - 71,5	938	66,1 ± 2,09	60,5 - 72,0	1139
	F	66,0 ± 2,01	62,0 - 71,0	89				66,0 ± 2,01	62,0 - 71,0	89
	M	67,2 ± 2,05	62,0 - 73,0	72				67,2 ± 2,05	62,0 - 73,0	72
	Tot.	66,9 ± 2,22	60,5 - 73,0	362	65,8 ± 1,98	60,5 - 71,5	938	66,1 ± 2,01	60,5 - 73,0	1300
3RM	0	52,0 ± 1,81	47,0 - 56,5	228	50,6 ± 1,69	46,0 - 57,0	948	50,9 ± 1,80	46,0 - 57,0	1176
	F	51,0 ± 1,40	48,0 - 54,5	105				51,0 ± 1,40	48,0 - 54,5	105
	M	52,1 ± 1,81	48,5 - 57,0	87				52,1 ± 1,81	48,5 - 57,0	87
	Tot.	51,8 ± 1,78	47,0 - 57,0	420	50,6 ± 1,69	46,0 - 57,0	948	51,0 ± 1,80	46,0 - 57,0	1368
Tarsio	0	22,6 ± 0,78	20,4 - 24,4	221	22,5 ± 0,74	20,1 - 24,7	878	22,5 ± 0,75	20,1 - 24,7	1099
	F	22,4 ± 0,69	20,5 - 24,3	100				22,4 ± 0,69	20,5 - 24,3	100
	M	22,4 ± 0,72	20,9 - 24,2	78				22,4 ± 0,72	20,9 - 24,2	78
	Tot.	22,5 ± 0,75	20,4 - 24,4	399	22,5 ± 0,74	20,1 - 24,7	878	22,5 ± 0,74	20,1 - 24,7	1277
Peso	0	11,7 ± 1,21	8,9 - 20,4	232	11,6 ± 1,17	9,1 - 18,3	965	11,6 ± 1,18	8,9 - 20,4	1197
	F	12,0 ± 0,97	9,7 - 15,0	106				12,0 ± 0,97	9,7 - 15,0	106
	M	11,7 ± 1,42	9,5 - 22,6	86				11,7 ± 1,42	9,5 - 22,6	86
	Tot.	11,7 ± 1,21	8,9 - 22,6	424	11,6 ± 1,17	9,1 - 18,3	965	11,6 ± 1,18	8,9 - 22,6	1389

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	96,7 ± 3,35	89,0 - 105,0	61	94,8 ± 2,90	88,5 - 105,0	54	95,8 ± 3,28	88,5 - 105,0	115
	F	94,0 ± 1,05	92,0 - 95,0	12				94,0 ± 1,05	92,0 - 95,0	12
	M	98,9 ± 2,06	95,0 - 102,0	14		98,5 - 101,0	2	99,0 ± 1,99	95,0 - 102,0	16
	Tot.	96,7 ± 3,22	89,0 - 105,0	87	95,0 ± 3,00	88,5 - 105,0	56	96,0 ± 3,24	88,5 - 105,0	143
3RM	0	73,8 ± 2,59	67,0 - 80,0	59	72,1 ± 2,86	67,0 - 79,5	54	73,0 ± 2,84	67,0 - 80,0	113
	F	72,3 ± 1,33	69,5 - 75,0	16				72,3 ± 1,33	69,5 - 75,0	16
	M	74,9 ± 1,60	72,5 - 78,0	17		76,0 - 76,5	2	75,1 ± 1,57	72,5 - 78,0	19
	Tot.	73,8 ± 2,38	67,0 - 80,0	92	72,3 ± 2,91	67,0 - 79,5	56	73,2 ± 2,68	67,0 - 80,0	148
Tarsio	0	28,6 ± 0,90	26,3 - 31,0	60	28,3 ± 0,87	26,3 - 31,0	54	28,5 ± 0,90	26,3 - 31,0	114
	F	27,6 ± 0,49	26,5 - 28,0	8				27,6 ± 0,49	26,5 - 28,0	8
	M	29,1 ± 0,70	27,9 - 30,1	15		27,8 - 29,0	2	29,1 ± 0,73	27,8 - 30,1	17
	Tot.	28,6 ± 0,91	26,3 - 31,0	83	28,3 ± 0,87	26,3 - 31,0	56	28,5 ± 0,91	26,3 - 31,0	139
Peso	0	31,3 ± 3,49	25,0 - 46,5	64	29,4 ± 3,30	22,8 - 37,4	52	30,4 ± 3,53	22,8 - 46,5	116
	F	29,7 ± 1,98	26,3 - 33,2	16				29,7 ± 1,98	26,3 - 33,2	16
	M	31,7 ± 2,72	22,7 - 34,5	17		29,6 - 30,0	2	31,5 ± 2,63	22,7 - 34,5	19
	Tot.	31,1 ± 3,20	22,7 - 46,5	97	29,4 ± 3,24	22,8 - 37,4	54	30,5 ± 3,31	22,7 - 46,5	151

Canapino maggiore *Hippolais icterina*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	77,3 ± 2,11	73,0 - 81,0	10	77,5 ± 1,91	73,0 - 81,0	22	77,5 ± 1,94	73,0 - 81,0	32
	F									
	M									
	Tot.	77,3 ± 2,11	73,0 - 81,0	10	77,5 ± 1,91	73,0 - 81,0	22	77,5 ± 1,94	73,0 - 81,0	32
3RM	0	59,6 ± 1,41	56,5 - 61,0	9	58,8 ± 1,17	56,5 - 60,5	21	59,1 ± 1,28	56,5 - 61,0	30
	F									
	M									
	Tot.	59,6 ± 1,41	56,5 - 61,0	9	58,8 ± 1,17	56,5 - 60,5	21	59,1 ± 1,28	56,5 - 61,0	30
Tarso	0	20,8 ± 1,03	18,7 - 22,1	8	20,6 ± 0,91	19,0 - 22,0	17	20,6 ± 0,93	18,7 - 22,1	25
	F									
	M									
	Tot.	20,8 ± 1,03	18,7 - 22,1	8	20,6 ± 0,91	19,0 - 22,0	17	20,6 ± 0,93	18,7 - 22,1	25
Peso	0	14,1 ± 2,13	11,5 - 17,5	8	13,2 ± 0,98	11,4 - 15,2	22	13,4 ± 1,39	11,4 - 17,5	30
	F									
	M									
	Tot.	14,1 ± 2,13	11,5 - 17,5	8	13,2 ± 0,98	11,4 - 15,2	22	13,4 ± 1,39	11,4 - 17,5	30

Canapino *Hippolais polyglotta*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	68,1 ± 2,03	62,0 - 72,0	210	65,9 ± 2,08	61,0 - 72,0	64	67,6 ± 2,23	61,0 - 72,0	274
	F	66,8 ± 1,32	65,0 - 70,0	37				66,8 ± 1,32	65,0 - 70,0	37
	M	69,5 ± 1,53	67,0 - 72,0	39				69,5 ± 1,53	67,0 - 72,0	39
	Tot.	68,1 ± 2,01	62,0 - 72,0	286	65,9 ± 2,08	61,0 - 72,0	64	67,7 ± 2,18	61,0 - 72,0	350
3RM	0	52,0 ± 1,66	47,0 - 56,0	185	49,7 ± 1,85	46,5 - 55,5	62	51,4 ± 1,98	46,5 - 56,0	247
	F	50,4 ± 1,19	48,0 - 53,5	48				50,4 ± 1,19	48,0 - 53,5	48
	M	52,8 ± 1,18	51,0 - 56,0	43				52,8 ± 1,18	51,0 - 56,0	43
	Tot.	51,8 ± 1,67	47,0 - 56,0	276	49,7 ± 1,85	46,5 - 55,5	62	51,5 ± 1,90	46,5 - 56,0	338
Tarso	0	21,1 ± 0,83	19,0 - 23,3	144	20,8 ± 0,99	19,1 - 23,3	43	21,1 ± 0,87	19,0 - 23,3	187
	F	20,4 ± 0,65	18,8 - 21,5	40				20,4 ± 0,65	18,8 - 21,5	40
	M	20,8 ± 0,77	19,5 - 22,4	31				20,8 ± 0,77	19,5 - 22,4	31
	Tot.	20,9 ± 0,83	18,8 - 23,3	215	20,8 ± 0,99	19,1 - 23,3	43	20,9 ± 0,86	18,8 - 23,3	258
Peso	0	11,4 ± 0,82	9,0 - 14,0	209	11,0 ± 0,87	9,3 - 12,9	63	11,3 ± 0,84	9,0 - 14,0	272
	F	12,0 ± 0,90	10,1 - 14,0	48				12,0 ± 0,90	10,1 - 14,0	48
	M	11,4 ± 0,60	10,2 - 13,2	45				11,4 ± 0,60	10,2 - 13,2	45
	Tot.	11,5 ± 0,83	9,0 - 14,0	302	11,0 ± 0,87	9,3 - 12,9	63	11,4 ± 0,86	9,0 - 14,0	365

Sterpazzolina *Sylvia cantillans*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0		61,0	1	60,7 ± 2,21	57,0 - 64,0	7				60,8 ± 2,05	57,0 - 64,0	8
	F	60,7 ± 1,15	60,0 - 62,0	3	61,9 ± 1,31	60,0 - 63,0	4		61,0	1	61,3 ± 1,22	60,0 - 63,0	8
	M	62,5 ± 1,29	61,0 - 64,0	4	61,6 ± 1,27	60,0 - 63,0	7				61,9 ± 1,30	60,0 - 64,0	11
	Tot.	61,6 ± 1,41	60,0 - 64,0	8	61,3 ± 1,69	57,0 - 64,0	18		61,0	1	61,4 ± 1,56	57,0 - 64,0	27
3RM	0				46,1 ± 1,67	44,0 - 48,5	7				46,1 ± 1,67	44,0 - 48,5	7
	F		46,5 - 46,5	2	46,1 ± 0,85	45,0 - 47,0	4		47,5 - 47,5	1	46,4 ± 0,79	45,0 - 47,5	7
	M	46,7 ± 0,58	46,0 - 47,0	3	46,7 ± 1,33	45,0 - 48,0	6				46,7 ± 1,09	45,0 - 48,0	9
	Tot.	46,6 ± 0,42	46,0 - 47,0	5	46,3 ± 1,35	44,0 - 48,5	17		47,5 - 47,5	1	46,4 ± 1,19	44,0 - 48,5	23
Tarso	0					21,1	1					21,1	1
	F		19,4	1		19,2	1					19,2 - 19,4	2
	M		20,2	1		18,3 - 19,4	2				19,3 ± 0,95	18,3 - 20,2	3
	Tot.		19,4 - 20,2	2	19,5 ± 1,17	18,3 - 21,1	4				19,6 ± 0,95	18,3 - 21,1	6
Peso	0		10,5	1	9,6 ± 0,64	9,0 - 10,7	6				9,7 ± 0,67	9,0 - 10,7	7
	F		8,9 - 9,6	2	10,4 ± 0,40	10,0 - 10,9	4		8,6 - 8,6	1	9,8 ± 0,85	8,6 - 10,9	7
	M	9,2 ± 0,97	8,5 - 10,6	4	9,6 ± 1,01	8,6 - 11,6	7				9,5 ± 0,97	8,5 - 11,6	11
	Tot.	9,4 ± 0,86	8,5 - 10,6	7	9,8 ± 0,82	8,6 - 11,6	17		8,6 - 8,6	1	9,6 ± 0,84	8,5 - 11,6	25

Bigiarella *Sylvia curruca*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	66,8 ± 2,14	64,5 - 70,5	10	66,5 ± 2,02	61,0 - 71,0	110		65,0	1	66,5 ± 2,02	61,0 - 71,0	121
	F	65,7 ± 0,58	65,0 - 66,0	3		67,0	1				66,0 ± 0,82	65,0 - 67,0	4
	M		66,0 - 70,0	2		66,0	1		67,0	1	67,2 ± 1,89	66,0 - 70,0	4
	Tot.	66,7 ± 2,01	64,5 - 70,5	15	66,5 ± 2,00	61,0 - 71,0	112		65,0 - 67,0	2	66,5 ± 1,98	61,0 - 71,0	129
3RM	0	50,6 ± 2,26	47,5 - 54,5	14	50,0 ± 1,62	45,5 - 53,5	127		49,0 - 49	1	50,0 ± 1,69	45,5 - 54,5	142
	F	49,5 ± 0,91	48,5 - 50,5	4		51,0 - 51	1				49,8 ± 1,04	48,5 - 51,0	5
	M		50,0 - 51,0	2		50,0 - 50	1		53,0 - 53	1	51,0 ± 1,41	50,0 - 53,0	4
	Tot.	50,4 ± 1,96	47,5 - 54,5	20	50,0 ± 1,61	45,5 - 53,5	129		49,0 - 53,0	2	50,0 ± 1,67	45,5 - 54,5	151
Tarsolo	0	19,7 ± 0,64	18,9 - 21,5	16	19,8 ± 0,69	18,1 - 21,5	110		19,9 - 19,9	1	19,7 ± 0,68	18,1 - 21,5	127
	F	19,6 ± 0,77	18,4 - 20,0	4		20,2 - 20,2	1				19,7 ± 0,73	18,4 - 20,2	5
	M		20,2 - 21,5	2		19,2 - 19,2	1		19,4 - 19,4	1	20,1 ± 1,04	19,2 - 21,5	4
	Tot.	19,8 ± 0,74	18,4 - 21,5	22	19,8 ± 0,69	18,1 - 21,5	112		19,4 - 19,9	2	19,8 ± 0,69	18,1 - 21,5	136
Peso	0	12,5 ± 1,06	10,7 - 14,5	18	12,2 ± 0,88	9,7 - 14,5	129		11,1 - 11,1	1	12,2 ± 0,91	9,7 - 14,5	148
	F	12,4 ± 2,08	10,3 - 15,2	5		15,5 - 15,5	1				12,9 ± 2,25	10,3 - 15,5	6
	M		12,5	1		11,0 - 11	1		10,4 - 10,4	1	11,3 ± 1,08	10,4 - 12,5	3
	Tot.	12,5 ± 1,26	10,3 - 15,2	24	12,2 ± 0,92	9,7 - 15,5	131		10,4 - 11,1	2	12,2 ± 0,99	9,7 - 15,5	157

Sterpazzola *Sylvia communis*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	73,0 ± 2,55	68,0 - 77,0	15	72,1 ± 2,14	66,5 - 78,5	98		72,0	1	72,2 ± 2,20	66,5 - 78,5	114
	F	72,2 ± 1,76	68,0 - 75,0	43	72,3 ± 1,54	71,0 - 75,0	6	72,0 ± 1,87	70,0 - 74,0	5	72,2 ± 1,72	68,0 - 75,0	54
	M	73,6 ± 2,12	70,0 - 78,0	47	71,8 ± 1,91	69,0 - 76,0	15		71,0 - 73,0	2	73,1 ± 2,16	69,0 - 78,0	64
	Tot.	72,9 ± 2,12	68,0 - 78,0	105	72,1 ± 2,08	66,5 - 78,5	119	72,0 ± 1,51	70,0 - 74,0	8	72,5 ± 2,12	66,5 - 78,5	232
3RM	0	55,0 ± 1,86	50,5 - 58,0	18	54,8 ± 1,69	49,5 - 59,5	101		54,5	1	54,8 ± 1,71	49,5 - 59,5	120
	F	54,6 ± 1,51	51,0 - 57,5	41	55,0 ± 1,41	53,5 - 57,5	6	55,6 ± 1,39	54,0 - 57,5	5	54,7 ± 1,49	51,0 - 57,5	52
	M	55,8 ± 1,90	51,5 - 59,5	42	54,7 ± 1,14	52,5 - 57,0	15		54,2 - 55,5	2	55,5 ± 1,77	51,5 - 59,5	59
	Tot.	55,2 ± 1,82	50,5 - 59,5	101	54,8 ± 1,61	49,5 - 59,5	122	55,3 ± 1,20	54,0 - 57,5	8	55,0 ± 1,70	49,5 - 59,5	231
Tarsolo	0	21,2 ± 0,47	20,5 - 22,2	16	21,3 ± 0,81	18,6 - 23,1	105		20,3	1	21,2 ± 0,77	18,6 - 23,1	122
	F	21,6 ± 0,92	20,0 - 24,8	38	21,8 ± 0,29	21,5 - 22,2	4	21,6 ± 0,38	21,1 - 22,1	5	21,6 ± 0,84	20,0 - 24,8	47
	M	21,5 ± 0,94	20,0 - 24,0	38	21,5 ± 0,62	20,4 - 22,6	14		21,8	1	21,5 ± 0,85	20,0 - 24,0	53
	Tot.	21,5 ± 0,87	20,0 - 24,8	92	21,3 ± 0,79	18,6 - 23,1	123	21,5 ± 0,61	20,3 - 22,1	7	21,4 ± 0,82	18,6 - 24,8	222
Peso	0	13,7 ± 1,54	11,6 - 16,9	19	14,4 ± 1,43	10,1 - 22,5	106		14,5	1	14,3 ± 1,45	10,1 - 22,5	126
	F	15,3 ± 2,02	12,2 - 19,5	42	15,4 ± 1,77	13,4 - 17,7	6	13,8 ± 1,26	12,0 - 15,2	5	15,2 ± 1,95	12,0 - 19,5	53
	M	13,7 ± 1,32	11,5 - 17,5	47	13,5 ± 1,00	12,1 - 15,3	15		12,4 - 13,6	2	13,7 ± 1,24	11,5 - 17,5	64
	Tot.	14,3 ± 1,82	11,5 - 19,5	108	14,4 ± 1,44	10,1 - 22,5	127	13,7 ± 1,12	12,0 - 15,2	8	14,3 ± 1,61	10,1 - 22,5	243

Beccafico *Sylvia borin*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	79,3 ± 2,21	71,0 - 85,0	365	78,6 ± 2,37	71,0 - 84,0	622	78,9 ± 2,34	71,0 - 85,0	987
	F	78,8 ± 2,30	75,0 - 84,0	44				78,8 ± 2,30	75,0 - 84,0	44
	M	78,3 ± 2,45	72,0 - 83,0	27				78,3 ± 2,45	72,0 - 83,0	27
	Tot.	79,2 ± 2,25	71,0 - 85,0	436	78,6 ± 2,37	71,0 - 84,0	622	78,8 ± 2,34	71,0 - 85,0	1058
3RM	0	59,6 ± 2,11	52,0 - 70,0	353	59,0 ± 1,99	52,0 - 70,0	648	59,2 ± 2,06	52,0 - 70,0	1001
	F	59,1 ± 2,86	55,0 - 68,0	48				59,1 ± 2,86	55,0 - 68,0	48
	M	59,1 ± 1,80	55,5 - 63,0	28				59,1 ± 1,80	55,5 - 63,0	28
	Tot.	59,5 ± 2,20	52,0 - 70,0	429	59,0 ± 1,99	52,0 - 70,0	648	59,2 ± 2,09	52,0 - 70,0	1077
Tarsolo	0	20,3 ± 0,82	18,3 - 22,5	156	20,3 ± 0,86	17,5 - 23,5	146	20,3 ± 0,84	17,5 - 23,5	302
	F	20,4 ± 0,50	19,6 - 21,6	16				20,4 ± 0,50	19,6 - 21,6	16
	M	20,1 ± 0,72	19,0 - 21,0	9				20,1 ± 0,72	19,0 - 21,0	9
	Tot.	20,3 ± 0,79	18,3 - 22,5	181	20,3 ± 0,86	17,5 - 23,5	146	20,3 ± 0,82	17,5 - 23,5	327
Peso	0	19,2 ± 2,26	10,5 - 26,2	382	18,8 ± 1,98	12,2 - 26,2	683	19,0 ± 2,09	10,5 - 26,2	1065
	F	17,5 ± 1,84	12,2 - 22,0	48				17,5 ± 1,84	12,2 - 22,0	48
	M	17,3 ± 1,23	15,0 - 20,5	28				17,3 ± 1,23	15,0 - 20,5	28
	Tot.	18,9 ± 2,27	10,5 - 26,2	458	18,8 ± 1,98	12,2 - 26,2	683	18,9 ± 2,10	10,5 - 26,2	1141

Capinera *Sylvia atricapilla*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	71,5 ± 2,04	63,0 - 82,0	1703	71,6 ± 2,53	67,0 - 80,0	56	71,8 ± 0,96	71,0 - 73,0	4	71,5 ± 2,05	63,0 - 82,0	1763
	F	72,5 ± 1,90	64,0 - 81,0	5025	72,6 ± 2,11	65,0 - 82,0	3378	73,1 ± 2,16	68,0 - 79,0	409	72,6 ± 2,00	64,0 - 82,0	8812
	M	72,6 ± 1,88	64,0 - 81,5	8112	72,9 ± 2,18	65,0 - 82,0	3749	73,2 ± 2,19	66,0 - 80,0	374	72,7 ± 1,99	64,0 - 82,0	12235
	Tot.	72,4 ± 1,93	63,0 - 82,0	14840	72,8 ± 2,15	65,0 - 82,0	7183	73,2 ± 2,17	66,0 - 80,0	787	72,6 ± 2,02	63,0 - 82,0	22810
3RM	0	54,3 ± 1,65	47,0 - 62,0	1765	55,0 ± 2,01	51,0 - 60,5	49	55,5 ± 0,87	55,0 - 56,5	3	54,4 ± 1,66	47,0 - 62,0	1817
	F	54,6 ± 1,64	48,5 - 62,0	6247	55,0 ± 1,75	48,0 - 62,0	3408	55,7 ± 1,68	51,0 - 60,5	389	54,8 ± 1,70	48,0 - 62,0	10044
	M	54,6 ± 1,60	48,0 - 63,0	10229	55,1 ± 1,82	49,0 - 62,5	3721	55,7 ± 1,83	49,5 - 61,0	345	54,8 ± 1,69	48,0 - 63,0	14295
	Tot.	54,6 ± 1,62	47,0 - 63,0	18241	55,1 ± 1,79	48,0 - 62,5	7178	55,7 ± 1,75	49,5 - 61,0	737	54,7 ± 1,69	47,0 - 63,0	26156
Tarsio	0	20,8 ± 0,86	18,0 - 24,0	1158	20,9 ± 1,05	19,4 - 24,0	21	21,4 ± 0,53	21,0 - 22,0	3	20,8 ± 0,86	18,0 - 24,0	1182
	F	20,7 ± 0,78	18,0 - 24,2	789	20,8 ± 0,91	18,0 - 24,0	1043	20,9 ± 0,85	18,9 - 24,0	111	20,8 ± 0,86	18,0 - 24,2	1943
	M	20,6 ± 0,77	18,5 - 23,9	1079	20,7 ± 0,89	18,0 - 24,1	975	20,7 ± 0,88	17,7 - 23,0	132	20,6 ± 0,84	17,7 - 24,1	2186
	Tot.	20,7 ± 0,81	18,0 - 24,2	3026	20,8 ± 0,90	18,0 - 24,1	2039	20,8 ± 0,87	17,7 - 24,0	246	20,7 ± 0,85	17,7 - 24,2	5311
Peso	0	16,7 ± 1,32	11,6 - 25,2	1831	17,7 ± 1,68	15,0 - 22,0	63	16,6 ± 1,52	15,0 - 18,0	3	16,7 ± 1,35	11,6 - 25,2	1897
	F	17,6 ± 1,36	11,5 - 24,4	6295	17,8 ± 1,59	11,4 - 26,0	3660	17,8 ± 1,62	13,7 - 23,5	404	17,7 ± 1,46	11,4 - 26,0	10359
	M	17,3 ± 1,29	11,1 - 29,0	10361	17,4 ± 1,46	13,0 - 25,8	4001	17,4 ± 1,72	14,0 - 24,6	362	17,3 ± 1,35	11,1 - 29,0	14724
	Tot.	17,3 ± 1,34	11,1 - 29,0	18487	17,6 ± 1,54	11,4 - 26,0	7724	17,6 ± 1,68	13,7 - 24,6	769	17,4 ± 1,41	11,1 - 29,0	26980

Lui bianco *Phylloscopus bonelli*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	63,3 ± 2,50	58,0 - 66,0	12	63,2 ± 2,71	57,0 - 69,0	36	63,2 ± 2,63	57,0 - 69,0	48
	F		60,0 - 65,0	2					60,0 - 65,0	2
	M	66,6 ± 1,51	65,0 - 69,0	7				66,6 ± 1,51	65,0 - 69,0	7
	Tot.	64,3 ± 2,73	58,0 - 69,0	21	63,2 ± 2,71	57,0 - 69,0	36	63,6 ± 2,75	57,0 - 69,0	57
3RM	0	48,6 ± 2,17	45,0 - 52,0	13	47,9 ± 2,07	44,0 - 52,5	36	48,1 ± 2,01	44,0 - 52,5	49
	F		48,0 - 52,0	2					48,0 - 52,0	2
	M	51,5 ± 1,89	49,5 - 55,0	7				51,5 ± 1,89	49,5 - 55,0	7
	Tot.	49,6 ± 2,44	45,0 - 55,0	22	47,9 ± 2,07	44,0 - 52,5	36	48,6 ± 2,35	44,0 - 55,0	58
Tarsio	0	18,7 ± 0,63	17,5 - 19,4	6	19,1 ± 0,82	17,7 - 20,3	22	19,0 ± 0,79	17,5 - 20,3	28
	F		19,4 - 19,4	2					19,4 - 19,4	2
	M									
	Tot.	18,9 ± 0,63	17,5 - 19,4	8	19,1 ± 0,82	17,7 - 20,3	22	19,0 ± 0,77	17,5 - 20,3	30
Peso	0	7,7 ± 1,20	6,3 - 10,0	11	7,8 ± 0,84	6,5 - 10,0	33	7,8 ± 0,92	6,3 - 10,0	44
	F		6,8 - 7,6	2					6,8 - 7,6	2
	M	7,8 ± 0,36	7,5 - 8,5	7				7,8 ± 0,36	7,5 - 8,5	7
	Tot.	7,7 ± 0,92	6,3 - 10,0	20	7,8 ± 0,84	6,5 - 10,0	33	7,8 ± 0,86	6,3 - 10,0	53

Lui verde *Phylloscopus sibilatrix*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	76,1 ± 3,15	70,0 - 80,0	19	76,6 ± 2,24	74,0 - 80,0	9	76,2 ± 2,86	70,0 - 80,0	28
	F									
	M									
	Tot.	76,1 ± 3,15	70,0 - 80,0	19	76,6 ± 2,24	74,0 - 80,0	9	76,2 ± 2,86	70,0 - 80,0	28
3RM	0	58,5 ± 2,23	55,0 - 61,5	14	58,8 ± 1,76	56,5 - 62,5	8	58,6 ± 2,03	55,0 - 62,5	22
	F									
	M									
	Tot.	58,5 ± 2,23	55,0 - 61,5	14	58,8 ± 1,76	56,5 - 62,5	8	58,6 ± 2,03	55,0 - 62,5	22
Tarsio	0	18,9 ± 0,82	17,9 - 20,0	10	18,8 ± 0,96	17,5 - 19,8	4	18,9 ± 0,82	17,5 - 20,0	14
	F									
	M									
	Tot.	18,9 ± 0,82	17,9 - 20,0	10	18,8 ± 0,96	17,5 - 19,8	4	18,9 ± 0,82	17,5 - 20,0	14
Peso	0	9,6 ± 0,87	7,8 - 10,9	19	10,1 ± 1,04	9,0 - 12,5	10	9,8 ± 0,93	7,8 - 12,5	29
	F									
	M									
	Tot.	9,6 ± 0,87	7,8 - 10,9	19	10,1 ± 1,04	9,0 - 12,5	10	9,8 ± 0,93	7,8 - 12,5	29

Lui piccolo *Phylloscopus collybita*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	58,9 ± 2,96	50,0 - 67,0	1357	58,4 ± 2,86	50,0 - 67,0	1999	59,6 ± 2,66	51,0 - 65,0	112	58,6 ± 2,91	50,0 - 67,0	3468
	F	53,4 ± 1,14	51,5 - 56,0	29	53,7 ± 1,25	51,0 - 56,0	53	54,0 ± 0,00	54,0 - 54,0	3	53,6 ± 1,19	51,0 - 56,0	85
	M	61,1 ± 2,31	56,0 - 65,5	35	61,4 ± 1,88	57,0 - 64,5	53	59,5 ± 1,73	57,0 - 61,0	4	61,2 ± 2,07	56,0 - 65,5	92
	Tot.	58,8 ± 3,04	50,0 - 67,0	1421	58,4 ± 2,95	50,0 - 67,0	2105	59,5 ± 2,74	51,0 - 65,0	119	58,6 ± 2,99	50,0 - 67,0	3645
3RM	0	45,0 ± 2,45	38,0 - 53,0	1389	44,7 ± 2,34	37,5 - 53,0	2155	45,7 ± 2,32	37,5 - 50,0	111	44,8 ± 2,39	37,5 - 53,0	3655
	F	41,1 ± 0,88	39,0 - 42,5	28	41,4 ± 0,98	39,0 - 43,5	55	41,7 ± 0,29	41,5 - 42,0	3	41,3 ± 0,95	39,0 - 43,5	86
	M	46,8 ± 1,78	43,0 - 51,5	34	47,2 ± 1,74	43,0 - 50,5	51	45,5 ± 1,47	44,0 - 47,0	4	47,0 ± 1,76	43,0 - 51,5	89
	Tot.	44,9 ± 2,49	38,0 - 53,0	1451	44,6 ± 2,39	37,5 - 53,0	2261	45,6 ± 2,35	37,5 - 50,0	118	44,8 ± 2,43	37,5 - 53,0	3830
Tarsio	0	19,4 ± 0,82	17,0 - 22,0	795	19,3 ± 0,80	16,8 - 22,0	806	19,4 ± 0,70	17,5 - 21,2	82	19,3 ± 0,81	16,8 - 22,0	1683
	F	18,4 ± 0,55	17,4 - 19,0	10	18,7 ± 0,70	17,4 - 19,9	16	18,3 ± 0,75	17,9 - 19,2	3	18,5 ± 0,65	17,4 - 19,9	29
	M	19,4 ± 0,68	18,0 - 20,5	14	19,4 ± 0,55	18,3 - 20,5	13	19,8 ± 0,89	19,0 - 21,0	4	19,5 ± 0,65	18,0 - 21,0	31
	Tot.	19,4 ± 0,82	17,0 - 22,0	819	19,3 ± 0,80	16,8 - 22,0	835	19,4 ± 0,73	17,5 - 21,2	89	19,3 ± 0,81	16,8 - 22,0	1743
Peso	0	7,6 ± 0,92	4,7 - 12,6	1442	7,5 ± 0,91	5,0 - 14,4	2184	7,8 ± 0,75	6,2 - 10,2	111	7,6 ± 0,91	4,7 - 14,4	3737
	F	7,5 ± 0,81	6,5 - 9,1	31	7,3 ± 0,77	5,8 - 9,8	55	7,9 ± 0,29	7,7 - 8,2	3	7,4 ± 0,78	5,8 - 9,8	89
	M	8,3 ± 1,60	6,1 - 13,4	37	8,1 ± 1,24	6,3 - 12,6	53	7,9 ± 0,17	7,7 - 8,1	4	8,2 ± 1,37	6,1 - 13,4	94
	Tot.	7,6 ± 0,94	4,7 - 13,4	1510	7,5 ± 0,92	5,0 - 14,4	2292	7,8 ± 0,73	6,2 - 10,2	118	7,6 ± 0,93	4,7 - 14,4	3920

Lui grosso *Phylloscopus trochilus*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	67,3 ± 3,10	57,0 - 73,0	350	65,8 ± 3,16	58,0 - 74,5	262	66,6 ± 3,21	57,0 - 74,5	612
	F									
	M									
	Tot.	67,3 ± 3,10	57,0 - 73,0	350	65,8 ± 3,16	58,0 - 74,5	262	66,6 ± 3,21	57,0 - 74,5	612
3RM	0	51,3 ± 2,47	44,0 - 56,5	335	50,0 ± 2,37	44,0 - 56,0	255	50,7 ± 2,51	44,0 - 56,5	590
	F									
	M									
	Tot.	51,3 ± 2,47	44,0 - 56,5	335	50,0 ± 2,37	44,0 - 56,0	255	50,7 ± 2,51	44,0 - 56,5	590
Tarsio	0	19,6 ± 0,86	17,4 - 21,8	262	19,5 ± 0,81	17,7 - 21,5	173	19,6 ± 0,84	17,4 - 21,8	435
	F									
	M									
	Tot.	19,6 ± 0,86	17,4 - 21,8	262	19,5 ± 0,81	17,7 - 21,5	173	19,6 ± 0,84	17,4 - 21,8	435
Peso	0	9,3 ± 1,26	6,7 - 14,0	345	9,1 ± 1,27	6,3 - 13,6	258	9,2 ± 1,26	6,3 - 14,0	603
	F									
	M									
	Tot.	9,3 ± 1,26	6,7 - 14,0	345	9,1 ± 1,27	6,3 - 13,6	258	9,2 ± 1,26	6,3 - 14,0	603

Regolo *Regulus regulus*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	54,8 ± 1,54	49,0 - 59,0	82	54,5 ± 1,78	51,0 - 59,0	77	54,6 ± 1,66	49,0 - 59,0	159
	F	52,6 ± 1,39	50,0 - 56,0	136	52,7 ± 1,23	49,0 - 56,0	273	52,6 ± 1,28	49,0 - 56,0	409
	M	54,7 ± 1,40	51,0 - 58,0	240	54,9 ± 1,17	51,0 - 59,0	385	54,8 ± 1,26	51,0 - 59,0	625
	Tot.	54,1 ± 1,73	49,0 - 59,0	458	54,0 ± 1,64	49,0 - 59,0	735	54,1 ± 1,68	49,0 - 59,0	1193
3RM	0	42,5 ± 1,17	38,5 - 45,0	81	42,1 ± 1,78	37,0 - 46,0	94	42,3 ± 1,54	37,0 - 46,0	175
	F	40,8 ± 1,28	37,0 - 44,0	144	40,8 ± 1,20	36,0 - 44,0	439	40,8 ± 1,22	36,0 - 44,0	583
	M	42,7 ± 1,11	40,0 - 48,0	241	42,6 ± 1,14	39,5 - 47,0	621	42,6 ± 1,13	39,5 - 48,0	862
	Tot.	42,1 ± 1,47	37,0 - 48,0	466	41,9 ± 1,50	36,0 - 47,0	1154	41,9 ± 1,49	36,0 - 48,0	1620
Tarsio	0	16,7 ± 0,62	16,0 - 17,6	6	16,9 ± 0,54	16,2 - 18,5	18	16,9 ± 0,56	16,0 - 18,5	24
	F	16,8 ± 0,55	15,8 - 18,0	49	16,8 ± 0,44	15,8 - 18,0	167	16,8 ± 0,47	15,8 - 18,0	216
	M	17,2 ± 0,55	15,9 - 18,5	104	17,2 ± 0,50	16,0 - 18,8	259	17,2 ± 0,51	15,9 - 18,8	363
	Tot.	17,0 ± 0,57	15,8 - 18,5	159	17,0 ± 0,51	15,8 - 18,8	444	17,0 ± 0,53	15,8 - 18,8	603
Peso	0	5,4 ± 0,35	4,6 - 7,0	89	5,4 ± 0,39	4,5 - 6,7	93	5,4 ± 0,37	4,5 - 7,0	182
	F	5,3 ± 0,42	4,0 - 6,7	150	5,2 ± 0,37	4,2 - 6,8	441	5,2 ± 0,38	4,0 - 6,8	591
	M	5,5 ± 0,41	4,0 - 7,0	276	5,4 ± 0,35	4,2 - 6,9	628	5,4 ± 0,37	4,0 - 7,0	904
	Tot.	5,4 ± 0,41	4,0 - 7,0	515	5,3 ± 0,37	4,2 - 6,9	1162	5,3 ± 0,38	4,0 - 7,0	1677

Fiorrancino *Regulus ignicapilla*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.			n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	53,2 ± 1,59	50,0 - 55,0	12	53,1 ± 2,48	49,0 - 59,0	34	53,1 ± 2,26	49,0 - 59,0	46
	F	51,3 ± 0,99	49,5 - 53,0	30	51,6 ± 1,34	49,0 - 54,0	54	51,5 ± 1,23	49,0 - 54,0	84
	M	53,7 ± 1,24	51,0 - 56,0	52	54,2 ± 1,36	52,0 - 59,0	91	54,0 ± 1,34	51,0 - 59,0	143
	Tot.	52,9 ± 1,60	49,5 - 56,0	94	53,2 ± 1,97	49,0 - 59,0	179	53,1 ± 1,86	49,0 - 59,0	273
3RM	0	41,4 ± 1,70	38,5 - 43,0	11	40,5 ± 1,67	37,5 - 43,5	31	40,8 ± 1,69	37,5 - 43,5	42
	F	39,5 ± 0,87	38,0 - 42,0	30	39,6 ± 1,09	37,5 - 42,0	60	39,6 ± 1,02	37,5 - 42,0	90
	M	41,5 ± 1,07	38,5 - 43,5	49	41,4 ± 1,13	38,0 - 43,5	117	41,4 ± 1,11	38,0 - 43,5	166
	Tot.	40,8 ± 1,43	38,0 - 43,5	90	40,8 ± 1,46	37,5 - 43,5	208	40,8 ± 1,45	37,5 - 43,5	298
Tarso	0		17,2	1	17,4 ± 0,21	17,2 - 17,6	3	17,4 ± 0,21	17,2 - 17,6	4
	F	16,9 ± 0,50	16,0 - 18,0	18	17,2 ± 0,58	16,1 - 18,3	18	17,1 ± 0,56	16,0 - 18,3	36
	M	17,6 ± 0,69	16,5 - 18,8	25	17,3 ± 0,53	16,3 - 18,3	40	17,4 ± 0,60	16,3 - 18,8	65
	Tot.	17,3 ± 0,69	16,0 - 18,8	44	17,3 ± 0,53	16,1 - 18,3	61	17,3 ± 0,60	16,0 - 18,8	105
Peso	0	5,4 ± 0,37	4,7 - 5,8	11	5,2 ± 0,33	4,5 - 6,0	36	5,3 ± 0,34	4,5 - 6,0	47
	F	5,0 ± 0,27	4,6 - 5,5	30	5,0 ± 0,36	4,5 - 5,8	59	5,0 ± 0,33	4,5 - 5,8	89
	M	5,4 ± 0,38	4,5 - 6,5	52	5,3 ± 0,37	4,5 - 6,4	115	5,3 ± 0,37	4,5 - 6,5	167
	Tot.	5,3 ± 0,38	4,5 - 6,5	93	5,2 ± 0,38	4,5 - 6,4	210	5,2 ± 0,38	4,5 - 6,5	303

Pigliamosche *Muscicapa striata*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.			n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	88,6 ± 2,02	84,0 - 94,0	168	87,7 ± 2,53	81,0 - 93,5	87	88,3 ± 2,25	81,0 - 94,0	255
	F	88,1 ± 1,85	84,0 - 92,0	40		87,0	1	88,1 ± 1,83	84,0 - 92,0	41
	M	90,1 ± 1,79	87,0 - 93,0	32		88,0 - 92,0	2	90,1 ± 1,80	87,0 - 93,0	34
	Tot.	88,7 ± 2,04	84,0 - 94,0	240	87,7 ± 2,53	81,0 - 93,5	90	88,4 ± 2,23	81,0 - 94,0	330
3RM	0	68,6 ± 1,81	64,0 - 73,7	134	67,7 ± 1,97	63,5 - 74,0	80	68,3 ± 1,92	63,5 - 74,0	214
	F	67,8 ± 1,81	64,0 - 71,0	41		68,0	1	67,8 ± 1,79	64,0 - 71,0	42
	M	69,1 ± 1,88	66,0 - 73,0	33		69,0 - 71,0	2	69,2 ± 1,85	66,0 - 73,0	35
	Tot.	68,5 ± 1,86	64,0 - 73,7	208	67,8 ± 1,97	63,5 - 74,0	83	68,3 ± 1,92	63,5 - 74,0	291
Tarso	0	15,3 ± 0,74	13,6 - 17,0	124	15,1 ± 0,83	14,0 - 17,0	42	15,3 ± 0,77	13,6 - 17,0	166
	F	15,2 ± 0,67	14,1 - 17,0	30		16,0	1	15,2 ± 0,68	14,1 - 17,0	31
	M	15,2 ± 0,53	14,0 - 16,0	24		15,2	1	15,2 ± 0,52	14,0 - 16,0	25
	Tot.	15,3 ± 0,70	13,6 - 17,0	178	15,1 ± 0,82	14,0 - 17,0	44	15,2 ± 0,73	13,6 - 17,0	222
Peso	0	15,2 ± 1,10	12,5 - 18,0	163	15,3 ± 1,48	13,0 - 22,1	94	15,2 ± 1,25	12,5 - 22,1	257
	F	16,3 ± 1,69	12,7 - 20,9	42		17,0	1	16,3 ± 1,67	12,7 - 20,9	43
	M	15,0 ± 0,88	13,6 - 18,0	36		13,8 - 15,3	2	15,0 ± 0,88	13,6 - 18,0	38
	Tot.	15,4 ± 1,27	12,5 - 20,9	241	15,3 ± 1,48	13,0 - 22,1	97	15,3 ± 1,33	12,5 - 22,1	338

Balia nera *Ficedula hypoleuca*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.			n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	81,4 ± 2,13	76,0 - 86,0	93	80,5 ± 1,89	73,0 - 86,0	507	80,6 ± 1,96	73,0 - 86,0	600
	F	80,1 ± 1,85	76,0 - 84,0	64	79,1 ± 1,70	76,5 - 83,5	23	79,8 ± 1,85	76,0 - 84,0	87
	M	82,0 ± 1,67	79,0 - 85,0	22	81,3 ± 1,95	77,5 - 85,0	37	81,6 ± 1,87	77,5 - 85,0	59
	Tot.	81,0 ± 2,11	76,0 - 86,0	179	80,5 ± 1,91	73,0 - 86,0	567	80,6 ± 1,97	73,0 - 86,0	746
3RM	0	62,4 ± 1,72	58,0 - 66,0	83	61,4 ± 1,63	53,0 - 66,5	535	61,5 ± 1,68	53,0 - 66,5	618
	F	61,5 ± 1,39	58,0 - 65,0	61	60,5 ± 1,91	57,5 - 64,5	23	61,2 ± 1,59	57,5 - 65,0	84
	M	62,7 ± 1,39	61,0 - 65,0	20	61,9 ± 1,56	58,5 - 66,0	38	62,2 ± 1,54	58,5 - 66,0	58
	Tot.	62,1 ± 1,63	58,0 - 66,0	164	61,4 ± 1,65	53,0 - 66,5	596	61,5 ± 1,67	53,0 - 66,5	760
Tarso	0	17,7 ± 0,58	16,9 - 19,2	23	17,5 ± 0,69	15,0 - 19,5	193	17,5 ± 0,68	15,0 - 19,5	216
	F	17,7 ± 0,58	16,5 - 19,0	33	17,3 ± 0,74	15,6 - 18,6	16	17,6 ± 0,66	15,6 - 19,0	49
	M	18,0 ± 0,59	16,8 - 19,0	9	17,2 ± 0,76	15,5 - 18,3	20	17,5 ± 0,78	15,5 - 19,0	29
	Tot.	17,8 ± 0,58	16,5 - 19,2	65	17,5 ± 0,70	15,0 - 19,5	229	17,5 ± 0,69	15,0 - 19,5	294
Peso	0	14,5 ± 2,37	11,3 - 22,7	93	13,8 ± 1,80	10,2 - 20,5	548	13,9 ± 1,91	10,2 - 22,7	641
	F	13,6 ± 1,95	10,4 - 18,6	66	12,9 ± 1,42	11,0 - 15,9	23	13,4 ± 1,84	10,4 - 18,6	89
	M	13,2 ± 2,12	10,5 - 18,5	23	13,2 ± 1,79	10,3 - 17,1	37	13,2 ± 1,91	10,3 - 18,5	60
	Tot.	14,0 ± 2,25	10,4 - 22,7	182	13,7 ± 1,80	10,2 - 20,5	608	13,8 ± 1,91	10,2 - 22,7	790

Codibugnolo *Aegithalos caudatus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	61,6 ± 1,73	54,0 - 67,0	1943	59,0 ± 2,65	52,0 - 66,0	525	60,8 ± 2,50	57,0 - 62,0	4	61,0 ± 2,23	52,0 - 67,0	2472
	F	60,5 ± 1,49	57,0 - 64,0	113							60,5 ± 1,49	57,0 - 64,0	113
	M	62,1 ± 1,44	59,0 - 65,0	64							62,1 ± 1,44	59,0 - 65,0	64
	Tot.	61,5 ± 1,73	54,0 - 67,0	2120	59,0 ± 2,65	52,0 - 66,0	525	60,8 ± 2,50	57,0 - 62,0	4	61,0 ± 2,19	52,0 - 67,0	2649
3RM	0	46,1 ± 1,57	40,0 - 51,0	1986	44,7 ± 1,98	39,0 - 51,0	595		44,0 - 46,0	2	45,7 ± 1,76	39,0 - 51,0	2583
	F	45,7 ± 1,38	41,0 - 49,5	123							45,7 ± 1,38	41,0 - 49,5	123
	M	47,0 ± 1,46	42,5 - 50,5	70		43,0	1				46,9 ± 1,52	42,5 - 50,5	71
	Tot.	46,1 ± 1,56	40,0 - 51,0	2179	44,7 ± 1,98	39,0 - 51,0	596		44,0 - 46,0	2	45,8 ± 1,75	39,0 - 51,0	2777
Tarsolo	0	17,0 ± 0,70	14,5 - 19,1	927	17,2 ± 0,83	15,0 - 19,2	280		16,6 - 17,8	2	17,1 ± 0,73	14,5 - 19,2	1209
	F	16,8 ± 0,64	14,5 - 18,3	61		16,0	1				16,8 ± 0,65	14,5 - 18,3	62
	M	17,3 ± 0,63	16,0 - 19,0	37							17,3 ± 0,63	16,0 - 19,0	37
	Tot.	17,0 ± 0,70	14,5 - 19,1	1025	17,2 ± 0,83	15,0 - 19,2	281		16,6 - 17,8	2	17,1 ± 0,73	14,5 - 19,2	1308
Peso	0	7,7 ± 0,57	5,2 - 10,4	2175	7,8 ± 0,59	5,4 - 9,5	721	7,7 ± 0,38	7,2 - 8,0	4	7,7 ± 0,58	5,2 - 10,4	2900
	F	8,1 ± 0,82	6,0 - 10,5	129		10,4	1				8,1 ± 0,84	6,0 - 10,5	130
	M	7,8 ± 0,50	6,5 - 9,0	77		5,5	1				7,8 ± 0,56	5,5 - 9,0	78
	Tot.	7,7 ± 0,59	5,2 - 10,5	2381	7,8 ± 0,61	5,4 - 10,4	723	7,7 ± 0,38	7,2 - 8,0	4	7,7 ± 0,59	5,2 - 10,5	3108

Cincia bigia *Parus palustris*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	63,7 ± 2,05	58,0 - 70,0	187	62,8 ± 2,11	58,0 - 69,0	117	64,0 ± 1,79	60,5 - 66,0	10	63,4 ± 2,10	58,0 - 70,0	314
	F	62,4 ± 1,75	60,0 - 66,0	21	61,9 ± 2,91	59,0 - 68,0	7				62,2 ± 2,05	59,0 - 68,0	28
	M	65,6 ± 1,93	62,0 - 69,0	16	64,0 ± 3,46	61,0 - 69,0	4	63,5 ± 1,22	62,0 - 65,0	5	64,9 ± 2,23	61,0 - 69,0	25
	Tot.	63,7 ± 2,11	58,0 - 70,0	224	62,8 ± 2,20	58,0 - 69,0	128	63,8 ± 1,59	60,5 - 66,0	15	63,4 ± 2,16	58,0 - 70,0	367
3RM	0	48,0 ± 1,68	44,0 - 53,0	165	47,5 ± 1,63	44,5 - 51,0	109	47,6 ± 1,93	44,0 - 50,0	10	47,8 ± 1,69	44,0 - 53,0	284
	F	47,0 ± 1,23	44,0 - 49,0	22	46,5 ± 1,38	45,0 - 49,0	7		46,0	1	46,8 ± 1,25	44,0 - 49,0	30
	M	49,1 ± 1,37	45,0 - 51,0	17	48,2 ± 2,46	45,0 - 51,5	5	48,0 ± 0,79	47,0 - 49,0	5	48,7 ± 1,56	45,0 - 51,5	27
	Tot.	48,0 ± 1,68	44,0 - 53,0	204	47,4 ± 1,66	44,5 - 51,5	121	47,6 ± 1,62	44,0 - 50,0	16	47,8 ± 1,68	44,0 - 53,0	341
Tarsolo	0	16,5 ± 0,58	15,1 - 17,5	47	16,6 ± 0,59	15,3 - 17,8	65	16,4 ± 0,41	15,8 - 16,8	6	16,5 ± 0,57	15,1 - 17,8	118
	F	16,8 ± 0,54	16,0 - 17,6	9		16,0 - 16,0	2		16,2	1	16,6 ± 0,57	16,0 - 17,6	12
	M	16,9 ± 0,25	16,5 - 17,1	5		17,2	1		16,0 - 17,3	2	16,9 ± 0,43	16,0 - 17,3	8
	Tot.	16,6 ± 0,56	15,1 - 17,6	61	16,6 ± 0,59	15,3 - 17,8	68	16,5 ± 0,48	15,8 - 17,3	9	16,6 ± 0,57	15,1 - 17,8	138
Peso	0	10,5 ± 0,78	8,5 - 13,0	187	10,3 ± 0,69	9,0 - 12,2	132	10,6 ± 0,70	9,1 - 11,5	9	10,4 ± 0,75	8,5 - 13,0	328
	F	11,0 ± 1,04	9,0 - 13,6	23	10,0 ± 0,66	9,3 - 11,3	7		11,4	1	10,8 ± 1,04	9,0 - 13,6	31
	M	10,9 ± 0,36	10,4 - 11,5	18	10,4 ± 0,52	9,5 - 10,9	6	10,6 ± 0,47	9,9 - 11,1	5	10,8 ± 0,47	9,5 - 11,5	29
	Tot.	10,6 ± 0,80	8,5 - 13,6	228	10,3 ± 0,68	9,0 - 12,2	145	10,6 ± 0,62	9,1 - 11,5	15	10,5 ± 0,77	8,5 - 13,6	388

Cincia alpestre *Parus montanus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	68,7 ± 1,99	64,0 - 73,0	47	68,2 ± 2,05	63,0 - 73,0	89		67,0 - 72,0	2	68,4 ± 2,05	63,0 - 73,0	138
	F	67,2 ± 1,71	65,0 - 69,0	4							67,2 ± 1,71	65,0 - 69,0	4
	M	70,7 ± 1,15	70,0 - 72,0	3							70,7 ± 1,15	70,0 - 72,0	3
	Tot.	68,7 ± 2,01	64,0 - 73,0	54	68,2 ± 2,05	63,0 - 73,0	89		67,0 - 72,0	2	68,4 ± 2,05	63,0 - 73,0	145
3RM	0	51,3 ± 1,68	47,5 - 56,0	42	51,4 ± 1,62	48,0 - 55,5	101		50,0 - 52,5	2	51,3 ± 1,63	47,5 - 56,0	145
	F	51,4 ± 2,43	49,0 - 54,5	4							51,4 ± 2,43	49,0 - 54,5	4
	M	53,5 ± 2,18	52,0 - 56,0	3							53,5 ± 2,18	52,0 - 56,0	3
	Tot.	51,4 ± 1,80	47,5 - 56,0	49	51,4 ± 1,62	48,0 - 55,5	101		50,0 - 52,5	2	51,4 ± 1,67	47,5 - 56,0	152
Tarsolo	0	17,6 ± 0,59	16,5 - 18,5	27	17,5 ± 0,59	16,2 - 18,8	67		16,5 - 18,0	2	17,5 ± 0,59	16,2 - 18,8	96
	F	17,3 ± 0,24	17,0 - 17,5	4							17,3 ± 0,24	17,0 - 17,5	4
	M	17,4 ± 0,49	17,0 - 18,0	4							17,4 ± 0,49	17,0 - 18,0	4
	Tot.	17,5 ± 0,55	16,5 - 18,5	35	17,5 ± 0,59	16,2 - 18,8	67		16,5 - 18,0	2	17,5 ± 0,58	16,2 - 18,8	104
Peso	0	12,9 ± 0,97	10,2 - 15,0	50	12,8 ± 0,88	10,5 - 15,0	104		11,7 - 13,9	2	12,8 ± 0,91	10,2 - 15,0	156
	F	12,5 ± 0,57	11,6 - 13,0	5							12,5 ± 0,57	11,6 - 13,0	5
	M	13,5 ± 1,72	11,4 - 15,5	4							13,5 ± 1,72	11,4 - 15,5	4
	Tot.	12,9 ± 1,00	10,2 - 15,5	59	12,8 ± 0,88	10,5 - 15,0	104		11,7 - 13,9	2	12,9 ± 0,92	10,2 - 15,5	165

Cincia dal ciuffo *Parus cristatus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	66,9 ± 2,13	64,0 - 70,0	10	65,0 ± 2,05	61,0 - 68,5	19	65,7 ± 2,23	61,0 - 70,0	29
	F									
	M	67,8 ± 1,30	67,0 - 70,0	5		69,0	1	68,0 ± 1,26	67,0 - 70,0	6
	Tot.	67,2 ± 1,90	64,0 - 70,0	15	65,2 ± 2,19	61,0 - 69,0	20	66,1 ± 2,27	61,0 - 70,0	35
3RM	0	49,6 ± 2,20	46,0 - 53,5	10	49,1 ± 1,96	45,0 - 52,5	26	49,2 ± 2,01	45,0 - 53,5	36
	F		49,0	1		51,5	1		49,0 - 51,5	2
	M	50,2 ± 0,84	49,0 - 51,0	5		52,0	1	50,5 ± 1,05	49,0 - 52,0	6
	Tot.	49,7 ± 1,79	46,0 - 53,5	16	49,3 ± 2,01	45,0 - 52,5	28	49,4 ± 1,93	45,0 - 53,5	44
Tarso	0	18,6 ± 0,72	17,4 - 19,6	10	18,6 ± 0,44	17,5 - 19,6	19	18,6 ± 0,54	17,4 - 19,6	29
	F		18,2	1					18,2	1
	M	18,5 ± 0,39	18,1 - 19,0	4		18,0	1	18,4 ± 0,40	18,0 - 19,0	5
	Tot.	18,5 ± 0,61	17,4 - 19,6	15	18,5 ± 0,45	17,5 - 19,6	20	18,5 ± 0,52	17,4 - 19,6	35
Peso	0	11,3 ± 0,71	10,5 - 12,4	11	11,3 ± 0,79	9,7 - 12,8	24	11,3 ± 0,76	9,7 - 12,8	35
	F		10,4	1		14,8 - 14,8	1		10,4 - 14,8	2
	M	11,7 ± 0,51	11,2 - 12,5	5		12,0 - 12	1	11,8 ± 0,48	11,2 - 12,5	6
	Tot.	11,4 ± 0,69	10,4 - 12,5	17	11,5 ± 1,03	9,7 - 14,8	26	11,5 ± 0,90	9,7 - 14,8	43

Cincia mora *Parus ater*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	63,5 ± 2,24	58,0 - 69,0	131	63,0 ± 1,91	57,0 - 69,0	428	63,4 ± 3,02	58,5 - 67,0	9	63,2 ± 2,02	57,0 - 69,0	568
	F	62,2 ± 2,50	59,0 - 65,0	4		59,0 - 62,0	2		61,0 - 65,0	2	62,0 ± 2,33	59,0 - 65,0	8
	M	63,3 ± 1,87	61,0 - 67,0	9	62,2 ± 1,92	60,0 - 65,0	9				62,8 ± 1,93	60,0 - 67,0	18
	Tot.	63,5 ± 2,22	58,0 - 69,0	144	63,0 ± 1,92	57,0 - 69,0	439	63,3 ± 2,85	58,5 - 67,0	11	63,1 ± 2,02	57,0 - 69,0	594
3RM	0	48,6 ± 1,75	45,0 - 55,0	161	48,2 ± 1,57	44,0 - 55,0	833	48,2 ± 2,12	43,5 - 50,5	9	48,2 ± 1,61	43,5 - 55,0	1003
	F	49,0 ± 3,48	46,0 - 54,5	5		46,0 - 46,5	2		50,5	1	48,5 ± 3,02	46,0 - 54,5	8
	M	48,7 ± 1,09	47,5 - 50,5	9	46,9 ± 1,64	44,5 - 50,0	8				47,9 ± 1,64	44,5 - 50,5	17
	Tot.	48,6 ± 1,78	45,0 - 55,0	175	48,2 ± 1,57	44,0 - 55,0	843	48,4 ± 2,13	43,5 - 50,5	10	48,2 ± 1,62	43,5 - 55,0	1028
Tarso	0	17,0 ± 0,59	16,0 - 18,0	93	17,0 ± 0,52	15,6 - 18,7	458	17,3 ± 0,81	16,4 - 18,1	5	17,0 ± 0,54	15,6 - 18,7	556
	F		17,5 - 18,8	2					17,1 - 17,2	2	17,6 ± 0,79	17,1 - 18,8	4
	M	17,5 ± 1,22	16,0 - 18,5	4	16,7 ± 0,58	16,0 - 17,0	3				17,1 ± 1,03	16,0 - 18,5	7
	Tot.	17,0 ± 0,65	16,0 - 18,8	99	17,0 ± 0,52	15,6 - 18,7	461	17,3 ± 0,67	16,4 - 18,1	7	17,0 ± 0,55	15,6 - 18,8	567
Peso	0	9,4 ± 0,64	7,5 - 11,5	182	9,3 ± 0,67	7,0 - 12,7	842	9,4 ± 0,63	8,5 - 10,3	10	9,3 ± 0,66	7,0 - 12,7	1034
	F	9,8 ± 0,47	9,1 - 10,2	4		8,9 - 9,3	2		9,8 - 11,0	2	9,8 ± 0,67	8,9 - 11,0	8
	M	9,2 ± 0,81	8,0 - 10,2	11	9,2 ± 0,55	8,3 - 9,9	10				9,2 ± 0,68	8,0 - 10,2	21
	Tot.	9,4 ± 0,65	7,5 - 11,5	197	9,3 ± 0,66	7,0 - 12,7	854	9,6 ± 0,73	8,5 - 11,0	12	9,3 ± 0,66	7,0 - 12,7	1063

Cinciarella *Parus caeruleus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	66,1 ± 2,45	58,0 - 71,0	223	65,6 ± 2,01	57,0 - 75,0	987	67,1 ± 2,14	63,0 - 71,0	26	65,7 ± 2,18	57,0 - 75,0	1236
	F	65,1 ± 1,88	58,5 - 71,0	194	64,6 ± 1,58	60,5 - 72,0	451	65,2 ± 1,90	61,0 - 70,0	70	64,8 ± 1,71	58,5 - 72,0	715
	M	67,4 ± 2,26	61,5 - 75,0	245	66,7 ± 2,18	60,0 - 72,0	397	67,6 ± 2,07	61,5 - 72,0	138	67,1 ± 2,22	60,0 - 75,0	780
	Tot.	66,3 ± 2,42	58,0 - 75,0	662	65,6 ± 2,12	57,0 - 75,0	1835	66,8 ± 2,30	61,0 - 72,0	234	65,9 ± 2,25	57,0 - 75,0	2731
3RM	0	50,3 ± 2,06	43,0 - 57,0	162	50,3 ± 1,85	42,0 - 59,5	1051	50,7 ± 1,32	48,0 - 53,0	29	50,3 ± 1,86	42,0 - 59,5	1242
	F	50,1 ± 1,80	43,5 - 57,5	177	49,6 ± 1,53	44,5 - 57,0	459	50,3 ± 1,75	47,0 - 58,0	68	49,8 ± 1,64	43,5 - 58,0	704
	M	51,6 ± 1,95	45,0 - 59,0	233	51,1 ± 1,88	44,5 - 58,5	400	51,8 ± 1,62	46,5 - 55,2	138	51,4 ± 1,88	44,5 - 59,0	771
	Tot.	50,8 ± 2,05	43,0 - 59,0	572	50,3 ± 1,84	42,0 - 59,5	1910	51,3 ± 1,76	46,5 - 58,0	235	50,5 ± 1,91	42,0 - 59,5	2717
Tarso	0	17,1 ± 0,85	15,0 - 19,7	119	16,7 ± 0,83	14,8 - 19,9	451	16,6 ± 0,41	16,1 - 17,2	10	16,8 ± 0,84	14,8 - 19,9	580
	F	16,9 ± 0,92	14,9 - 19,4	123	16,7 ± 0,75	14,9 - 19,9	206	16,8 ± 0,77	15,3 - 18,8	36	16,8 ± 0,81	14,9 - 19,9	365
	M	17,1 ± 0,76	15,0 - 19,5	113	16,9 ± 0,74	15,1 - 19,5	172	17,2 ± 0,90	15,0 - 19,0	78	17,0 ± 0,79	15,0 - 19,5	363
	Tot.	17,0 ± 0,85	14,9 - 19,7	355	16,8 ± 0,79	14,8 - 19,9	829	17,0 ± 0,86	15,0 - 19,0	124	16,8 ± 0,82	14,8 - 19,9	1308
Peso	0	10,9 ± 0,88	9,0 - 15,0	241	10,7 ± 0,94	8,5 - 18,8	1097	10,8 ± 0,76	9,5 - 12,3	30	10,7 ± 0,93	8,5 - 18,8	1368
	F	10,8 ± 0,90	8,9 - 17,0	211	10,7 ± 0,80	8,7 - 17,4	479	11,4 ± 1,17	9,4 - 16,7	72	10,8 ± 0,89	8,7 - 17,4	762
	M	11,0 ± 1,00	8,5 - 18,5	256	11,0 ± 0,67	8,8 - 13,4	410	11,2 ± 0,77	9,5 - 13,7	139	11,0 ± 0,81	8,5 - 18,5	805
	Tot.	10,9 ± 0,93	8,5 - 18,5	708	10,7 ± 0,87	8,5 - 18,8	1986	11,2 ± 0,92	9,4 - 16,7	241	10,8 ± 0,90	8,5 - 18,8	2935

Cinciallegra *Parus major*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	74,4 ± 2,85	68,0 - 79,0	33	75,0 ± 2,35	67,0 - 82,0	1181	74,0 ± 1,00	73,0 - 75,0	3	75,0 ± 2,37	67,0 - 82,0	1217
	F	74,0 ± 2,19	68,0 - 80,0	312	74,0 ± 1,75	68,0 - 80,0	1018	74,4 ± 2,07	70,0 - 79,0	80	74,0 ± 1,87	68,0 - 80,0	1410
	M	77,0 ± 2,21	70,0 - 83,0	567	76,6 ± 2,14	69,0 - 83,0	883	77,0 ± 2,47	70,0 - 83,0	248	76,8 ± 2,22	69,0 - 83,0	1698
	Tot.	75,8 ± 2,65	68,0 - 83,0	912	75,1 ± 2,33	67,0 - 83,0	3082	76,3 ± 2,63	70,0 - 83,0	331	75,4 ± 2,46	67,0 - 83,0	4325
3RM	0	57,0 ± 2,59	51,0 - 62,3	18	56,8 ± 2,06	49,0 - 63,0	1197	56,0 ± 1,00	55,0 - 57,0	3	56,8 ± 2,07	49,0 - 63,0	1218
	F	56,1 ± 1,64	51,5 - 61,0	254	56,0 ± 1,42	51,0 - 60,0	1119	56,1 ± 1,61	50,0 - 59,5	84	56,0 ± 1,47	50,0 - 61,0	1457
	M	58,3 ± 1,93	51,0 - 65,0	498	57,8 ± 1,81	50,5 - 63,5	975	58,3 ± 1,88	52,0 - 64,0	245	58,0 ± 1,87	50,5 - 65,0	1718
	Tot.	57,5 ± 2,12	51,0 - 65,0	770	56,8 ± 1,93	49,0 - 63,5	3291	57,7 ± 2,05	50,0 - 64,0	332	57,0 ± 2,00	49,0 - 65,0	4393
Tarsio	0	20,1 ± 0,87	18,3 - 22,0	16	20,0 ± 0,84	17,9 - 22,3	693		19,7 - 20,2	2	20,0 ± 0,84	17,9 - 22,3	711
	F	19,8 ± 0,69	18,0 - 22,0	197	19,7 ± 0,73	18,0 - 22,3	383	19,6 ± 0,70	18,0 - 21,0	52	19,8 ± 0,72	18,0 - 22,3	632
	M	20,3 ± 0,74	18,0 - 22,3	326	20,1 ± 0,80	17,9 - 22,3	350	20,3 ± 0,80	18,0 - 22,3	159	20,2 ± 0,78	17,9 - 22,3	835
	Tot.	20,1 ± 0,77	18,0 - 22,3	539	20,0 ± 0,81	17,9 - 22,3	1426	20,1 ± 0,82	18,0 - 22,3	213	20,0 ± 0,80	17,9 - 22,3	2178
Peso	0	17,6 ± 1,39	14,0 - 20,4	39	16,8 ± 1,23	12,6 - 24,5	1352	16,6 ± 1,39	15,7 - 18,2	3	16,8 ± 1,24	12,6 - 24,5	1394
	F	17,5 ± 1,43	13,0 - 23,6	332	17,0 ± 1,20	14,1 - 22,2	1151	17,6 ± 1,53	15,2 - 22,5	83	17,1 ± 1,29	13,0 - 23,6	1566
	M	18,1 ± 1,21	13,0 - 24,0	626	17,8 ± 1,12	14,2 - 23,0	1008	17,9 ± 0,97	15,2 - 22,0	254	17,9 ± 1,14	13,0 - 24,0	1888
	Tot.	17,9 ± 1,32	13,0 - 24,0	997	17,2 ± 1,25	12,6 - 24,5	3511	17,8 ± 1,14	15,2 - 22,5	340	17,3 ± 1,30	12,6 - 24,5	4848

Picchio muratore *Sitta europaea*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	83,9 ± 2,58	80,0 - 89,0	18	83,5 ± 2,56	80,0 - 88,0	14				83,8 ± 2,54	80,0 - 89,0	32
	F	83,3 ± 1,79	80,0 - 89,0	53	84,1 ± 1,59	81,0 - 86,0	26		80,0 - 87,0	2	83,6 ± 1,82	80,0 - 89,0	81
	M	86,1 ± 2,23	81,0 - 92,0	73	86,0 ± 2,38	81,0 - 90,0	34				86,0 ± 2,27	81,0 - 92,0	107
	Tot.	84,8 ± 2,49	80,0 - 92,0	144	84,8 ± 2,39	80,0 - 90,0	74		80,0 - 87,0	2	84,8 ± 2,47	80,0 - 92,0	220
3RM	0	65,2 ± 1,15	64,5 - 66,5	3	65,2 ± 1,33	63,0 - 67,0	6				65,2 ± 1,20	63,0 - 67,0	9
	F	63,9 ± 1,53	60,5 - 67,0	32	63,5 ± 1,80	59,0 - 65,0	25		64,5 - 66,0	2	63,8 ± 1,65	59,0 - 67,0	59
	M	65,3 ± 1,87	62,0 - 69,0	46	65,3 ± 1,94	61,5 - 69,0	30				65,3 ± 1,89	61,5 - 69,0	76
	Tot.	64,7 ± 1,84	60,5 - 69,0	81	64,6 ± 2,00	59,0 - 69,0	61		64,5 - 66,0	2	64,7 ± 1,89	59,0 - 69,0	144
Tarsio	0	20,6 ± 0,84	19,4 - 22,0	13	20,2 ± 0,80	19,1 - 22,0	14				20,4 ± 0,82	19,1 - 22,0	27
	F	20,5 ± 0,70	19,3 - 22,0	30	19,9 ± 0,56	19,1 - 20,7	11		21,0	1	20,4 ± 0,71	19,1 - 22,0	42
	M	20,6 ± 0,85	19,0 - 22,0	35	20,3 ± 0,83	19,0 - 21,8	16				20,5 ± 0,85	19,0 - 22,0	51
	Tot.	20,6 ± 0,79	19,0 - 22,0	78	20,2 ± 0,75	19,0 - 22,0	41		21,0	1	20,4 ± 0,79	19,0 - 22,0	120
Peso	0	22,1 ± 1,50	19,6 - 25,0	17	21,1 ± 1,66	18,0 - 25,0	19				21,6 ± 1,63	18,0 - 25,0	36
	F	21,7 ± 1,87	19,0 - 29,2	51	20,4 ± 1,24	17,6 - 23,3	26		19,7 - 21,7	2	21,3 ± 1,77	17,6 - 29,2	79
	M	22,5 ± 1,63	18,0 - 28,0	67	21,5 ± 1,37	19,0 - 24,9	34				22,2 ± 1,61	18,0 - 28,0	101
	Tot.	22,2 ± 1,74	18,0 - 29,2	135	21,1 ± 1,47	17,6 - 25,0	79		19,7 - 21,7	2	21,8 ± 1,72	17,6 - 29,2	216

Rampichino alpestre *Certhia familiaris*

		età 2/4			età 3/5			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	66,5 ± 1,78	63,0 - 70,0	24	65,9 ± 1,45	64,0 - 69,0	17	66,2 ± 1,66	63,0 - 70,0	41
	F		63,0	1					63,0 - 63	1
	M		68,0	1					68,0 - 68	1
	Tot.	66,4 ± 1,86	63,0 - 70,0	26	65,9 ± 1,45	64,0 - 69,0	17	66,2 ± 1,72	63,0 - 70,0	43
3RM	0	50,1 ± 1,64	47,0 - 53,0	27	49,4 ± 1,28	47,5 - 52,0	21	49,8 ± 1,52	47,0 - 53,0	48
	F		48,0 - 48	1					48,0 - 48	1
	M		52,0 - 52	1					52,0 - 52	1
	Tot.	50,1 ± 1,67	47,0 - 53,0	29	49,4 ± 1,28	47,5 - 52,0	21	49,8 ± 1,55	47,0 - 53,0	50
Tarsio	0	16,1 ± 0,42	15,4 - 16,8	14	15,9 ± 0,59	14,8 - 16,8	15	16,0 ± 0,51	14,8 - 16,8	29
	F		16,1 - 16,1	1					16,1 - 16,1	1
	M		16,6 - 16,6	1					16,6 - 16,6	1
	Tot.	16,1 ± 0,41	15,4 - 16,8	16	15,9 ± 0,59	14,8 - 16,8	15	16,0 ± 0,51	14,8 - 16,8	31
Peso	0	9,0 ± 0,65	7,4 - 10,5	27	8,9 ± 0,69	7,5 - 10,0	20	8,9 ± 0,66	7,4 - 10,5	47
	F		8,4 - 8,4	1					8,4 - 8,4	1
	M		9,1 - 9,1	1					9,1 - 9,1	1
	Tot.	8,9 ± 0,63	7,4 - 10,5	29	8,9 ± 0,69	7,5 - 10,0	20	8,9 ± 0,65	7,4 - 10,5	49

Rampichino comune *Certhia brachydactyla*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	62,6 ± 2,16	58,0 - 68,0	40	62,0 ± 2,35	59,0 - 66,0	14		60,0 - 62,0	2	62,4 ± 2,19	58,0 - 68,0	56
	F	59,8 ± 1,56	58,0 - 63,0	9							59,8 ± 1,56	58,0 - 63,0	9
	M	63,4 ± 2,07	60,0 - 66,0	12					59,0	1	63,1 ± 2,33	59,0 - 66,0	13
	Tot.	62,3 ± 2,32	58,0 - 68,0	61	62,0 ± 2,35	59,0 - 66,0	14	60,3 ± 1,53	59,0 - 62,0	3	62,2 ± 2,31	58,0 - 68,0	78
3RM	0	47,3 ± 1,76	44,5 - 51,5	27	46,9 ± 2,51	42,0 - 51,0	13		45,0 - 47,0	2	47,1 ± 1,99	42,0 - 51,5	42
	F	45,3 ± 1,64	43,0 - 48,0	9							45,3 ± 1,64	43,0 - 48,0	9
	M	47,7 ± 1,22	46,0 - 49,5	13					46,0	1	47,5 ± 1,25	46,0 - 49,5	14
	Tot.	47,0 ± 1,79	43,0 - 51,5	49	46,9 ± 2,51	42,0 - 51,0	13	46,0 ± 1,00	45,0 - 47,0	3	46,9 ± 1,91	42,0 - 51,5	65
Tarsio	0	15,7 ± 0,64	14,5 - 16,5	24	15,9 ± 0,37	15,3 - 16,5	7		15,0 - 16,2	2	15,7 ± 0,60	14,5 - 16,5	33
	F	16,0 ± 0,41	15,5 - 16,5	4							16,0 ± 0,41	15,5 - 16,5	4
	M	16,0 ± 0,41	15,5 - 16,5	4					15,9	1	16,0 ± 0,36	15,5 - 16,5	5
	Tot.	15,8 ± 0,60	14,5 - 16,5	32	15,9 ± 0,37	15,3 - 16,5	7	15,7 ± 0,62	15,0 - 16,2	3	15,8 ± 0,56	14,5 - 16,5	42
Peso	0	8,5 ± 0,48	7,5 - 9,5	38	8,3 ± 0,69	7,0 - 9,5	16		8,0 - 8,9	2	8,4 ± 0,55	7,0 - 9,5	56
	F	9,2 ± 1,07	7,5 - 10,9	8					8,0	1	9,0 ± 1,07	7,5 - 10,9	9
	M	8,6 ± 0,48	7,8 - 9,2	12					9,0	1	8,6 ± 0,47	7,8 - 9,2	13
	Tot.	8,6 ± 0,63	7,5 - 10,9	58	8,3 ± 0,69	7,0 - 9,5	16	8,5 ± 0,55	8,0 - 9,0	4	8,5 ± 0,64	7,0 - 10,9	78

Pendolino *Remiz pendulinus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	55,5 ± 1,34	53,0 - 58,0	22	55,1 ± 1,31	51,0 - 58,0	114				55,2 ± 1,32	51,0 - 58,0	136
	F	55,9 ± 1,52	53,0 - 59,0	40	54,7 ± 1,23	51,5 - 58,0	137	54,5 ± 1,25	52,0 - 56,0	20	54,9 ± 1,39	51,5 - 59,0	197
	M	56,1 ± 1,58	53,0 - 60,0	79	55,1 ± 1,22	52,0 - 59,0	229	55,5 ± 1,51	52,0 - 59,0	131	55,4 ± 1,43	52,0 - 60,0	439
	Tot.	55,9 ± 1,53	53,0 - 60,0	141	55,0 ± 1,26	51,0 - 59,0	480	55,4 ± 1,51	52,0 - 59,0	151	55,2 ± 1,41	51,0 - 60,0	772
3RM	0	42,8 ± 1,07	40,5 - 44,5	25	42,2 ± 1,00	39,5 - 45,0	117				42,3 ± 1,04	39,5 - 45,0	142
	F	42,5 ± 1,05	40,0 - 45,0	43	42,0 ± 1,07	39,0 - 44,5	142	41,9 ± 1,01	40,5 - 43,5	20	42,1 ± 1,07	39,0 - 45,0	205
	M	43,0 ± 1,36	40,0 - 47,0	80	42,4 ± 0,99	40,0 - 46,0	232	42,8 ± 1,20	40,5 - 46,0	130	42,6 ± 1,15	40,0 - 47,0	442
	Tot.	42,8 ± 1,25	40,0 - 47,0	148	42,2 ± 1,02	39,0 - 46,0	491	42,6 ± 1,21	40,5 - 46,0	150	42,4 ± 1,13	39,0 - 47,0	789
Tarsio	0	14,3 ± 0,62	13,2 - 15,9	18	14,6 ± 0,61	13,3 - 16,6	73				14,6 ± 0,63	13,2 - 16,6	91
	F	14,3 ± 0,55	13,3 - 15,8	23	14,7 ± 0,64	13,6 - 16,5	62	14,9 ± 0,76	13,3 - 16,0	15	14,7 ± 0,66	13,3 - 16,5	100
	M	14,4 ± 0,54	13,5 - 16,0	39	14,6 ± 0,67	13,2 - 16,5	121	14,6 ± 0,69	13,4 - 16,3	74	14,6 ± 0,66	13,2 - 16,5	234
	Tot.	14,3 ± 0,56	13,2 - 16,0	80	14,6 ± 0,65	13,2 - 16,6	256	14,6 ± 0,70	13,3 - 16,3	89	14,6 ± 0,65	13,2 - 16,6	425
Peso	0	9,4 ± 0,86	7,4 - 11,2	21	9,8 ± 0,66	8,3 - 11,5	115				9,7 ± 0,71	7,4 - 11,5	136
	F	9,7 ± 0,65	8,0 - 11,2	41	9,5 ± 0,58	8,3 - 11,2	139	9,6 ± 0,41	9,0 - 10,3	20	9,5 ± 0,58	8,0 - 11,2	200
	M	9,7 ± 0,55	8,7 - 11,5	79	9,6 ± 0,55	8,2 - 12,0	230	9,5 ± 0,54	8,0 - 10,9	131	9,6 ± 0,55	8,0 - 12,0	440
	Tot.	9,7 ± 0,64	7,4 - 11,5	141	9,6 ± 0,60	8,2 - 12,0	484	9,5 ± 0,52	8,0 - 10,9	151	9,6 ± 0,59	7,4 - 12,0	776

Rigogolo *Oriolus oriolus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	150,8 ± 2,22	148,0 - 153,0	4	149,5 ± 3,99	142,0 - 156,0	18		153,0	1	149,9 ± 3,70	142,0 - 156,0	23
	F	151,4 ± 2,82	147,0 - 156,0	30	153,1 ± 2,59	150,0 - 158,0	8	151,0 ± 3,02	145,0 - 154,0	8	151,7 ± 2,85	145,0 - 158,0	46
	M	153,4 ± 2,07	150,0 - 155,0	10	152,4 ± 2,82	148,0 - 158,0	14	152,3 ± 4,46	146,0 - 160,0	13	152,6 ± 3,28	146,0 - 160,0	37
	Tot.	151,8 ± 2,72	147,0 - 156,0	44	151,2 ± 3,66	142,0 - 158,0	40	151,9 ± 3,86	145,0 - 160,0	22	151,6 ± 3,33	142,0 - 160,0	106
3RM	0	111,8 ± 4,54	107,0 - 116,0	3	112,8 ± 3,33	107,0 - 117,0	12		115,0	1	112,7 ± 3,37	107,0 - 117,0	16
	F	112,6 ± 1,90	110,0 - 116,0	22	113,2 ± 1,20	111,5 - 115,0	8	112,3 ± 2,76	109,0 - 116,0	9	112,6 ± 2,00	109,0 - 116,0	39
	M	113,8 ± 1,67	111,0 - 116,0	8	113,1 ± 2,50	109,5 - 117,0	9	115,8 ± 3,86	110,0 - 121,0	9	114,2 ± 2,99	109,5 - 121,0	26
	Tot.	112,8 ± 2,15	107,0 - 116,0	33	113,0 ± 2,56	107,0 - 117,0	29	114,1 ± 3,62	109,0 - 121,0	19	113,2 ± 2,71	107,0 - 121,0	81
Tarsio	0	23,1 ± 0,26	22,9 - 23,4	3	23,7 ± 0,79	22,2 - 25,0	10				23,6 ± 0,75	22,2 - 25,0	13
	F	23,6 ± 0,94	22,0 - 25,3	20	24,0 ± 0,50	23,5 - 24,5	3		22,0 - 25,0	2	23,6 ± 0,96	22,0 - 25,3	25
	M	23,2 ± 0,79	21,9 - 24,0	6	23,0 ± 1,46	20,5 - 24,0	5	22,8 ± 0,82	21,8 - 24,0	9	23,0 ± 0,97	20,5 - 24,0	20
	Tot.	23,5 ± 0,87	21,9 - 25,3	29	23,6 ± 1,00	20,5 - 25,0	18	22,9 ± 1,04	21,8 - 25,0	11	23,4 ± 0,96	20,5 - 25,3	58
Peso	0	77,2 ± 18,02	65,7 - 98,0	3	80,9 ± 12,55	66,0 - 101,0	16		71,0	1	79,9 ± 12,83	65,7 - 101,0	20
	F	72,4 ± 7,56	60,0 - 90,0	27	68,7 ± 6,36	60,0 - 79,0	8	67,6 ± 5,42	61,8 - 80,0	9	70,7 ± 7,15	60,0 - 90,0	44
	M	78,8 ± 15,24	64,4 - 105,0	9	69,4 ± 8,27	60,0 - 93,0	14	68,1 ± 12,55	58,0 - 108,0	13	71,3 ± 12,34	58,0 - 108,0	36
	Tot.	74,2 ± 10,64	60,0 - 105,0	39	74,1 ± 11,42	60,0 - 101,0	38	68,1 ± 9,85	58,0 - 108,0	23	72,8 ± 10,97	58,0 - 108,0	100

Averla piccola *Lanius collurio*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
sezzo		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	93,8 ± 0,84	93,0 - 95,0	5	92,4 ± 2,24	86,0 - 97,0	236				92,5 ± 2,22	86,0 - 97,0	241
	F	93,5 ± 2,38	88,0 - 100,0	174	92,7 ± 1,89	91,0 - 96,0	7	94,2 ± 2,77	92,0 - 99,0	5	93,5 ± 2,37	88,0 - 100,0	186
	M	93,7 ± 2,14	89,0 - 99,0	171	94,2 ± 2,92	91,0 - 98,0	8		97,0	1	93,7 ± 2,18	89,0 - 99,0	180
	Tot.	93,6 ± 2,25	88,0 - 100,0	350	92,5 ± 2,26	86,0 - 98,0	251	94,7 ± 2,73	92,0 - 99,0	6	93,2 ± 2,32	86,0 - 100,0	607
3RM	0	69,7 ± 0,61	69,0 - 70,5	6	69,5 ± 1,98	63,5 - 75,5	244				69,5 ± 1,95	63,5 - 75,5	250
	F	71,0 ± 2,08	66,0 - 77,0	165	71,2 ± 1,47	68,5 - 73,0	7	71,8 ± 2,77	69,0 - 76,0	5	71,1 ± 2,07	66,0 - 77,0	177
	M	71,1 ± 2,00	62,5 - 75,0	167	70,5 ± 1,84	68,0 - 73,7	8		72,5 - 73,5	2	71,1 ± 1,99	62,5 - 75,0	177
	Tot.	71,0 ± 2,03	62,5 - 77,0	338	69,5 ± 1,98	63,5 - 75,5	259	72,1 ± 2,36	69,0 - 76,0	7	70,4 ± 2,15	62,5 - 77,0	604
Tarsio	0	23,6 ± 1,95	22,1 - 25,8	3	23,2 ± 0,80	21,3 - 25,9	170				23,2 ± 0,82	21,3 - 25,9	173
	F	23,4 ± 0,90	21,5 - 26,0	152	23,4 ± 0,81	22,0 - 24,3	7	23,5 ± 1,39	22,0 - 25,5	5	23,4 ± 0,91	21,5 - 26,0	164
	M	23,5 ± 0,99	21,5 - 26,2	145	23,4 ± 0,83	22,5 - 24,1	3		23,2 - 25,1	2	23,5 ± 0,98	21,5 - 26,2	150
	Tot.	23,4 ± 0,95	21,5 - 26,2	300	23,2 ± 0,80	21,3 - 25,9	180	23,7 ± 1,30	22,0 - 25,5	7	23,4 ± 0,91	21,3 - 26,2	487
Peso	0	30,8 ± 5,95	26,0 - 40,5	6	28,3 ± 3,05	21,5 - 38,8	257				28,4 ± 3,15	21,5 - 40,5	263
	F	28,9 ± 3,12	23,5 - 37,4	174	29,7 ± 2,77	26,5 - 34,0	7	28,4 ± 2,92	25,0 - 32,0	4	28,9 ± 3,09	23,5 - 37,4	185
	M	27,6 ± 2,33	23,2 - 38,2	176	28,8 ± 1,57	26,2 - 31,5	8		27,2 - 29,0	2	27,6 ± 2,30	23,2 - 38,2	186
	Tot.	28,3 ± 2,91	23,2 - 40,5	356	28,4 ± 3,01	21,5 - 38,8	272	28,3 ± 2,34	25,0 - 32,0	6	28,3 ± 2,95	21,5 - 40,5	634

Ghiandaia *Garrulus glandarius*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
sezzo		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	184,0 ± 6,71	166,0 - 199,0	245	182,4 ± 5,95	167,0 - 199,0	243	186,1 ± 5,81	172,0 - 197,0	56	183,5 ± 6,38	166,0 - 199,0	544
	F	184,1 ± 8,09	166,0 - 198,0	21	182,0 ± 7,11	165,0 - 195,0	24	182,6 ± 6,38	171,0 - 195,0	25	182,8 ± 7,12	165,0 - 198,0	70
	M		190,0	1		188,0 - 188	1	190,4 ± 4,88	184,0 - 199,0	8	190,1 ± 4,36	184,0 - 199,0	10
	Tot.	184,0 ± 6,81	166,0 - 199,0	267	182,4 ± 6,04	165,0 - 199,0	268	185,5 ± 6,24	171,0 - 199,0	89	183,5 ± 6,49	165,0 - 199,0	624
3RM	0	132,9 ± 4,57	120,0 - 149,0	193	132,2 ± 4,90	119,0 - 147,0	236	134,7 ± 5,10	123,0 - 142,0	55	132,8 ± 4,85	119,0 - 149,0	484
	F	133,0 ± 5,12	125,0 - 141,0	20	132,0 ± 4,36	124,5 - 142,0	27	132,8 ± 5,59	122,0 - 144,0	23	132,6 ± 4,95	122,0 - 144,0	70
	M		141,0 - 141	1		132,0 - 137,0	2	138,6 ± 5,39	133,0 - 149,0	8	138,1 ± 5,02	132,0 - 149,0	11
	Tot.	132,9 ± 4,63	120,0 - 149,0	214	132,2 ± 4,83	119,0 - 147,0	265	134,6 ± 5,42	122,0 - 149,0	86	132,8 ± 4,91	119,0 - 149,0	565
Tarsio	0	42,9 ± 1,49	39,3 - 47,0	129	42,9 ± 1,63	39,4 - 47,0	97	43,5 ± 1,52	41,5 - 47,0	26	43,0 ± 1,55	39,3 - 47,0	252
	F	43,4 ± 1,35	41,0 - 45,3	11	42,1 ± 1,72	40,0 - 45,5	11	42,4 ± 1,72	39,2 - 45,5	15	42,6 ± 1,67	39,2 - 45,5	37
	M		45,5 - 45,5	1				43,5 ± 1,52	41,5 - 44,8	4	43,9 ± 1,58	41,5 - 45,5	5
	Tot.	43,0 ± 1,49	39,3 - 47,0	141	42,8 ± 1,65	39,4 - 47,0	108	43,1 ± 1,63	39,2 - 47,0	45	42,9 ± 1,57	39,2 - 47,0	294
Peso	0	167,8 ± 12,34	131,0 - 200,0	227	165,6 ± 12,42	133,0 - 202,0	240	168,4 ± 11,24	143,0 - 201,0	53	166,8 ± 12,30	131,0 - 202,0	520
	F	171,7 ± 15,83	145,0 - 202,0	19	166,0 ± 9,57	133,0 - 186,0	26	169,9 ± 15,47	143,0 - 196,0	24	168,9 ± 13,66	133,0 - 202,0	69
	M		155,0 - 191,5	2		144,0 - 156,0	2	169,5 ± 9,36	153,0 - 180,0	8	166,9 ± 13,67	144,0 - 191,5	12
	Tot.	168,1 ± 12,71	131,0 - 202,0	248	165,5 ± 12,20	133,0 - 202,0	268	168,9 ± 12,31	143,0 - 201,0	85	167,1 ± 12,48	131,0 - 202,0	601

Gazza *Pica pica*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
sezzo		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	187,1 ± 6,27	170,0 - 197,0	25	183,2 ± 6,44	170,0 - 197,0	83	187,5 ± 7,34	175,0 - 198,0	11	184,4 ± 6,69	170,0 - 198,0	119
	F	182,2 ± 6,14	177,0 - 191,0	5	179,6 ± 7,11	171,0 - 190,0	7	186,3 ± 9,09	172,0 - 198,0	6	182,6 ± 7,73	171,0 - 198,0	18
	M		185,0	1					197,0 - 197	1		185,0 - 197,0	2
	Tot.	186,2 ± 6,31	170,0 - 197,0	31	182,9 ± 6,52	170,0 - 197,0	90	187,7 ± 7,86	172,0 - 198,0	18	184,3 ± 6,87	170,0 - 198,0	139
3RM	0	136,9 ± 4,99	123,0 - 145,0	21	134,4 ± 5,46	122,0 - 146,0	81	137,2 ± 6,50	126,5 - 146,5	10	135,1 ± 5,55	122,0 - 146,5	112
	F	135,4 ± 5,18	131,0 - 142,0	5	133,2 ± 6,09	125,0 - 142,0	8	139,3 ± 6,38	128,0 - 146,0	6	135,7 ± 6,23	125,0 - 146,0	19
	M		136,0 - 136	1					145,5 - 145,5	1		136,0 - 145,5	2
	Tot.	136,6 ± 4,87	123,0 - 145,0	27	134,3 ± 5,49	122,0 - 146,0	89	138,4 ± 6,40	126,5 - 146,5	17	135,3 ± 5,66	122,0 - 146,5	133
Tarsio	0	48,2 ± 2,96	45,0 - 52,0	7	47,2 ± 2,25	44,0 - 52,4	32	49,6 ± 0,44	49,1 - 50,0	4	47,6 ± 2,36	44,0 - 52,4	43
	F	50,2 ± 0,81	49,7 - 51,1	3	48,0 ± 2,00	44,4 - 50,0	6	45,7 ± 0,00	45,7 - 45,7	2	48,2 ± 2,14	44,4 - 51,1	11
	M		43,9 - 43,9	1					52,0 - 52	1		43,9 - 52,0	2
	Tot.	48,3 ± 2,90	43,9 - 52,0	11	47,3 ± 2,20	44,0 - 52,4	38	48,9 ± 2,34	45,7 - 52,0	7	47,7 ± 2,40	43,9 - 52,4	56
Peso	0	188,1 ± 20,92	128,0 - 217,0	27	167,3 ± 23,13	103,0 - 218,0	83	202,2 ± 22,55	168,0 - 248,0	13	175,6 ± 25,69	103,0 - 248,0	123
	F	189,6 ± 19,62	172,0 - 218,0	5	178,4 ± 21,15	134,0 - 211,0	9	195,4 ± 32,66	165,0 - 245,0	7	186,7 ± 25,21	134,0 - 245,0	21
	M		165,0 - 165	1					252,0 - 252	1		165,0 - 252,0	2
	Tot.	187,7 ± 20,50	128,0 - 218,0	33	168,4 ± 23,07	103,0 - 218,0	92	202,3 ± 27,67	165,0 - 252,0	21	177,6 ± 26,41	103,0 - 252,0	146

Storno *Sturnus vulgaris*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	127,6 ± 4,25	113,0 - 133,0	20	121,6 ± 4,33	109,0 - 135,0	503				121,9 ± 4,47	109,0 - 135,0	523
	F	128,7 ± 3,07	118,0 - 137,0	362	125,3 ± 4,06	110,0 - 135,0	389	130,3 ± 3,24	119,0 - 135,0	51	127,2 ± 4,03	110,0 - 137,0	802
	M	131,0 ± 3,23	118,0 - 142,0	300	127,8 ± 4,03	112,0 - 139,0	427	133,1 ± 2,63	124,0 - 139,0	107	129,6 ± 4,12	112,0 - 142,0	834
	Tot.	129,7 ± 3,39	113,0 - 142,0	682	124,7 ± 4,90	109,0 - 139,0	1319	132,2 ± 3,13	119,0 - 139,0	158	126,8 ± 5,14	109,0 - 142,0	2159
3RM	0	93,1 ± 2,12	90,0 - 96,0	8	88,2 ± 3,26	77,0 - 99,0	450				88,3 ± 3,31	77,0 - 99,0	458
	F	95,3 ± 2,50	86,0 - 101,0	234	91,1 ± 4,24	77,0 - 102,0	287	96,3 ± 2,78	88,0 - 102,0	49	93,3 ± 4,14	77,0 - 102,0	570
	M	96,9 ± 3,00	84,0 - 107,0	180	92,7 ± 3,95	81,0 - 103,0	304	98,3 ± 2,46	90,5 - 104,0	83	94,8 ± 4,21	81,0 - 107,0	567
	Tot.	96,0 ± 2,84	84,0 - 107,0	422	90,3 ± 4,22	77,0 - 103,0	1041	97,6 ± 2,76	88,0 - 104,0	132	92,4 ± 4,77	77,0 - 107,0	1595
Tarsio	0	30,0 ± 1,17	27,0 - 32,3	15	29,2 ± 1,06	27,0 - 32,5	345				29,3 ± 1,07	27,0 - 32,5	360
	F	29,3 ± 1,02	27,0 - 32,0	133	29,1 ± 0,97	27,0 - 32,0	38	29,6 ± 0,60	28,6 - 30,8	17	29,3 ± 0,98	27,0 - 32,0	188
	M	30,0 ± 1,08	27,9 - 32,0	139	29,6 ± 0,95	27,5 - 32,0	39	29,7 ± 0,94	27,9 - 32,0	34	29,8 ± 1,04	27,5 - 32,0	212
	Tot.	29,7 ± 1,10	27,0 - 32,3	287	29,3 ± 1,04	27,0 - 32,5	422	29,7 ± 0,84	27,9 - 32,0	51	29,4 ± 1,07	27,0 - 32,5	760
Peso	0	76,2 ± 4,31	68,0 - 84,0	26	68,2 ± 5,98	50,5 - 89,0	602				68,5 ± 6,13	50,5 - 89,0	628
	F	74,2 ± 6,15	55,0 - 102,0	339	71,2 ± 5,87	57,0 - 101,0	475	74,6 ± 5,85	63,3 - 92,0	50	72,6 ± 6,15	55,0 - 102,0	864
	M	76,9 ± 5,16	62,0 - 100,0	284	74,0 ± 5,53	51,5 - 99,0	514	77,8 ± 4,42	68,3 - 90,0	106	75,4 ± 5,52	51,5 - 100,0	904
	Tot.	75,4 ± 5,82	55,0 - 102,0	649	71,0 ± 6,29	50,5 - 101,0	1591	76,8 ± 5,13	63,3 - 92,0	156	72,6 ± 6,50	50,5 - 102,0	2396

Passera d'Italia *Passer domesticus italiae*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	77,7 ± 3,15	72,0 - 83,0	15	75,2 ± 2,53	70,0 - 82,0	383	75,3 ± 2,60	70,0 - 83,0	398
	F	76,6 ± 2,12	72,0 - 82,0	715	75,7 ± 2,67	70,0 - 81,0	77	76,5 ± 2,20	70,0 - 82,0	792
	M	79,4 ± 2,18	72,0 - 85,0	950	77,4 ± 2,80	72,0 - 83,0	109	79,2 ± 2,33	72,0 - 85,0	1059
	Tot.	78,2 ± 2,55	72,0 - 85,0	1680	75,7 ± 2,73	70,0 - 83,0	569	77,6 ± 2,81	70,0 - 85,0	2249
3RM	0	56,6 ± 2,45	52,0 - 60,0	10	56,2 ± 2,00	51,0 - 62,0	341	56,2 ± 2,01	51,0 - 62,0	351
	F	57,9 ± 1,73	51,0 - 62,0	534	56,7 ± 2,17	51,0 - 60,3	57	57,7 ± 1,80	51,0 - 62,0	591
	M	60,2 ± 1,76	53,0 - 65,0	685	58,2 ± 2,23	53,5 - 63,0	94	60,0 ± 1,93	53,0 - 65,0	779
	Tot.	59,2 ± 2,11	51,0 - 65,0	1229	56,7 ± 2,20	51,0 - 63,0	492	58,4 ± 2,42	51,0 - 65,0	1721
Tarsio	0	19,2 ± 1,05	17,4 - 21,0	18	19,1 ± 0,72	16,9 - 21,0	287	19,1 ± 0,74	16,9 - 21,0	305
	F	19,3 ± 0,84	16,8 - 21,0	395	19,1 ± 0,72	17,6 - 20,5	66	19,2 ± 0,83	16,8 - 21,0	461
	M	19,5 ± 0,88	17,0 - 21,0	528	18,9 ± 0,81	17,0 - 21,0	100	19,4 ± 0,89	17,0 - 21,0	628
	Tot.	19,4 ± 0,87	16,8 - 21,0	941	19,0 ± 0,74	16,9 - 21,0	453	19,3 ± 0,85	16,8 - 21,0	1394
Peso	0	26,3 ± 3,14	18,9 - 31,0	21	26,0 ± 1,90	17,5 - 30,6	455	26,0 ± 1,97	17,5 - 31,0	476
	F	27,5 ± 2,20	18,4 - 37,4	735	26,6 ± 2,14	21,9 - 32,1	81	27,4 ± 2,21	18,4 - 37,4	816
	M	27,6 ± 1,85	20,3 - 35,5	928	27,2 ± 2,02	22,0 - 33,5	125	27,5 ± 1,87	20,3 - 35,5	1053
	Tot.	27,5 ± 2,03	18,4 - 37,4	1684	26,3 ± 2,02	17,5 - 33,5	661	27,2 ± 2,10	17,5 - 37,4	2345

Passera mattugia *Passer montanus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	69,8 ± 1,97	62,0 - 76,0	3630	66,6 ± 2,25	62,0 - 76,5	852	69,2 ± 2,38	62,0 - 76,5	4482
	F	68,3 ± 1,24	62,0 - 73,0	751	68,5 ± 2,26	63,0 - 74,0	22	68,3 ± 1,28	62,0 - 74,0	773
	M	72,4 ± 1,42	64,0 - 76,0	591	71,9 ± 2,37	68,0 - 75,0	9	72,4 ± 1,44	64,0 - 76,0	600
	Tot.	69,9 ± 2,11	62,0 - 76,0	4972	66,7 ± 2,33	62,0 - 76,5	883	69,4 ± 2,42	62,0 - 76,5	5855
3RM	0	52,7 ± 1,65	45,0 - 60,0	3487	50,1 ± 2,17	44,0 - 60,5	735	52,3 ± 2,01	44,0 - 60,5	4222
	F	51,5 ± 1,20	44,5 - 55,5	592	52,1 ± 2,09	48,0 - 56,5	18	51,5 ± 1,24	44,5 - 56,5	610
	M	54,1 ± 1,35	47,0 - 61,0	434	54,2 ± 2,01	52,0 - 57,0	8	54,1 ± 1,36	47,0 - 61,0	442
	Tot.	52,7 ± 1,69	44,5 - 61,0	4513	50,2 ± 2,22	44,0 - 60,5	761	52,3 ± 1,98	44,0 - 61,0	5274
Tarsio	0	17,4 ± 0,83	14,9 - 20,7	1229	17,4 ± 0,79	15,0 - 20,7	616	17,4 ± 0,82	14,9 - 20,7	1845
	F	17,4 ± 0,83	15,5 - 20,5	127	17,1 ± 1,05	16,0 - 19,0	6	17,4 ± 0,84	15,5 - 20,5	133
	M	17,8 ± 1,07	15,5 - 20,3	47	18,3 ± 1,42	17,0 - 19,8	3	17,9 ± 1,08	15,5 - 20,3	50
	Tot.	17,4 ± 0,84	14,9 - 20,7	1403	17,4 ± 0,80	15,0 - 20,7	625	17,4 ± 0,83	14,9 - 20,7	2028
Peso	0	20,9 ± 1,39	14,5 - 28,9	4361	19,3 ± 1,75	12,6 - 28,8	1165	20,6 ± 1,61	12,6 - 28,9	5526
	F	20,5 ± 1,59	14,2 - 28,0	713	19,3 ± 1,50	15,7 - 22,2	23	20,5 ± 1,60	14,2 - 28,0	736
	M	21,2 ± 1,29	15,0 - 26,4	572	19,6 ± 1,77	16,6 - 22,5	15	21,2 ± 1,33	15,0 - 26,4	587
	Tot.	20,9 ± 1,42	14,2 - 28,9	5646	19,3 ± 1,74	12,6 - 28,8	1203	20,6 ± 1,60	12,6 - 28,9	6849

Passera lagia *Petronia petronia*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	97,5 ± 3,01	90,0 - 101,0	13	94,6 ± 1,88	90,0 - 98,0	29				95,5 ± 2,67	90,0 - 101,0	42
	F		96,0	1					97,0	1		96,0 - 97,0	2
	M								100,0	1		100,0	1
	Tot.	97,4 ± 3,01	90,0 - 101,0	14	94,6 ± 1,88	90,0 - 98,0	29		97,0 - 100,0	2	95,6 ± 2,67	90,0 - 101,0	45
3RM	0	72,0 ± 2,65	67,0 - 76,0	13	68,9 ± 1,59	66,0 - 72,0	29				69,9 ± 2,42	66,0 - 76,0	42
	F		72,0	1								72,0	1
	M												
	Tot.	72,0 ± 2,55	67,0 - 76,0	14	68,9 ± 1,59	66,0 - 72,0	29				69,9 ± 2,41	66,0 - 76,0	43
Tarso	0	19,0 ± 0,49	18,5 - 19,7	5	18,9 ± 0,60	17,9 - 20,0	9				18,9 ± 0,54	17,9 - 20,0	14
	F												
	M												
	Tot.	19,0 ± 0,49	18,5 - 19,7	5	18,9 ± 0,60	17,9 - 20,0	9				18,9 ± 0,54	17,9 - 20,0	14
Peso	0	34,5 ± 2,12	29,8 - 37,2	14	33,0 ± 1,54	29,5 - 35,7	30				33,5 ± 1,86	29,5 - 37,2	44
	F		33,8	1		33,0	1		33,0 - 33	1	33,3 ± 0,46	33,0 - 33,8	3
	M					32,0	1		32,0 - 32	1		32,0 - 32,0	2
	Tot.	34,4 ± 2,05	29,8 - 37,2	15	33,0 ± 1,50	29,5 - 35,7	32		32,0 - 33,0	2	33,4 ± 1,78	29,5 - 37,2	49

Fringuello *Fringilla coelebs*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	87,0 ± 3,35	77,0 - 97,0	73	89,8 ± 3,96	79,0 - 96,0	28	93,4 ± 3,05	89,0 - 97,0	5	88,0 ± 3,88	77,0 - 97,0	106
	F	84,2 ± 1,98	77,0 - 90,0	2176	84,5 ± 2,16	77,0 - 90,0	1363	85,1 ± 1,96	79,0 - 90,0	274	84,4 ± 2,06	77,0 - 90,0	3813
	M	89,4 ± 2,07	80,0 - 99,0	3973	90,9 ± 2,34	80,0 - 98,0	2063	91,5 ± 2,23	83,0 - 99,0	359	90,1 ± 2,30	80,0 - 99,0	6395
	Tot.	87,6 ± 3,24	77,0 - 99,0	6222	88,4 ± 3,88	77,0 - 98,0	3454	88,8 ± 3,86	79,0 - 99,0	638	87,9 ± 3,53	77,0 - 99,0	10314
3RM	0	67,4 ± 3,48	57,0 - 79,0	83	69,3 ± 4,61	57,5 - 77,5	25	70,5 ± 1,66	69,0 - 72,5	5	67,9 ± 3,81	57,0 - 79,0	113
	F	64,4 ± 1,69	57,0 - 73,0	2976	64,9 ± 1,72	59,0 - 73,5	1371	65,4 ± 1,76	60,5 - 72,5	296	64,6 ± 1,73	57,0 - 73,5	4643
	M	68,9 ± 1,87	60,0 - 79,0	4925	70,2 ± 1,98	61,5 - 79,0	2083	70,8 ± 1,82	64,0 - 76,0	377	69,3 ± 2,03	60,0 - 79,0	7385
	Tot.	67,2 ± 2,81	57,0 - 79,0	7984	68,1 ± 3,25	57,5 - 79,0	3479	68,4 ± 3,24	60,5 - 76,0	678	67,5 ± 3,01	57,0 - 79,0	2141
Tarso	0	18,8 ± 0,65	17,2 - 20,5	53	19,0 ± 0,59	18,4 - 19,8	4		19,0	1	18,8 ± 0,63	17,2 - 20,5	58
	F	18,3 ± 0,70	16,4 - 20,6	482	18,4 ± 0,80	16,5 - 20,5	299	18,4 ± 0,78	17,0 - 20,8	69	18,3 ± 0,75	16,4 - 20,8	850
	M	18,6 ± 0,72	16,2 - 20,5	685	18,6 ± 0,80	16,5 - 20,8	362	18,7 ± 0,69	16,9 - 20,0	74	18,6 ± 0,75	16,2 - 20,8	1121
	Tot.	18,4 ± 0,73	16,2 - 20,6	1220	18,5 ± 0,80	16,5 - 20,8	665	18,5 ± 0,74	16,9 - 20,8	144	18,5 ± 0,75	16,2 - 20,8	2029
Peso	0	21,8 ± 1,89	17,7 - 30,8	85	21,9 ± 1,63	19,2 - 25,0	34	24,2 ± 1,81	21,5 - 26,1	5	21,9 ± 1,87	17,7 - 30,8	124
	F	21,1 ± 1,57	15,3 - 29,0	3093	21,1 ± 1,54	17,0 - 26,5	1634	21,2 ± 1,72	16,2 - 26,5	290	21,1 ± 1,57	15,3 - 29,0	5017
	M	23,1 ± 1,55	15,5 - 30,3	5203	22,8 ± 1,54	17,0 - 29,0	2536	23,6 ± 1,61	19,7 - 28,6	379	23,0 ± 1,56	15,5 - 30,3	8118
	Tot.	22,3 ± 1,82	15,3 - 30,8	8381	22,1 ± 1,77	17,0 - 29,0	4204	22,6 ± 2,05	16,2 - 28,6	674	22,3 ± 1,82	15,3 - 30,8	3259

Peppola *Fringilla montifringilla*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	90,1 ± 4,31	82,0 - 98,0	38	89,4 ± 5,98	82,0 - 98,0	11				89,9 ± 4,67	82,0 - 98,0	49
	F	87,9 ± 1,92	81,0 - 96,0	3178	88,3 ± 2,02	82,0 - 95,5	1575	88,3 ± 2,06	84,0 - 94,0	79	88,0 ± 1,97	81,0 - 96,0	4832
	M	92,9 ± 2,06	84,0 - 100,0	3807	94,0 ± 2,16	84,0 - 100,0	2423	94,0 ± 2,22	88,0 - 99,0	111	93,3 ± 2,16	84,0 - 100,0	6341
	Tot.	90,6 ± 3,20	81,0 - 100,0	7023	91,7 ± 3,48	82,0 - 100,0	4009	91,6 ± 3,55	84,0 - 99,0	190	91,0 ± 3,36	81,0 - 100,0	1222
3RM	0	71,8 ± 5,61	61,0 - 79,5	36	70,8 ± 5,56	62,0 - 79,0	15				71,5 ± 5,55	61,0 - 79,5	51
	F	67,6 ± 1,71	61,0 - 76,5	3961	67,7 ± 1,78	61,5 - 76,0	2076	67,5 ± 1,90	63,0 - 73,5	161	67,6 ± 1,74	61,0 - 76,5	6198
	M	71,7 ± 1,76	65,0 - 78,5	4496	72,6 ± 1,94	64,0 - 79,5	2642	72,3 ± 1,84	67,0 - 77,0	221	72,0 ± 1,87	64,0 - 79,5	7359
	Tot.	69,8 ± 2,71	61,0 - 79,5	8493	70,5 ± 3,06	61,5 - 79,5	4733	70,3 ± 3,02	63,0 - 77,0	382	70,0 ± 2,86	61,0 - 79,5	3608
Tarso	0	18,7 ± 0,33	18,2 - 19,1	8	19,0 ± 0,78	18,1 - 19,5	3				18,8 ± 0,46	18,1 - 19,5	11
	F	19,0 ± 0,72	17,3 - 20,5	180	18,9 ± 0,68	17,5 - 20,5	87	18,8 ± 0,45	18,2 - 19,3	5	18,9 ± 0,70	17,3 - 20,5	272
	M	19,1 ± 0,61	17,8 - 20,5	123	19,2 ± 0,64	17,4 - 20,5	98	19,0 ± 0,72	18,0 - 19,8	5	19,1 ± 0,63	17,4 - 20,5	226
	Tot.	19,0 ± 0,68	17,3 - 20,5	311	19,1 ± 0,68	17,4 - 20,5	188	18,9 ± 0,58	18,0 - 19,8	10	19,0 ± 0,67	17,3 - 20,5	509
Peso	0	22,5 ± 1,49	19,5 - 25,6	39	22,1 ± 1,84	19,0 - 24,9	15				22,4 ± 1,58	19,0 - 25,6	54
	F	22,4 ± 1,38	17,5 - 28,0	4097	22,5 ± 1,47	17,3 - 30,8	2072	22,9 ± 1,72	18,4 - 28,0	135	22,4 ± 1,42	17,3 - 30,8	6304
	M	23,9 ± 1,41	18,3 - 30,5	4752	24,0 ± 1,53	17,8 - 34,2	2762	24,5 ± 1,81	20,4 - 29,8	187	24,0 ± 1,47	17,8 - 34,2	7701
	Tot.	23,2 ± 1,59	17,5 - 30,5	8888	23,4 ± 1,70	17,3 - 34,2	4849	23,8 ± 1,93	18,4 - 29,8	322	23,3 ± 1,64	17,3 - 34,2	4059

Verzellino *Serinus serinus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	71,5 ± 2,07	69,0 - 76,0	8	70,9 ± 2,21	67,0 - 76,0	57		72,0	1	71,0 ± 2,17	67,0 - 76,0	66
	F	69,9 ± 2,23	64,0 - 75,0	47	70,7 ± 1,81	66,0 - 73,0	26	70,7 ± 1,75	68,0 - 73,0	6	70,2 ± 2,08	64,0 - 75,0	79
	M	72,0 ± 1,81	69,0 - 77,0	42	72,4 ± 1,91	68,0 - 77,0	35	72,8 ± 1,60	71,0 - 75,0	6	72,2 ± 1,84	68,0 - 77,0	83
	Tot.	70,9 ± 2,26	64,0 - 77,0	97	71,3 ± 2,15	66,0 - 77,0	118	71,8 ± 1,88	68,0 - 75,0	13	71,2 ± 2,19	64,0 - 77,0	228
3RM	0	54,9 ± 1,55	53,0 - 57,0	8	54,8 ± 2,05	51,5 - 59,0	50		55,5	1	54,8 ± 1,96	51,5 - 59,0	59
	F	54,0 ± 1,34	51,5 - 57,0	32	53,8 ± 1,43	50,5 - 57,0	28	54,9 ± 1,86	53,0 - 58,0	6	54,0 ± 1,44	50,5 - 58,0	66
	M	55,3 ± 1,70	52,0 - 59,0	30	55,7 ± 1,63	52,0 - 59,0	36	57,2 ± 1,57	55,0 - 59,0	6	55,7 ± 1,71	52,0 - 59,0	72
	Tot.	54,7 ± 1,63	51,5 - 59,0	70	54,8 ± 1,92	50,5 - 59,0	114	56,0 ± 1,94	53,0 - 59,0	13	54,9 ± 1,84	50,5 - 59,0	197
Tarsio	0		13,2 - 13,6	2	14,2 ± 0,66	12,5 - 15,1	26				14,1 ± 0,67	12,5 - 15,1	28
	F	14,3 ± 0,62	12,8 - 15,0	26	14,3 ± 0,30	14,0 - 14,7	4	14,6 ± 0,48	14,0 - 15,0	4	14,3 ± 0,58	12,8 - 15,0	34
	M	14,1 ± 0,42	13,0 - 15,0	17	13,8 ± 0,84	12,3 - 15,0	11	14,1 ± 0,46	13,5 - 14,6	4	14,0 ± 0,60	12,3 - 15,0	32
	Tot.	14,2 ± 0,56	12,8 - 15,0	45	14,1 ± 0,70	12,3 - 15,1	41	14,4 ± 0,52	13,5 - 15,0	8	14,1 ± 0,62	12,3 - 15,1	94
Peso	0	10,8 ± 0,57	9,7 - 11,4	8	10,9 ± 0,90	8,6 - 13,3	55		11,7	1	10,9 ± 0,86	8,6 - 13,3	64
	F	11,1 ± 0,97	8,3 - 12,8	47	11,1 ± 0,64	9,9 - 12,5	28	11,3 ± 0,59	10,5 - 12,2	6	11,1 ± 0,84	8,3 - 12,8	81
	M	11,0 ± 0,77	9,8 - 13,0	41	11,2 ± 0,75	10,2 - 13,1	35	11,3 ± 0,53	10,8 - 12,0	6	11,1 ± 0,75	9,8 - 13,1	82
	Tot.	11,0 ± 0,86	8,3 - 13,0	96	11,0 ± 0,81	8,6 - 13,3	118	11,3 ± 0,53	10,5 - 12,2	13	11,0 ± 0,82	8,3 - 13,3	227

Verdone *Carduelis chloris*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	87,7 ± 1,37	86,0 - 90,0	6	85,2 ± 2,50	80,0 - 93,0	127				85,3 ± 2,51	80,0 - 93,0	133
	F	85,3 ± 2,47	80,0 - 92,0	139	85,3 ± 1,92	80,0 - 91,0	220	85,8 ± 2,42	82,0 - 92,0	34	85,4 ± 2,17	80,0 - 92,0	393
	M	87,4 ± 2,57	82,0 - 93,0	161	87,5 ± 2,08	82,0 - 94,0	244	88,6 ± 2,12	84,0 - 94,0	70	87,6 ± 2,29	82,0 - 94,0	475
	Tot.	86,5 ± 2,72	80,0 - 93,0	306	86,2 ± 2,38	80,0 - 94,0	591	87,7 ± 2,57	82,0 - 94,0	104	86,4 ± 2,54	80,0 - 94,0	1001
3RM	0	65,6 ± 3,31	60,5 - 69,0	5	65,5 ± 1,85	61,0 - 71,0	131				65,5 ± 1,90	60,5 - 71,0	136
	F	65,0 ± 1,83	60,0 - 69,0	105	64,9 ± 1,61	61,0 - 69,5	337	65,2 ± 1,98	61,0 - 70,5	55	64,9 ± 1,70	60,0 - 70,5	497
	M	66,9 ± 2,02	62,0 - 72,5	126	66,4 ± 1,67	62,0 - 72,0	378	67,5 ± 1,89	61,5 - 71,0	118	66,7 ± 1,84	61,5 - 72,5	622
	Tot.	66,0 ± 2,19	60,0 - 72,5	236	65,6 ± 1,82	61,0 - 72,0	846	66,8 ± 2,20	61,0 - 71,0	173	65,9 ± 1,98	60,0 - 72,5	1255
Tarsio	0	18,0 ± 0,72	17,2 - 18,6	3	18,2 ± 0,63	16,5 - 19,5	111				18,2 ± 0,63	16,5 - 19,5	114
	F	18,1 ± 0,65	16,3 - 19,5	56	18,0 ± 0,72	16,3 - 19,5	36	17,9 ± 1,12	16,2 - 19,6	6	18,1 ± 0,71	16,2 - 19,6	98
	M	17,9 ± 0,70	16,5 - 19,0	49	18,0 ± 0,65	17,0 - 19,5	47	17,9 ± 0,65	17,1 - 19,4	12	18,0 ± 0,67	16,5 - 19,5	108
	Tot.	18,0 ± 0,68	16,3 - 19,5	108	18,1 ± 0,66	16,3 - 19,5	194	17,9 ± 0,80	16,2 - 19,6	18	18,1 ± 0,67	16,2 - 19,6	320
Peso	0	25,1 ± 3,23	21,0 - 29,0	6	24,4 ± 1,73	18,0 - 29,0	132				24,4 ± 1,81	18,0 - 29,0	138
	F	26,2 ± 2,09	20,5 - 31,4	142	25,6 ± 1,75	20,1 - 31,5	302	25,6 ± 1,70	21,6 - 29,4	48	25,8 ± 1,86	20,1 - 31,5	492
	M	25,8 ± 1,85	21,0 - 31,6	156	25,7 ± 1,59	21,2 - 31,4	342	25,9 ± 1,83	22,0 - 30,4	96	25,7 ± 1,70	21,0 - 31,6	594
	Tot.	25,9 ± 2,00	20,5 - 31,6	304	25,4 ± 1,74	18,0 - 31,5	776	25,8 ± 1,79	21,6 - 30,4	144	25,6 ± 1,83	18,0 - 31,6	1224

Cardellino *Carduelis carduelis*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	79,3 ± 2,36	71,0 - 87,0	124	78,7 ± 2,10	71,0 - 86,0	777	79,9 ± 1,05	78,0 - 81,0	9	78,8 ± 2,14	71,0 - 87,0	910
	F	77,6 ± 1,86	72,0 - 83,0	308	77,5 ± 1,38	72,0 - 84,0	1219	78,4 ± 1,74	75,0 - 82,0	55	77,5 ± 1,51	72,0 - 84,0	1582
	M	81,3 ± 2,00	74,0 - 87,0	491	81,3 ± 1,56	74,0 - 87,0	926	81,9 ± 1,76	77,5 - 87,0	107	81,3 ± 1,73	74,0 - 87,0	1524
	Tot.	79,8 ± 2,61	71,0 - 87,0	923	79,0 ± 2,34	71,0 - 87,0	2922	80,7 ± 2,34	75,0 - 87,0	171	79,3 ± 2,44	71,0 - 87,0	4016
3RM	0	60,8 ± 1,71	53,0 - 65,0	92	60,5 ± 1,70	52,0 - 69,0	863	60,8 ± 1,01	59,0 - 63,0	22	60,5 ± 1,69	52,0 - 69,0	977
	F	59,3 ± 1,68	51,0 - 63,5	265	58,8 ± 1,37	52,0 - 64,5	1652	59,7 ± 1,42	57,0 - 64,0	118	58,9 ± 1,44	51,0 - 64,5	2035
	M	62,2 ± 1,52	57,0 - 66,5	463	61,9 ± 1,35	56,5 - 68,0	1329	62,5 ± 1,49	59,0 - 69,5	229	62,0 ± 1,42	56,5 - 69,5	2021
	Tot.	61,1 ± 2,08	51,0 - 66,5	820	60,3 ± 1,97	52,0 - 69,0	3844	61,5 ± 1,96	57,0 - 69,5	369	60,5 ± 2,03	51,0 - 69,5	5033
Tarsio	0	15,4 ± 0,75	14,0 - 17,0	22	15,5 ± 0,85	13,8 - 17,5	258				15,5 ± 0,84	13,8 - 17,5	280
	F	15,3 ± 0,77	13,2 - 17,0	88	15,0 ± 0,74	13,3 - 17,0	55	15,1 ± 0,45	14,5 - 15,5	5	15,2 ± 0,76	13,2 - 17,0	148
	M	15,4 ± 0,82	13,3 - 17,5	99	15,2 ± 0,69	14,0 - 16,8	45	15,2 ± 0,82	14,0 - 17,0	13	15,3 ± 0,78	13,3 - 17,5	157
	Tot.	15,4 ± 0,79	13,2 - 17,5	209	15,4 ± 0,83	13,3 - 17,5	358	15,2 ± 0,72	14,0 - 17,0	18	15,4 ± 0,81	13,2 - 17,5	585
Peso	0	16,0 ± 1,41	12,0 - 19,8	131	15,7 ± 1,16	11,5 - 19,6	883	16,2 ± 0,93	14,7 - 18,2	16	15,7 ± 1,20	11,5 - 19,8	1030
	F	15,6 ± 1,18	13,0 - 20,0	308	15,4 ± 0,99	12,4 - 19,7	1496	15,7 ± 1,18	13,2 - 20,4	97	15,5 ± 1,04	12,4 - 20,4	1901
	M	16,6 ± 1,12	12,0 - 20,2	482	16,6 ± 1,05	13,0 - 20,5	1225	16,7 ± 1,00	14,4 - 20,1	195	16,6 ± 1,07	12,0 - 20,5	1902
	Tot.	16,2 ± 1,28	12,0 - 20,2	921	15,9 ± 1,18	11,5 - 20,5	3604	16,4 ± 1,16	13,2 - 20,4	308	16,0 ± 1,21	11,5 - 20,5	4833

Lucherino *Carduelis spinus*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	71,1 ± 3,76	67,0 - 77,0	7	70,7 ± 2,07	67,0 - 73,0	6		67,0 - 71,0	2	70,7 ± 2,94	67,0 - 77,0	15
	F	71,2 ± 1,61	67,0 - 75,0	224	71,8 ± 1,58	67,0 - 77,0	584	71,8 ± 1,55	68,0 - 75,0	48	71,6 ± 1,61	67,0 - 77,0	856
	M	74,0 ± 1,73	69,0 - 79,0	268	73,8 ± 1,64	68,0 - 78,0	505	74,2 ± 1,54	71,0 - 78,0	53	73,9 ± 1,66	68,0 - 79,0	826
	Tot.	72,7 ± 2,22	67,0 - 79,0	499	72,7 ± 1,89	67,0 - 78,0	1095	73,0 ± 2,01	67,0 - 78,0	103	72,7 ± 2,00	67,0 - 79,0	1697
3RM	0		52,0 - 56,0	2	56,0 ± 2,61	53,5 - 61,5	7		53,5 - 54,0	2	55,2 ± 2,46	52,0 - 61,5	11
	F	55,2 ± 1,39	51,0 - 59,0	176	55,2 ± 1,40	50,0 - 60,0	611	55,5 ± 1,47	52,0 - 58,0	46	55,2 ± 1,41	50,0 - 60,0	833
	M	57,2 ± 1,60	51,5 - 62,0	233	56,8 ± 1,39	52,5 - 61,0	535	57,4 ± 1,56	54,5 - 60,5	53	57,0 ± 1,47	51,5 - 62,0	821
	Tot.	56,3 ± 1,81	51,0 - 62,0	411	56,0 ± 1,62	50,0 - 61,5	1153	56,5 ± 1,83	52,0 - 60,5	101	56,1 ± 1,69	50,0 - 62,0	1665
Tarsio	0		15,5 - 15,5	2	14,2 ± 0,42	13,7 - 14,6	4		13,5	1	14,5 ± 0,81	13,5 - 15,5	7
	F	14,1 ± 0,52	13,1 - 15,0	35	14,0 ± 0,57	12,8 - 15,5	85	13,7 ± 0,71	12,7 - 15,0	9	14,0 ± 0,57	12,7 - 15,5	129
	M	14,3 ± 0,58	12,8 - 15,5	44	14,2 ± 0,60	12,9 - 15,8	74	13,7 ± 0,59	13,1 - 14,5	5	14,2 ± 0,60	12,8 - 15,8	123
	Tot.	14,2 ± 0,58	12,8 - 15,5	81	14,1 ± 0,58	12,8 - 15,8	163	13,7 ± 0,63	12,7 - 15,0	15	14,1 ± 0,59	12,7 - 15,8	259
Peso	0	12,4 ± 0,57	11,6 - 13,0	9	13,5 ± 2,13	11,7 - 17,5	6		11,6 - 11,7	2	12,7 ± 1,40	11,6 - 17,5	17
	F	12,2 ± 1,08	10,1 - 16,0	278	11,9 ± 0,93	9,3 - 16,8	643	11,7 ± 0,98	9,5 - 14,8	47	12,0 ± 0,99	9,3 - 16,8	968
	M	12,6 ± 1,12	9,5 - 17,7	315	12,3 ± 0,91	9,7 - 15,3	571	12,1 ± 0,90	10,5 - 15,1	52	12,4 ± 1,00	9,5 - 17,7	938
	Tot.	12,4 ± 1,11	9,5 - 17,7	602	12,1 ± 0,95	9,3 - 17,5	1220	11,9 ± 0,94	9,5 - 15,1	101	12,2 ± 1,02	9,3 - 17,7	1923

Fanello *Carduelis cannabina*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	81,4 ± 1,33	80,0 - 83,0	9	79,4 ± 2,61	75,0 - 85,0	40				79,8 ± 2,55	75,0 - 85,0	49
	F	80,9 ± 1,96	75,0 - 85,0	196	80,4 ± 1,77	75,0 - 86,0	590	80,9 ± 1,50	78,0 - 83,0	13	80,5 ± 1,83	75,0 - 86,0	799
	M	83,1 ± 2,24	76,0 - 89,0	246	82,6 ± 1,79	77,0 - 87,5	581	83,4 ± 1,71	80,0 - 87,0	25	82,8 ± 1,95	76,0 - 89,0	852
	Tot.	82,1 ± 2,37	75,0 - 89,0	451	81,4 ± 2,15	75,0 - 87,5	1211	82,6 ± 2,02	78,0 - 87,0	38	81,6 ± 2,23	75,0 - 89,0	1700
3RM	0	61,8 ± 1,49	60,0 - 64,0	8	61,6 ± 2,62	57,5 - 69,5	40				61,6 ± 2,46	57,5 - 69,5	48
	F	61,3 ± 1,54	57,0 - 66,0	213	60,9 ± 1,58	54,5 - 66,0	840	61,1 ± 1,23	59,0 - 64,0	16	61,0 ± 1,57	54,5 - 66,0	1069
	M	63,2 ± 1,81	58,5 - 69,0	285	62,6 ± 1,57	57,0 - 69,5	797	63,3 ± 1,65	60,0 - 65,5	28	62,7 ± 1,67	57,0 - 69,5	1110
	Tot.	62,4 ± 1,94	57,0 - 69,0	506	61,7 ± 1,80	54,5 - 69,5	1677	62,5 ± 1,84	59,0 - 65,5	44	61,9 ± 1,86	54,5 - 69,5	2227
Tarsio	0				16,1 ± 0,70	15,0 - 17,5	24				16,1 ± 0,70	15,0 - 17,5	24
	F	15,9 ± 0,73	14,5 - 16,8	11	16,2 ± 0,76	14,5 - 17,0	13		15,0	1	16,0 ± 0,76	14,5 - 17,0	25
	M	16,2 ± 0,82	14,5 - 17,5	14	16,0 ± 0,69	15,1 - 17,0	10				16,1 ± 0,76	14,5 - 17,5	24
	Tot.	16,0 ± 0,78	14,5 - 17,5	25	16,1 ± 0,70	14,5 - 17,5	47		15,0	1	16,1 ± 0,73	14,5 - 17,5	73
Peso	0	18,6 ± 0,91	17,4 - 20,1	10	16,8 ± 1,94	14,0 - 20,2	41				17,2 ± 1,91	14,0 - 20,2	51
	F	18,5 ± 1,40	14,0 - 26,2	228	18,4 ± 1,29	14,8 - 25,5	832	17,9 ± 1,17	16,4 - 20,2	16	18,4 ± 1,31	14,0 - 26,2	1076
	M	19,3 ± 1,30	16,0 - 25,4	295	19,1 ± 1,29	15,8 - 26,7	803	19,8 ± 1,48	17,4 - 22,2	27	19,2 ± 1,30	15,8 - 26,7	1125
	Tot.	18,9 ± 1,39	14,0 - 26,2	533	18,7 ± 1,38	14,0 - 26,7	1676	19,1 ± 1,65	16,4 - 22,2	43	18,8 ± 1,39	14,0 - 26,7	2252

Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*

		età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
secco		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0		85,0	1	87,8 ± 2,92	83,0 - 93,0	20				87,6 ± 2,91	83,0 - 93,0	21
	F	85,0 ± 2,43	81,0 - 90,0	31	86,2 ± 1,90	83,0 - 90,0	23		87,0	1	85,5 ± 2,26	81,0 - 90,0	55
	M	87,4 ± 1,99	83,0 - 92,0	36	88,0 ± 1,77	85,0 - 91,0	25	88,8 ± 1,94	86,0 - 91,0	6	87,8 ± 1,92	83,0 - 92,0	67
	Tot.	86,3 ± 2,49	81,0 - 92,0	68	87,3 ± 2,32	83,0 - 93,0	68	88,6 ± 1,90	86,0 - 91,0	7	86,9 ± 2,45	81,0 - 93,0	143
3RM	0		61,0	1	66,3 ± 2,06	62,5 - 71,0	40				66,2 ± 2,20	61,0 - 71,0	41
	F	65,4 ± 2,16	61,0 - 70,0	18	65,7 ± 1,60	62,0 - 69,0	35		68,0	1	65,6 ± 1,81	61,0 - 70,0	54
	M	66,9 ± 1,71	64,0 - 70,0	24	67,1 ± 1,62	64,0 - 70,0	37	68,1 ± 2,22	65,0 - 71,0	6	67,1 ± 1,71	64,0 - 71,0	67
	Tot.	66,2 ± 2,16	61,0 - 70,0	43	66,4 ± 1,86	62,0 - 71,0	112	68,1 ± 2,03	65,0 - 71,0	7	66,4 ± 1,97	61,0 - 71,0	162
Tarsio	0				17,2 ± 0,66	16,4 - 18,8	31				17,2 ± 0,66	16,4 - 18,8	31
	F	17,2 ± 0,53	16,5 - 18,0	12	17,1 ± 0,90	15,5 - 18,9	21		17,7	1	17,2 ± 0,77	15,5 - 18,9	34
	M	17,6 ± 0,74	15,9 - 18,8	18	17,4 ± 0,62	16,5 - 18,8	24	17,8 ± 1,29	16,3 - 19,0	5	17,5 ± 0,74	15,9 - 19,0	47
	Tot.	17,4 ± 0,67	15,9 - 18,8	30	17,3 ± 0,72	15,5 - 18,9	76	17,8 ± 1,16	16,3 - 19,0	6	17,3 ± 0,74	15,5 - 19,0	112
Peso	0		23,0	1	23,5 ± 1,40	21,3 - 27,5	41				23,5 ± 1,38	21,3 - 27,5	42
	F	23,4 ± 1,79	21,0 - 30,0	29	23,8 ± 1,87	19,3 - 28,0	37		27,5	1	23,7 ± 1,88	19,3 - 30,0	67
	M	24,1 ± 1,39	21,0 - 27,0	36	24,1 ± 1,82	19,0 - 26,8	38	24,1 ± 1,73	20,7 - 25,4	6	24,1 ± 1,61	19,0 - 27,0	80
	Tot.	23,8 ± 1,60	21,0 - 30,0	66	23,8 ± 1,70	19,0 - 28,0	116	24,6 ± 2,03	20,7 - 27,5	7	23,8 ± 1,68	19,0 - 30,0	189

Frosone *Coccothraustes coccothraustes*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	104,2 ± 3,19	101,0 - 110,0	6	105,0 ± 6,32	99,0 - 115,0	5				104,5 ± 4,61	99,0 - 115,0	11
	F	104,1 ± 2,54	97,0 - 111,0	302	104,2 ± 2,55	97,0 - 112,0	287	103,6 ± 2,07	101,0 - 106,0	8	104,1 ± 2,53	97,0 - 112,0	597
	M	106,2 ± 2,59	99,0 - 115,0	277	105,7 ± 2,69	99,0 - 115,0	148	106,4 ± 2,94	100,0 - 112,0	31	106,1 ± 2,66	99,0 - 115,0	456
	Tot.	105,1 ± 2,78	97,0 - 115,0	585	104,7 ± 2,74	97,0 - 115,0	440	105,8 ± 2,99	100,0 - 112,0	39	104,9 ± 2,78	97,0 - 115,0	1064
3RM	0	77,2 ± 5,01	71,5 - 81,0	3	77,4 ± 2,11	75,0 - 80,0	6				77,3 ± 3,01	71,5 - 81,0	9
	F	78,3 ± 1,90	73,0 - 83,0	257	77,5 ± 1,90	72,0 - 83,0	541	77,3 ± 2,47	72,5 - 80,5	9	77,7 ± 1,93	72,0 - 83,0	807
	M	80,0 ± 1,93	73,5 - 84,5	299	78,4 ± 2,00	73,5 - 83,5	261	79,4 ± 1,86	76,0 - 82,5	32	79,2 ± 2,10	73,5 - 84,5	592
	Tot.	79,2 ± 2,12	71,5 - 84,5	559	77,8 ± 1,98	72,0 - 83,5	808	78,9 ± 2,16	72,5 - 82,5	41	78,4 ± 2,15	71,5 - 84,5	1408
Tarsio	0		20,0	1		22,0	1					20,0 - 22,0	2
	F	22,0 ± 0,78	20,0 - 23,5	136	21,5 ± 0,83	19,6 - 23,8	38	21,8 ± 0,44	21,2 - 22,4	6	21,9 ± 0,80	19,6 - 23,8	180
	M	22,0 ± 0,79	19,8 - 23,5	101	21,7 ± 0,63	20,2 - 22,3	14	22,1 ± 0,48	21,4 - 22,7	17	22,0 ± 0,75	19,8 - 23,5	132
	Tot.	22,0 ± 0,79	19,8 - 23,5	238	21,6 ± 0,77	19,6 - 23,8	53	22,0 ± 0,48	21,2 - 22,7	23	21,9 ± 0,78	19,6 - 23,8	314
Peso	0	54,2 ± 3,25	49,0 - 58,0	6	50,0 ± 3,03	46,0 - 54,5	7				51,9 ± 3,71	46,0 - 58,0	13
	F	52,5 ± 3,84	41,0 - 69,0	415	51,9 ± 3,71	41,5 - 67,0	535	52,9 ± 1,91	50,0 - 55,0	10	52,2 ± 3,77	41,0 - 69,0	960
	M	54,2 ± 3,46	45,0 - 68,0	404	54,2 ± 4,02	44,0 - 69,5	261	56,1 ± 2,88	53,0 - 64,0	32	54,3 ± 3,68	44,0 - 69,5	697
	Tot.	53,4 ± 3,75	41,0 - 69,0	825	52,6 ± 3,97	41,5 - 69,5	803	55,3 ± 2,99	50,0 - 64,0	42	53,1 ± 3,87	41,0 - 69,5	1670

Zigolo giallo *Emberiza citrinella*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	89,9 ± 3,18	84,0 - 95,0	10	89,4 ± 3,43	82,0 - 97,0	61				89,5 ± 3,38	82,0 - 97,0	71
	F	87,0 ± 2,48	82,0 - 92,0	58	86,7 ± 1,65	83,0 - 90,0	60	88,1 ± 2,05	83,0 - 93,0	16	87,0 ± 2,12	82,0 - 93,0	134
	M	91,6 ± 3,20	85,0 - 98,0	49	91,3 ± 1,95	86,0 - 95,0	79	92,6 ± 2,22	87,0 - 95,0	14	91,5 ± 2,49	85,0 - 98,0	142
	Tot.	89,2 ± 3,58	82,0 - 98,0	117	89,3 ± 3,07	82,0 - 97,0	200	90,2 ± 3,10	83,0 - 95,0	30	89,4 ± 3,26	82,0 - 98,0	347
3RM	0	68,1 ± 2,54	63,5 - 71,5	11	68,1 ± 2,60	62,5 - 74,5	67				68,1 ± 2,57	62,5 - 74,5	78
	F	66,2 ± 2,11	62,0 - 71,0	51	65,9 ± 1,88	62,0 - 71,0	54	66,5 ± 1,83	61,5 - 69,0	12	66,1 ± 1,97	61,5 - 71,0	117
	M	70,1 ± 2,58	65,0 - 74,5	42	69,2 ± 1,72	64,5 - 72,8	67	70,8 ± 2,34	66,5 - 74,0	11	69,7 ± 2,17	64,5 - 74,5	120
	Tot.	68,0 ± 2,98	62,0 - 74,5	104	67,8 ± 2,50	62,0 - 74,5	188	68,5 ± 3,02	61,5 - 74,0	23	67,9 ± 2,70	61,5 - 74,5	315
Tarsio	0	20,6 ± 0,87	19,2 - 21,6	5	20,1 ± 0,71	18,5 - 21,7	39				20,2 ± 0,73	18,5 - 21,7	44
	F	20,2 ± 0,61	19,0 - 21,5	30	19,7 ± 0,37	19,1 - 20,0	5		21,6	1	20,1 ± 0,64	19,0 - 21,6	36
	M	19,9 ± 0,59	18,9 - 21,0	15	20,2 ± 0,57	19,2 - 21,0	19		19,1 - 21,0	2	20,1 ± 0,62	18,9 - 21,0	36
	Tot.	20,1 ± 0,65	18,9 - 21,6	50	20,1 ± 0,66	18,5 - 21,7	63	20,6 ± 1,31	19,1 - 21,6	3	20,1 ± 0,67	18,5 - 21,7	116
Peso	0	29,3 ± 2,15	26,9 - 33,4	12	28,3 ± 2,07	21,5 - 32,6	73				28,5 ± 2,01	21,5 - 33,4	85
	F	27,8 ± 2,01	19,4 - 32,0	60	27,1 ± 1,85	22,4 - 32,0	55	28,1 ± 1,16	26,0 - 30,0	13	27,6 ± 1,89	19,4 - 32,0	128
	M	29,1 ± 1,77	24,3 - 33,5	52	28,5 ± 1,92	22,0 - 32,5	76	28,4 ± 1,47	26,7 - 31,6	13	28,7 ± 1,84	22,0 - 33,5	141
	Tot.	28,5 ± 2,02	19,4 - 33,5	124	28,1 ± 2,03	21,5 - 32,6	204	28,2 ± 1,31	26,0 - 31,6	26	28,2 ± 1,99	19,4 - 33,5	354

Zigolo nero *Emberiza cirius*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	82,4 ± 2,61	79,0 - 86,0	5	80,8 ± 2,31	76,0 - 83,0	7				81,5 ± 2,46	76,0 - 86,0	12
	F	78,4 ± 1,64	75,0 - 82,0	49	78,9 ± 1,43	76,0 - 81,0	27		78,0	1	78,6 ± 1,57	75,0 - 82,0	77
	M	81,5 ± 2,05	78,0 - 86,0	45	82,6 ± 1,65	80,0 - 86,0	29	81,9 ± 2,64	79,0 - 88,0	8	81,9 ± 2,02	78,0 - 88,0	82
	Tot.	80,0 ± 2,47	75,0 - 86,0	99	80,8 ± 2,37	76,0 - 86,0	63	81,4 ± 2,79	78,0 - 88,0	9	80,4 ± 2,47	75,0 - 88,0	171
3RM	0		64,0	1	62,3 ± 2,01	58,0 - 64,5	7				62,5 ± 2,04	58,0 - 64,5	8
	F	60,5 ± 1,70	56,5 - 62,5	20	59,8 ± 0,91	58,0 - 61,5	23		58,5	1	60,1 ± 1,37	56,5 - 62,5	44
	M	62,7 ± 1,46	60,0 - 65,0	16	63,1 ± 1,01	61,5 - 65,5	27	63,1 ± 2,52	60,5 - 68,0	8	62,9 ± 1,45	60,0 - 68,0	51
	Tot.	61,5 ± 1,94	56,5 - 65,0	37	61,7 ± 1,90	58,0 - 65,5	57	62,6 ± 2,81	58,5 - 68,0	9	61,7 ± 2,00	56,5 - 68,0	103
Tarsio	0				18,9 ± 0,64	17,9 - 19,5	6				18,9 ± 0,64	17,9 - 19,5	6
	F	19,2 ± 0,50	18,3 - 20,4	19	18,8 ± 0,34	18,2 - 19,2	13		19,2	1	19,1 ± 0,48	18,2 - 20,4	33
	M	19,3 ± 0,70	18,0 - 20,3	13	18,9 ± 0,50	18,0 - 20,0	16	18,9 ± 0,43	18,4 - 19,5	8	19,0 ± 0,58	18,0 - 20,3	37
	Tot.	19,2 ± 0,58	18,0 - 20,4	32	18,9 ± 0,46	17,9 - 20,0	35	18,9 ± 0,41	18,4 - 19,5	9	19,0 ± 0,54	17,9 - 20,4	76
Peso	0	24,0 ± 0,95	23,1 - 25,0	3	23,1 ± 2,13	20,6 - 27,0	7				23,4 ± 1,85	20,6 - 27,0	10
	F	24,6 ± 1,81	21,0 - 31,6	47	23,4 ± 0,90	21,8 - 25,0	27		26,0	1	24,2 ± 1,63	21,0 - 31,6	75
	M	24,4 ± 1,36	21,4 - 27,2	40	24,2 ± 1,39	21,0 - 27,2	28	24,8 ± 1,31	22,7 - 26,2	8	24,4 ± 1,36	21,0 - 27,2	76
	Tot.	24,5 ± 1,59	21,0 - 31,6	90	23,8 ± 1,36	20,6 - 27,2	62	24,9 ± 1,29	22,7 - 26,2	9	24,2 ± 1,53	20,6 - 31,6	161

Zigolo muciatto *Emberiza cia*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	81,2 ± 3,87	72,0 - 86,0	18	80,1 ± 2,84	73,0 - 88,0	235				80,2 ± 2,93	72,0 - 88,0	253
	F	78,2 ± 1,80	75,0 - 82,0	43	77,9 ± 1,67	74,0 - 82,0	111	77,7 ± 1,62	75,0 - 80,0	8	78,0 ± 1,70	74,0 - 82,0	162
	M	83,2 ± 3,07	77,0 - 89,0	63	83,1 ± 2,39	77,0 - 89,0	157	83,2 ± 3,18	77,0 - 89,0	20	83,2 ± 2,64	77,0 - 89,0	240
	Tot.	81,2 ± 3,63	72,0 - 89,0	124	80,6 ± 3,13	73,0 - 89,0	503	81,7 ± 3,79	75,0 - 89,0	28	80,7 ± 3,27	72,0 - 89,0	655
3RM	0	61,8 ± 2,24	58,0 - 64,5	14	61,2 ± 2,39	56,0 - 67,0	222				61,2 ± 2,38	56,0 - 67,0	236
	F	59,4 ± 1,25	56,5 - 61,5	29	59,4 ± 1,28	56,5 - 62,0	96	59,6 ± 1,09	58,5 - 62,0	8	59,4 ± 1,26	56,5 - 62,0	133
	M	64,1 ± 2,68	58,5 - 68,2	47	63,5 ± 2,02	58,0 - 68,0	144	64,1 ± 2,34	61,0 - 68,5	18	63,7 ± 2,22	58,0 - 68,5	209
	Tot.	62,2 ± 3,04	56,5 - 68,2	90	61,5 ± 2,58	56,0 - 68,0	462	62,7 ± 2,92	58,5 - 68,5	26	61,7 ± 2,69	56,0 - 68,5	578
Tarsio	0	19,8 ± 0,76	18,0 - 20,8	10	19,9 ± 0,70	18,0 - 21,5	128				19,9 ± 0,70	18,0 - 21,5	138
	F	19,9 ± 0,85	18,3 - 21,6	26	19,8 ± 0,60	18,5 - 21,0	55	19,6 ± 0,46	18,9 - 20,2	8	19,8 ± 0,67	18,3 - 21,6	89
	M	20,0 ± 0,64	18,2 - 21,2	35	19,8 ± 0,69	18,0 - 21,8	85	19,7 ± 0,50	19,0 - 20,5	18	19,8 ± 0,65	18,0 - 21,8	138
	Tot.	19,9 ± 0,73	18,0 - 21,6	71	19,9 ± 0,68	18,0 - 21,8	268	19,7 ± 0,48	18,9 - 20,5	26	19,9 ± 0,68	18,0 - 21,8	365
Peso	0	22,1 ± 1,39	19,5 - 25,2	23	22,0 ± 1,60	17,5 - 26,1	251				22,0 ± 1,58	17,5 - 26,1	274
	F	21,5 ± 1,44	17,8 - 24,6	48	21,5 ± 1,44	18,1 - 28,3	109	22,2 ± 2,09	18,8 - 25,1	9	21,6 ± 1,47	17,8 - 28,3	166
	M	22,6 ± 1,59	17,6 - 26,8	67	22,5 ± 1,36	19,3 - 26,2	155	23,4 ± 2,25	19,4 - 28,0	20	22,6 ± 1,53	17,6 - 28,0	242
	Tot.	22,1 ± 1,58	17,6 - 26,8	138	22,1 ± 1,54	17,5 - 28,3	515	23,0 ± 2,24	18,8 - 28,0	29	22,1 ± 1,59	17,5 - 28,3	682

Ortolano *Emberiza hortulana*

	sesso	età 2/4			età 3/5			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0		90,0	1	87,2 ± 3,20	81,0 - 94,0	22	87,3 ± 3,18	81,0 - 94,0	23
	F	87,2 ± 3,11	83,0 - 92,0	9				87,2 ± 3,11	83,0 - 92,0	9
	M	90,7 ± 2,75	86,0 - 96,0	10	89,4 ± 1,67	87,0 - 91,0	5	90,3 ± 2,46	86,0 - 96,0	15
	Tot.	89,1 ± 3,28	83,0 - 96,0	20	87,6 ± 3,08	81,0 - 94,0	27	88,2 ± 3,22	81,0 - 96,0	47
3RM	0				65,8 ± 2,93	62,0 - 73,0	21	65,8 ± 2,93	62,0 - 73,0	21
	F	64,8 ± 3,52	61,0 - 69,0	9		67,5	1	65,1 ± 3,42	61,0 - 69,0	10
	M	69,1 ± 2,18	66,5 - 72,0	8	67,1 ± 2,41	63,0 - 69,0	5	68,3 ± 2,40	63,0 - 72,0	13
	Tot.	66,9 ± 3,63	61,0 - 72,0	17	66,1 ± 2,80	62,0 - 73,0	27	66,4 ± 3,12	61,0 - 73,0	44
Tarsio	0		19,5	1	20,0 ± 0,51	19,2 - 20,7	12	20,0 ± 0,51	19,2 - 20,7	13
	F	20,0 ± 0,54	19,1 - 20,8	7		19,8	1	20,0 ± 0,51	19,1 - 20,8	8
	M	20,1 ± 0,42	19,5 - 20,6	7	19,8 ± 0,76	19,1 - 20,6	3	20,0 ± 0,51	19,1 - 20,6	10
	Tot.	20,0 ± 0,47	19,1 - 20,8	15	19,9 ± 0,53	19,1 - 20,7	16	20,0 ± 0,49	19,1 - 20,8	31
Peso	0	24,0 ± 0,91	23,0 - 24,7	3	23,7 ± 1,85	19,7 - 26,8	21	23,8 ± 1,75	19,7 - 26,8	24
	F	23,2 ± 1,35	21,0 - 25,8	11		24,5	1	23,3 ± 1,34	21,0 - 25,8	12
	M	25,0 ± 2,27	23,0 - 30,5	11	25,3 ± 1,30	23,6 - 27,0	5	25,1 ± 1,97	23,0 - 30,5	16
	Tot.	24,1 ± 1,92	21,0 - 30,5	25	24,0 ± 1,81	19,7 - 27,0	27	24,1 ± 1,84	19,7 - 30,5	52

Migliarino di palude *Emberiza schoeniclus*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	76,9 ± 3,48	67,5 - 85,0	244	77,3 ± 3,49	68,0 - 84,0	136	76,7 ± 1,33	75,0 - 79,0	11	77,0 ± 3,45	67,5 - 85,0	391
	F	76,2 ± 1,83	67,0 - 84,0	5790	76,5 ± 2,08	68,0 - 84,0	3249	77,2 ± 1,91	70,0 - 83,0	990	76,4 ± 1,95	67,0 - 84,0	10029
	M	81,2 ± 2,28	70,0 - 89,0	3157	82,1 ± 2,60	70,0 - 89,0	2320	82,7 ± 2,44	71,0 - 89,0	915	81,7 ± 2,48	70,0 - 89,0	6392
	Tot.	78,0 ± 3,15	67,0 - 89,0	9191	78,8 ± 3,58	68,0 - 89,0	5705	79,8 ± 3,49	70,0 - 89,0	1916	78,4 ± 3,40	67,0 - 89,0	16812
3RM	0	58,6 ± 2,66	51,0 - 65,0	269	58,9 ± 2,66	51,5 - 65,0	148	59,1 ± 1,10	57,0 - 60,5	10	58,7 ± 2,63	51,0 - 65,0	427
	F	57,6 ± 1,59	52,5 - 64,5	5463	58,0 ± 1,76	51,5 - 64,5	2712	58,6 ± 1,61	53,0 - 63,0	767	57,8 ± 1,67	51,5 - 64,5	8942
	M	62,0 ± 1,99	54,5 - 69,5	3657	62,9 ± 2,19	54,0 - 69,0	2515	63,6 ± 1,96	57,0 - 69,5	876	62,5 ± 2,15	54,0 - 69,5	7048
	Tot.	59,4 ± 2,75	51,0 - 69,5	9389	60,3 ± 3,12	51,5 - 69,0	5375	61,3 ± 3,09	53,0 - 69,5	1653	59,9 ± 2,98	51,0 - 69,5	16417
Tarsio	0	19,5 ± 0,83	18,1 - 22,3	84	19,4 ± 0,54	18,3 - 20,4	41		19,3 - 20,6	2	19,5 ± 0,75	18,1 - 22,3	127
	F	19,3 ± 0,69	17,0 - 21,5	839	19,3 ± 0,77	17,0 - 22,0	697	19,4 ± 0,65	17,8 - 21,1	132	19,3 ± 0,72	17,0 - 22,0	1668
	M	19,9 ± 0,69	17,5 - 22,0	900	19,9 ± 0,76	17,5 - 22,5	693	19,9 ± 0,68	18,2 - 21,5	227	19,9 ± 0,72	17,5 - 22,5	1820
	Tot.	19,6 ± 0,74	17,0 - 22,3	1823	19,6 ± 0,82	17,0 - 22,5	1431	19,7 ± 0,70	17,8 - 21,5	361	19,6 ± 0,77	17,0 - 22,5	3615
Peso	0	18,1 ± 1,79	10,2 - 22,4	280	18,6 ± 1,80	11,4 - 23,0	159	18,7 ± 1,98	15,4 - 22,4	10	18,3 ± 1,81	10,2 - 23,0	449
	F	18,0 ± 1,26	10,9 - 27,5	6923	18,1 ± 1,41	11,7 - 28,1	3684	18,3 ± 1,29	14,5 - 24,1	999	18,0 ± 1,31	10,9 - 28,1	11606
	M	20,1 ± 1,47	12,0 - 27,0	4119	20,4 ± 1,60	10,3 - 28,9	2842	20,8 ± 1,53	16,0 - 27,7	962	20,3 ± 1,54	10,3 - 28,9	7923
	Tot.	18,7 ± 1,71	10,2 - 27,5	1322	19,1 ± 1,87	10,3 - 28,9	6685	19,5 ± 1,89	14,5 - 27,7	1971	18,9 ± 1,80	10,2 - 28,9	19978

Strillozzo *Emberiza calandra*

	sesso	età 2/4			età 3/5			età 6			Complessivo		
		media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.		n	media ± d.s.	min - max	n	media ± d.s.	min - max	n
C.Max	0	97,0 ± 3,74	90,0 - 100,0	6	89,2 ± 4,38	84,0 - 98,0	11				91,9 ± 5,58	84,0 - 100,0	17
	F	90,0 ± 3,61	86,0 - 93,0	3					88,0	1	89,5 ± 3,11	86,0 - 93,0	4
	M	100,8 ± 2,93	96,0 - 105,0	6							100,8 ± 2,93	96,0 - 105,0	6
	Tot.	97,1 ± 5,17	86,0 - 105,0	15	89,2 ± 4,38	84,0 - 98,0	11		88,0	1	93,6 ± 6,20	84,0 - 105,0	27
3RM	0	75,5 ± 1,73	73,0 - 77,0	4	65,7 ± 2,94	61,5 - 70,0	12				68,1 ± 5,13	61,5 - 77,0	16
	F	68,2 ± 2,57	66,0 - 71,0	3					67,0 - 67	1	67,9 ± 2,17	66,0 - 71,0	4
	M	77,0 ± 1,42	75,0 - 79,0	5							77,0 ± 1,42	75,0 - 79,0	5
	Tot.	74,3 ± 4,09	66,0 - 79,0	12	65,7 ± 2,94	61,5 - 70,0	12		67,0 - 67	1	69,9 ± 5,52	61,5 - 79,0	25
Tarso	0	25,5 ± 1,05	24,0 - 27,0	6	24,8 ± 1,15	23,0 - 27,0	12				25,1 ± 1,14	23,0 - 27,0	18
	F	25,0 ± 0,00	25,0 - 25,0	3					24,5 - 24,5	1	24,9 ± 0,25	24,5 - 25,0	4
	M	24,8 ± 0,97	24,0 - 26,0	4							24,8 ± 0,97	24,0 - 26,0	4
	Tot.	25,2 ± 0,90	24,0 - 27,0	13	24,8 ± 1,15	23,0 - 27,0	12		24,5 - 24,5	1	25,0 ± 1,01	23,0 - 27,0	26
Peso	0	44,6 ± 3,54	39,0 - 48,5	5	41,1 ± 7,31	31,5 - 59,0	14				42,0 ± 6,62	31,5 - 59,0	19
	F	38,2 ± 0,75	37,5 - 39,0	3					43,0 - 43	1	39,4 ± 2,46	37,5 - 43,0	4
	M	48,5 ± 3,15	43,0 - 52,0	6							48,5 ± 3,15	43,0 - 52,0	6
	Tot.	44,9 ± 4,90	37,5 - 52,0	14	41,1 ± 7,31	31,5 - 59,0	14		43,0 - 43	1	43,0 ± 6,29	31,5 - 59,0	29