

PRIMA NIDIFICAZIONE DI CANAPIGLIA (*Mareca strepera*) IN PROVINCIA DI BRESCIA

PAOLO TROTTI¹

Parola chiave – *Mareca strepera*, prima nidificazione, Provincia di Brescia.

Key words – *Mareca strepera*, first breeding, Province of Brescia.

Riassunto – Breve descrizione della prima nidificazione di Canapiglia *Mareca strepera* in Provincia di Brescia nella Riserva Naturale “Torbiere del Sebino”.

Abstract – First nesting of *Mareca strepera* in Brescia Province. Short description of the first successful breeding of Gadwall *Mareca strepera* in Brescia Province.

Specie politipica a distribuzione oloartica, parzialmente sedentaria in Europa occidentale mentre la maggior parte della popolazione è migratrice e svernante in Europa centrale e meridionale, in nord Africa, sud Asia e centro Nord America. In Italia nidifica regolarmente nelle aree umide dell’Alto Adriatico e nella Pianura Padana interna orientale mentre diventano più rare e sporadiche le nidificazioni in altre zone (Pianura Padana centrale e occidentale, Lazio, Umbria, Sicilia e Sardegna). La popolazione nidificante ha subito un incremento occupando anche nuove aree interne con pochi casi dovuti a introduzioni. Si è passati dalle 15-40 coppie stimate a inizio anni ‘80, a 50-100 coppie a fine anni ‘90 e a 200-300 coppie nel periodo 2010-2016. Gli ambienti frequentati per la nidificazione sono zone umide salmastre costiere e d’acqua dolce con presenza di vegetazione palustre emergente, localmente anche in laghetti urbani (BRICHETTI & FRACASSO 2018).

In Provincia di Brescia la specie è considerata migratrice e svernante (BRICHETTI & GARGIONI 2016).

L’osservazione di nidificazione certa è stata effettuata il 25 giugno 2020 durante una sessione di censimento in barca all’interno della Riserva Naturale “Torbiere del Se-

bino” IT 2070020 ZSC/ZPS. L’area protetta (360 ettari) è caratterizzata da una zona interna con vasche d’acqua intervallate da sottili argini di terra colonizzati da vegetazione (lama) e una zona più esterna a contatto con il Lago d’Iseo dominata da estesi canneti (lametta). In quest’ultima zona è stata osservata la femmina in compagnia di 3 pulcini. Nel dettaglio, l’ambiente è caratterizzato da canneti allagati a *Phragmites australis* con presenza di *Carex elata* e da canali d’acqua dolce in comunicazione con il bacino lacustre. Prima dell’accertamento della nidificazione, la specie era stata osservata in mesi interessanti per la riproduzione negli anni 2009 (maggio), 2011 e 2012 (aprile), dal 2013 al 2018 (maggio) e nel giugno 2019 sono stati osservati i primi comportamenti nuziali (ORNITHO.IT).

Ringraziamenti – Desidero ringraziare l’ente per la gestione della Riserva Naturale “Torbiere del Sebino” sito in via Europa 5 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS), Daniele Vezzoli, Emanuele Forlani, Marco Guerrini e Stefania Capelli.

BIBLIOGRAFIA

BRICHETTI P. & GARGIONI A., 2016. Check list degli uccelli della Provincia di Brescia (Lombardia) aggiornata al dicembre 2016. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 40: 87-100.

BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2018. The Birds of Italy. Volume 1. Anatidae-Alcidae. Edizioni Belvedere, Latina (Italy), “*historia naturae*” (6), pp. 512.

¹Via Piangrande 23, 25055 Pisogne, Brescia - ✉ paolotrotti6@libero.it